onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





عَمارِيا البيئة والتديية فحماريا البيئة والتديية فحماريا البيئة والتديية

الأوضاع الراهنة وسيناريوهات مستقبلية حتى عام ٢٠٢٠





overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

قضايا البيئة والتنمية فــــــ مصــر الطبعة الأوليي

دارالشروق ۱۹۱۸ مرالمت تم عام ۱۹۹۸

القساهرة: ٨ شسارع سسيب ويه المصرى - رابع سه المسرى - المسلمة العسدوية - مسدينة نصسر ص. ب : ٣٣٩٩ البانوراما - تليفون : ٤٠٣٧٩٩ ٤ (٢٠٢) في المسلمة في المسلمة والإلكتروني: email: dar@shorouk.com

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

د. عصــام الحنـاوي

قضايا البيئة والتنمية فيست

الأوضاع الراهنة وسيناريوهات مستقبلية حتى عام ٢٠٢٠

دار الشروقــــ



توطئـــة

حددت وثيقة مشروع الدراسة المستقبلية «مصر ٢٠٢٠» اثنى عشر مجالاً لإجراء بحوث متعمقة تكون هى الأساس فى توفير المعلومات والتحليلات الضرورية للبحث فى صور المستقبل المصرى حتى عام ٢٠٢٠، وذلك عن طريق بناء عدد من السيناريوهات البديلة. وقد جاء مجال «البيئة والسكان» على رأس قائمة المجالات البحثية للمشروع، وذلك باعتباره يمثل الأساس الذى يقوم عليه نشاط البشر فى الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة، كما يقوم عليه ما ينشأ بمناسبة ممارسة هذا النشاط من علاقات ومؤسسات ونظم.

وقد سار البحث في مجال «البيئة والسكان» في اتجاهين. أولهما: النظر في عدد من القضايا الجوهرية في هذا المجال وإخضاعها لدراسات تفصيلية. وقد عهد إلى عدد من الفرق البحثية بدراسة مثل هذه القضايا التي شملت أهم الموارد الطبيعية (المياه - الأرض - الموارد المعدنية - موارد المطاقة)، والسكان وقسوة العمل، واستخدامات البشر للحيز المكاني. وقد أوشك العدد الأكبر من هذه البحوث على الانتهاء. وثانيهما: النظر إلى القضية الكلية للبيئة والتنمية، وما يتفرع عنها من قضايا التعامل مع الموارد الطبيعية، وقضايا التلوث البيئي، وقضايا السياسات والإدارة البيئية، وقضايا الوعى البيئي. وقد عهد بهذا الموضوع إلى المركز الدولي للبيئة والتنمية الذي يرأسه العالم المصرى الكبير د. مصطفى كمال طلبه، الذي شغل منصب المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة لعشرين عاماً. وتولى إعداد الدراسة الأستاذ الدكتور عصام الحناوي الباحث المصرى المتميز بسعة علمه وثراء خبرته في مجال الدراسات البيئية. وهيذه هي الدراسة التي يحتويها الكتاب الذي بين يدى المقارئ الآن، وهو الكتاب الثالث في سلسلة «مكتبة مصر الكتاب الذي بين يدى المقارئ الآن، وهو الكتاب الثالث في سلسلة «مكتبة مصر الكتاب الذي بين يدى المقارئ الآن، وهو الكتاب الثالث في سلسلة «مكتبة مصر الكتاب الذي بين يدى المقارئ الآن، وهو الكتاب الثالث في سلسلة «مكتبة مصر الكتاب الذي بين يدى المقارئ الآن، وهو الكتاب الثالث في سلسلة «مكتبة مصر».

ومن دواعى سرورى أن أقدم لجمهور القراء هذا الكتاب الغنى بالمعلومات المدققة حول مختلف عناصر البيئة، والزاخر بالتحليلات العلمية الثاقبة للقيضايا البيئية من

المنظور التاريخي، وكذلك ـ وهو الأهم ـ من المنظور المستقبلي. ومن محاسن هذا الكتاب أنه يخوض في موضوعات ذات طابع فني متخصص بأسلوب يجمع في تآلف نادر بين الرصانة العلمية ووضوح العبارة ورشاقتها. ولهذا فهو وإن كان مرجعًا علميًا يشفى غليل الباحثين المتخصصين في الشئون البيئية، إلا أنه سيكون محل ترحيب كبير من عامة القراء الذين تشغلهم ـ أو يجب أن تشغلهم ـ قصايا البيئة. إذ يمكنهم قراءته في سهولة ويسر، والإحاطة بالكثير من الأمور البيئية الدقيقة دون عناء كبير.

والكتاب يحمل إلى القارئ أخباراً عن الأوضاع البيئية الراهنة في مصر لا يمكن وصفها بأنها طيبة (حيث معدلات التلوث أعلى كثيراً من المعايير الدولية في معظم الحالات، وحيث تقصر السياسات الراهنة عن وضع حد للتدهور البيئي وتعجز عن التوفيق بين متطلبات الستنمية وصيانة البيئة). كما أنه يرسم صوراً لا يمكن وصفها بأنها زاهية للأوضاع البيئية المستقبلية في إطار السيناريوهات الخصسة البديلة لمشروع مصر ٢٠٢٠ (حيث الاحتمالات قوية لنفاد موارد مهمة كالمياه والطاقة، وحيث معدلات التلوث مرتفعة، مع احتمال غمر بعض المناطق الساحلية في شمال الدلتا من جراء ارتفاع مستوى مياه البحر المتوسط ـ لأسباب تتعملق بالتغيرات المناخية العالمية ـ بحلول عام ٢٠٢٠). بل إن الكتاب لا يرى أن أيا من هذه السيناريوهات الخمسة قادر على التعامل الجاد مع قضايا البيئة، ويكاد يطرح ما يمكن اعتباره الميناريو البيئة كبديل سادس .

وبطبيعة الحال، فإن مشروع «مصر ۲۰۲» ينشر هذه الدراسة على مسئولية كاتبها، دون أن يتبنى بالضرورة ما ورد فيها من افتراضات وآراء، وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات. فالصورة العامة الشاملة لسيناريوهات المستقبل سوف تتحدد لاحقًا في ضوء عمليات تركيبية وتنسيقية معقدة يجريها الفريق المركزى للمشروع، انطلاقًا من الدراسات الجزئية التى تنجز في المجالات البحثية الاثنى عشر، وليس بالضرورة التزامًا بكل ما جاء فيها. وقد يترتب على ذلك تعديل أو حتى رفض بعض ما اشتملت عليه الدراسات الجزئية، نزولاً على مقتضيات الشمول والاتساق والتعقد. وهذا بالطبع لا يقلل من قيمة ما ينشره المشروع من دراسات جزئية في هذا الكتاب وغيره من مطبوعات المشروع. فخير ما في هذه الدراسات وما تطرحه من الكتاب وغيره من مطبوعات المشروع. فخير ما في هذه الدراسات وما تطرحه من وحسابات، وأنها تستثير لديه حاسة الجدل والمناقشة وطرح آراء ورؤى بديلة. وعلى

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ذلك تظل الدراسة التى يقدمها هذا الكتاب وغيرها من الدراسات الجـزئية للمشروع مادة أساسية لاستثارة التفكير حول المستقبل، والتحاور حول مساراته المحتملة، تمهيدًا للمشـاركة فى صنع ما يتوافق الناس على أنه المسـتقبل الأفضل فى إطار نـظرة أكثر شمولاً وتركيبًا.

إبراهيم العيسوى المستشار بمعهد التخطيط القومى والباحث الرئيسي لمشروع مصر ٢٠٢٠ بمتدى العالم الثالث بالقاهرة



مقدمة عامة

قبل السبعينيات كان هناك تناقض في مفهوم العلاقة بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. وكان اختيار مشروعات التنمية الاقتصادية يتم دون اعتبار للتدهور البيئي الذي قد تحدثه والذي كان ينظر إليه على أنه «ثمن التقدم». وكان النقاش حول المشكلات البيئية في ذلك الوقت متأثرا بدرجة كبيرة بنظرة الدول المتقدمة التي كانت تركز على مشكلات تلوث النظم البيئية الطبيعية (مثل تلوث الهواء والماء إلى غير ذلك)، ونادرا ما نوقشت الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي كانت أساس التدهور البيئي في الدول الأقل نموا.

وفى إطار التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة لبيئة الإنسان الذى عقد فى إستكهولم عام ١٩٧٢ عقدت حلقة دراسية حول البيئة والتنمية فى «فونيه» بسويسرا عام ١٩٧١ كان لها أثر كبير فى توضيح الصلات القائمة بين البيئة والتنمية. ومنذ ذلك الحين، أخذ محور المناقشة يتحول عن فكرة التعارض بين النمو الاقتصادى والبيئة إلى التكامل المكن بينهما. فالمشكلات البيئية لا تقتصر فقط على تلوث الماء والهواء أو على زيادة المخلفات الصلبة والخطرة، أو على احتمال ارتفاع حرارة الجو، أو تآكل طبقة الأوزون، أو استنزاف المواد الأولية، والإضرار بمصادر الحياة الطبيعية، وإنما _ وبنفس الدرجة _ على علاقة كل ذلك بالإنسان ومحيطه الاجتماعي والاقتصادى.

لقد استطاع الإنسان أن يوظف البيئة ومواردها لرفاهيت، إلا أن هذا الاستغلال للبيئة استهدف، منذ الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر وحستى الآن، الحصول على منافع مباشرة دون الالتفات لعواقب ذلك على النظم البيئية الطبيعية المختلفة. وكان الإنسان دائم البحث عن طرق جديدة ليتجاوز بها محدودية الموارد الطبيعية التي تتبحها له هذه النظم.

لذلك نجد أن جذور المسكلات البيئية تكسمن في خصائص المنظومة الاقستصادية الاجتساعية السياسية. ومن هنا فإن الحلول الجذرية لهذه المشكلات تتوقف على إحداث تغيرات في خصائص هذه المنظومة. ولقد شجع على هذه الرؤية دراستان

نشرتا في عام ١٩٧٢، أولاهما صدرت عن نادى روما بعنوان «حدود النمو»(١) والثانية عن مجلة الإيكولوجيست بعنوان «مخطط للبقاء»(٢). فلقد قدم نادى روما سيناريو لمستقبل العالم اعتمد على المتغيرات والتفاعلات بين السكان والإنتاج الصناعي والخدمي وموارد الغذاء والتلوث واستنزاف الموارد الطبيعية. وخلص إلى أنه مع استمرار الوضع في العالم بنفس أنماط ومعدلات ذلك الوقت، فإن ذلك سوف يؤدى، خلال مائة عام، إلى استنزاف شبه كامل للموارد الطبيعية وإلى وجود مستويات مرتفعة من التلوث البيثي ستؤدى إلى كوارث وإلى تفشى الجوع في مناطق متفرقة من العالم، أما تقرير الإيكولوجيست فتناول بصورة عامة العلاقات المتشابكة مين الموارد الطبيعية والسكان وأساليب الزراعة المتبعة وحالة البيئة واحتياجات الدول النامية، وخلص إلى أنه ينبغي خفض الاستهلاك في دول الشمال لإتاحة موارد كافية لنمية دول الجنوب لتفادي إحداث استنزاف في الموارد العالمية المحدودة. ولكن التقرير لم يذكر أية معدلات كمية.

ومنذ مؤتمر إستكهولم عام ١٩٧٧ زاد التأكيد على أن المكونات الطبيعية لكوكب الأرض (أو النظم الإيكولوجية) تشكل في مجملها نظام الحياة الذي يعتمد عليه بقاء البشرية وازدهار مستقبلها. وبذا فإن الاستغلال الرشيد والأمثل لمعطيات هذا النظام هو بمثابة صمام الأمان لبقاء ومستقبل الأجيال. كما زاد التأكيد على أنه يجب ألا ينظر إلى التنمية على أنها مجرد معدل النمو في الدخل القومي أو تراكم رأس المال، وإنما يجب أن تشمل الجوانب النوعية الأخرى مثل تحسين توزيع الدخل وتوسيع الخيارات المتاحة للإنسان من فرص العمالة والدخل واكتساب المعارف والتربية والصحة وغيرها من متطلبات المعيشة الكريمة المادية وغير المادية. بمعنى آخر زاد التأكيد على التنمية البشرية لأن الإنسان هو هدف التنمية ووسيلتها.

فالقصية إذن _ والحل أيضًا _ يكمن في إيجاد أنماط إنمائية بديلة تضمن قابلية استمرار التنمية بدون تدمير للبيئة. ولقد كانت أولى الجهود التي بذلت في هذا الصدد هو صدور «إعلان كوكويوك» عن ندوة استخدام المصادر والبيئة وإستراتيجيات التنمية التي عقدت في المكسيك عام ١٩٧٤ بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. لقد أشار «إعلان كوكويوك» (٣) ونبه إلى التفاوت والفوارق العالمية التي كانت قائمة آنذاك _ وما زالت قائمة _ فيما يخص استغلال الموارد الطبيعية وما يخص التقدم نحو تخفيف حدة الفقر، وشدد على عدة مادئ أهمها :

- ١ ـ أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية هي غالبا السبب الرئيسي للتدهور البيتي.
- ٢ ـ يجب العمل على سد حاجات الإنسان الأساسية دون تجاوز قدرات النظم البيئية المختلفة على الوفاء بهذه الحاجات.
- ٣ ـ يجب أن تكون لدى الجيل الحالى رؤية مستقبلية؛ إذ يجب ألا يستنزف الموارد الطبيعية المحدودة المتاحة له. كما يجب ألا يهدر من نوعية النظم البيئية المختلفة،
 حتى لا يقلل من فرص أجيال المستقبل فى التنمية والرفاهية.

ومنذ ذلك الوقت طرأ تغير كبير على التفكير الإنمائي، واستخدمت عبارات مثل «الأنماط البديلة في التنمية» و «التنمية الإيكولوجية» و «التنمية بدون تدمير» و «التنمية المستدامة» وغيرها للتعبير عن نفس الفكرة وهي أن التنمية والبيئة شيئان مترابطان ترابطًا وثيقًا ويدعم كل منهما الآخر. وأنه إذا صحت المنظومة الاقتصادية الاجتماعية السياسية، صحت البيئة، والعكس صحيح.

لقد تم التأكيد بصورة متزايدة على مفهوم التنمية المستدامة منذ صدور تقرير لجنة الأمم المتحدة للبيئة والتنمية عام ١٩٨٧ (٤). وبالرغم من عدم وجود تعريف دولى معترف به لتعبير التنمية المستدامة، هناك شبه إجماع على أنها تتضمن:

- ١ ـ الوفاء بحاجات الحاضر دون الحد من قدرة أجيال المستقبل على الوفاء بحاجاتها.
- ٢ ـ الإدارة الواعية للمصادر المتاحة والقدرات البيئية وإعادة تأهيل البيئة التى تعرضت للتدهور وسوء الاستخدام.
- ٣ ـ الأخذ بسياسات التوقعات والوقاية، للتعامل مع القضايا البيئية الآخذة فى الظهور عملا بمبدأ «الوقاية خير من العلاج». فلقد ثبت أن هذا أكثر فاعلية وأقل تكلفة من التعامل مع هذه القضايا بعد استفحال أمرها.
- ٤ ـ وضع سياسات للبيئة والتنمية نابعة من الحاجة إلى التنمية القابلة للاستمرار مع التركيز على تنشيط النمو وتغيير نوعيته، ومعالجة مشكلات الفقر وسد حاجات الإنسان، والتعامل مع مشكلات النمو السكاني ومع صون وتنمية قاعدة المصادر، وإعادة توجيه التكنولوجيا وإدارة المخاطر، ودمج البيئة والاقتصاد في صنع القرار.

وصلب مفهوم التنمية المستدامة هو وجوب ألا تقوض الممارسات الحالية مستويات

المعيشة في المستقبل، أي ينبغى للنظم الاقتصادية الحالية أن تحافظ على الموارد والقاعدة البيئية أو تحسنها لضمان نفس المستويات المعيشية أو مستويات أفضل للأجيال القادمة. وفي الماضى كان يفترض أن الجيل القادم سيعيش على كوكب يشبه إلى حد كبير الكوكب الذي يسكنه الجيل الحالي وربما ستتوفر لديه تكنولوجيا جديدة تجعل حياته آمنة وصحية ويسيرة بدرجة أكبر. لكن هذا الافتراض لم يعد له ما يبرره. فالجيل الحالي هو أول جيل توفرت له القدرة على تغيير النظم الإيكولوجية على وجه هذا الكوكب تغييرًا جذريا. وبالتالي فإنه سيورث ذريته كوكبًا مختلفًا (من حيث نوعية الهواء والتربة والماء والحياة البرية) عن الذي ورثه عن أجداده؛ لذا فإن التنمية المستدامة تؤكد على حقوق الأجيال القادمة وعلى ضرورة أن يتحمل الجيل الحالي مسئوليته في مراعاة هذه الحقوق. وربما يكون هذا هو التحدى الرئيسي الذي سيواجهه واضعو السياسات في مطلع القرن الواحد والعشرين.

وفي عام ١٩٩٢ أكد البنك الدولي على ضرورة اتباع أنماط للتنمية المستدامة(٥). وأوضح البنك أنه بمعدلات الزيادة السكانية والإنتاج الحالية سوف يرتفع إنتاج الدول النامية بحوالي ٤ إلى ٥٪ سنويا بين ١٩٩٠ و ٢٠٣٠. وبحلول عام ١٩٩٠ وسوف يكون إنتاج الدول النامية حوالي خمسة أضعاف ما كان عليه عام ١٩٩٠ وسوف يكون إنتاج الدول المتقدمة ثلاثة أضعاف. وبمعنى آخر سيكون الإنتاج العالمي في عام ٢٠٣٠ حوالي ٥,٥ ضعف ما كان عليه في ١٩٩٠. وإذا ما زاد تلوث وتدهور البيئة بنفس معدلات هذا النمو، فسوف يؤدى هذا إلى نقص حاد في المياه، وتلاشي مساحات شاسعة من الغابات واختفاء موائل بيولوجية متعددة، وسوف يموت ويمرض العشرات من الملايين زيادة عن المعدلات الطبيعية بسبب التلوث المبيئي. وأوضح البنك الدولي أنه يمكن تلافي كل هذا الدمار البيئي بوضع السياسات وأوضح البنك الدولي أنه يمكن تلافي كل هذا الدمار البيئي بوضع السياسات الإنمائية المناسبة بيئيا وإيجاد الآليات العالية الكفاءة لتنفيذها.

ومنذ أكثر من مائتى عام يدور الجدل حول العلاقات المتبادلة بين السكان والبيئة والتنمية . فالتفاعل بين الإنسان والبيئة المحيطة به تفاعل ديناميكى يتغير من مكان لآخر ومن فترة زمنية لأخرى طبقا لنشاطات الإنسان المختلفة. وهذا التفاعل ليس حديثًا. فالإنسان الأول الذى عاش على الصيد وعلى جمع النباتات وضبب الوقود عرف أن نشاطاته هذه أدت إلى انقراض بعض الحيوانات والنباتات وسببت له مشاق أكبر فى الحصول على غذائه وحاجاته الأساسية. فبدأ لأول مرة منذ عشرة آلاف سنة تقريبا فى زراعة النباتات التى كان يأكلها واستئناس وتربية الحيوانات بدلا من تقريبا فى زراعة النباتات التى كان يأكلها واستئناس وتربية الحيوانات بدلا من

صيدها. وبدأ في إقامة المجتمعات الزراعية الأولى. وبذا حل الاستقرار محل البداوة والتعرض للمجهول.

وخلال العصور الأولى عرف الناس أن نشاطاتهم فى المجتمعات الزراعية قد تؤدى إلى إلحاق الضرر بالمصادر الطبيعية التى يعيشون عليها. فتدهور إنتاجية الأرض الزراعية نتيجة لتآكل التربة والإفراط فى الرعى وقطع الغابات عرف منذ آلاف السنين فى مصر والصين وأمريكا الوسطى وأدى إلى اختفاء حضارات بأكملها فى بعض المناطق. وكما عرف الناس آثار أفعالهم على البيئة تعلموا أيضًا بعض الأساليب لحماية مصادرها الطبيعية. فاهتم قدماء المصريين والصينيين بالحفاظ على النباتات وزراعة الأشجار على جوانب الترع لحمايتها من التآكل وتثبيت التربة حولها. كما اهتموا وغيرهم بإقامة مناطق لحماية الحياة البرية للإفادة منها _ وهو ما يعرف اليوم بالمحميات الطبيعية.

كانت حاجات الإنسان في تلك الأزمنة محدودة. ولكنها بدأت في التطور والتشعب مع بداية الثورة الصناعية وما تبع ذلك من ثورات علمية وتكنولوجية. ومنذ أكثر من مائة عمام أعرب بعض المدارسين عن قلقهم بشأن التعيرات التي يحدثها الإنسان في البيئة. ففي عام ١٨٠٠ أشار الكسندر فون هومبلدت إلى أن إزالة الغابات وقطع الأشجار في السهول لزراعة النباتات التي تنتج الأصباغ كانت من أسباب خفض مستوى بحيرة فالنسيا في فنزويلا. وفي عام ١٨٦٤ نشر جورج بيركنز مارش كتابه «الإنسان والطبيعة» الذي يعد من أواثل الكتب التاريخية في دراسة العوامل البشرية في تغيير طبيعة الأرض. وفي عام ١٧٩٨ نشر العالم البريطاني توماس مالتوس دراسته الشهيرة التي أوضح فيها أن قدرة السكان على التكاثر والزيادة أكبر بكثير من قدرة الأرض على إنتــاج المواد الغذائية اللازمــة لحياة الإنسان. وهكذا لـن يستطيع الإنسان حل مـشكلة الغذَّاء. إذ سـوف تتناقص كمـية الغذاء بالـنسبة للفـرد إلى أن يأتي الوقت الذي تتـجاوز عنده معـدلات نمو السكان معدلات الزيادة في إمدادات الغذاء. وعندئذ يتحدد عدد السكان بفعل الكوارث مثل المجاعــات وانتشــار الأوبئة والحــروب. على أن مخــاوف مالتــوس هذه لم تتحــقق بالشكل الذي تصوره بسبب عامل لم يكن في حسبانه، وهو التقدم التكنولُوجي في مجالات الإنساج الزراعي. ومع ذلك فهناك الكثير من الشكوك التي تؤرق المهتمين بقضية الإنسان والغذاء على المستوى العالمي، وبدرجة أكبر على المستوى الإقليمي في العديد من المناطق في الدول النامسية. ومن ثم فقد استمر الجدل حـول التوازن بين النمو السكاني وقدرة الموارد الطبيعية على الوفاء بإمدادات الغذاء المناسبة.

وخلال العقود القليلة الماضية اتضح أن العلاقة بين السكان والموارد والبيئة والتنمية معقدة جدا. إذ تتفاعل عوامل السكان والبيئة والتنمية بطرق مختلفة في الأماكن المختلفة. فدرجة التنمية ومحتواها وموقعها وتوزيع منافعها تحدد إلى حد كبير حالة البيئة. وتؤثر هذه العوامل أيضا في نمو السكان وتوزيعهم. من ناحية أخرى توفر الموارد البيئية الأساس للتنمية. ويؤثر حجم السكان ومعدل نموهم ونمط توزيعهم في حالة البيئة، وذلك بقدر ما يتحكم في درجة التنمية وتكوينها.

لقد اكتسبت دراسة أوجه الترابط بين السكان والموارد والبيشة والتنمية اهتماما متزايدا في أوساط علمية كثيرة. والسؤال المطروح في النقاش الدائر هو: هل سيحد النمو السكاني المتسارع وأنماط الاستهلاك المتغيرة من النمو الاقتصادي (والتنمية) خلال العقود القادمة نظرًا لمحدودية الموارد الطبيعية والقيود البيئية ؟ هناك نماذج عالمية وإقليمية كثيرة (٢، ٧، ٨، ٩) استخدمت في محاولة لتحديد استهلاك الموارد وتوافرها في المستقبل (مثل نموذج العالم ٠٠٠٠ الذي صدر في واشنطن، ونماذج الطاقة للمعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية بلاكسنبرج بالنمسا، ونموذج الأمم المتحدة، ونماذج نادي روما العالميين رقم ٢ ورقم ٣ وغيرها). وبسبب أوجه عدم التيقن الكامنة في الافتراضات والعوامل المتضمنة في تلك النماذج، فإن نتائجها لم تكن سوى نتائج إرشادية على وجه التقريب. بيد أن النماذج كانت مفيدة في التعرف على الثغرات في المعرفة. ولا يزال بناء نموذج عالمي أو إقليمي متكامل يضم جميع المتغيرات في معادلة السكان والموارد والبيئة والتنمية يمثل تحديًا للمجتمع العلمي.

إن النمو السكانى لا يؤدى بالضرورة إلى تخفيض مستويات المعيشة أو تدهور نوعية الحياة أو تدهور البيئة. بل إن التقييمات الشاملة والتاريخية لقدرة الأرض وبراعة الإنسان على إنتاج السلع والخدمات قد أدت إلى إسقاطات متفائلة. ذلك أن نمو السكان العالمي واكبته زيادة ثابتة في قدرة العالم على توفير مستلزمات ومرافق الحياة البشرية. وبالتالي فإن المشكلة ليست مجرد مشكلة عدد، بل إنها تكمن أيضًا في التفاوت المتزايد في أنماط الاستهلاك وأساليب العيش بين الأغنياء والفقراء. فولادة طفل في بلد صناعي غنى أو في أسرة ميسورة في بلد نام (حيث الاستهلاك للفرد من الطاقة والمواد مرتفع) تلقى على الأرض عبئا أكبر من العبء الذي تلقيه ولادة طفل في بلد فقير. وبالتالي فإن مسألة حدود النمو ليست لها صلة بالقيود المادية في المرة ماعية والمؤسسية المادية فحسب، بل لها صلة أيضًا بالقيود الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية المناراطة (١٠).

لقد فرض النمو السكانى السريع ضغوطًا متزايدةً على الموارد المالية والطبيعية والبشرية للكثير من البلدان النامية. ومن الواضح أن هذه الضغوط أدت إلى تفاقم مشاكل حدة الفقر وتوفير العمالة وزيادة الإنتاج الزراعى والقيام بالاستشمارات اللازمة فى الهياكل الأساسية وتحسين الأحوال المعيشية لجميع قطاعات السكان فى المجتمع. ومع ذلك فيمكن القول إنه على الرغم من أن النمو السكانى قد عقد إلى حد كبير مهمة التنمية، فإنه لم يحل دون تحقيق قدر من النجاح. فقد زاد فى جميع البلدان النامية تقريبًا تحسن دخل الفرد والإنتاج الزراعى ونسبة الإلمام بالقراءة والكتابة ومتوسط العمر المتوقع لدى الولادة. كما اتخذت تدابير أخرى لتحسين مستوى الرعاية الاجتماعية. وكثيرًا ما يعتبر هذا التحسن دليلاً على أن النمو السكانى لا يعوق التقدم الاقتصادى. لكن واقع الأمر هو أنه كان بالإمكان إحراز قدر أكبر من التقدم لو أن الزيادة السكانية كانت أبطأ (١٠).

ومع تزايد عدد السكان يتزايد الطلب على الغذاء والماء والرعاية الصحبة والمرافق الأساسية والسكن والطاقة والنقل والتعليم ووسائل الترفيه وغيرها. وعلاوة على ذلك، فإن الطلب يتطور مع تزايد التطلع إلى تحسين مستويات المعيشة ونوعية الحياة وانتشار المعرفة والمعلومات المتعلقة بالتغييرات الممكن إجراؤها في أنماط الاستهلاك. ويؤدى الضغط السكاني على المدى الطويل إلى انخفاض مملموس في إنتاجية نظم الموارد الطبيعية المتجددة. وفي مثل هذه الحالات، يؤدى المنمو السكاني إلى زيادة الطلب وانخفاض العرض في آن واحد. وهناك عدة أمثلة على انخفاض قدرة نظم الموارد الأساسية (مثل الغذاء ومصايد الأسماك والغابات والماء وما إلى ذلك) بسبب الموارد الضغط السكاني.

إن مفهوم القدرة الاستيعابية للنظم البيئية مهم بوجه عام بالنسبة لدراسة الصلة بين النمو السكاني وقاعدة الموارد الطبيعية. وهو يعني ضمنًا القدرة على تلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من السكان وتحسين أحوال معيشتهم. وهذا المفهوم مفهوم ديناميكي، فهو يختلف من منطقة إلى أخرى. وهو يتوقف على أسلوب العيش وأنحاط الاستهلاك. ويمكن تحسين القدرة الاستيعابية للنظم البيئية أو توسيعها باعتماد إستراتيجيات إنمائية ملائمة، ومن خلال التقدم التكنولوجي، والإدارة السليمة للموارد، ومن خلال التنمية البشرية بواسطة التعليم والتدريب(١٢). وقد أقيم البرهان على وجود ترابط بين التنمية البشرية والأحوال الاجتماعية ونوعية البيئة. فقد تم إثبات أن انخفاض معدل الوفيات ومعدل الخصوبة راجع إلى تحسين مستوى

التعليم والرعاية الصحية الأولية. كما أن زيادة وعى السكان وقدراتهم تساعدهم على المشاركة على نحو أفضل، وعلى توقع التغيرات المقبلة. وبذلك يتم تعزيز طاقة البشر وقدرتهم على حل المشاكل، ويتم إثراء نظم القيم ودمجها على نحو أوثق فى عملية التنمية (١٠، ١٣).

وقد بحثت أوجه الترابط بين السكان والبيثة والتنمية في عدة مؤتمرات للأمم المتحدة وفي محافل دولية أخرى عُقدت خلال العقود القليلة الماضية. فعلى سبيل المثال، أشار مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة البشرية المعقود في إستكهولم في عام ١٩٧٢ إلى «أن النمو الطبيعي للسكان يثير باستمرار مشاكل بالنسبة لحفظ البيئة، وينبغى اتخاذ السياسات والتدابير، عند الاقتضاء لمواجهة هذه المشاكل.. والبشر هم الذين يقومون بدفع عجلة التقدم الاجتماعي وتوليد الثروة الاجتماعية وتطوير العلم والتكنولوجيها ويغيّرون من خملال جههودهم الدءوبة البيئة البشرية على نحو متواصل»(١٤). وأشار المؤتمر العالمي للسكان المعقود في بوخارست في عام ١٩٧٤ إلى «أنه عندما تكون اتجاهات النمو السكانسي وتوزيع السكان والهيكل السكاني غير منسجمة مع العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فإن ذلك يمكن أن يخلق في بعض مراحل التنمية صعوبات إضافية بالنسبة لتحقيق التنمية المستدامة». وفي مؤتمر بوخارست، أشير إلى أن حـجم السكان ومعـدل النمو السكاني لا يمكن الـتحكّم فيهما بمعزل عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومنذ عام ١٩٧٤، تزايد إدراك حقيقة أن السياسات السكانية ليست بديلا لسياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأن التنمية الاجتماعية ـ الاقتصادية تساعد على تغيير المواقف بالنسبة لحجم الاسرة والخصوبة في كشير من البلدان. وهكذا، فإن المؤتمر الدولي للسكان المعقود في المكسيك عام ١٩٨٤ أقرّ بأن السياسات السكانية والإنمائية الملائمة متعاضدة(١٥).

واعترف مؤتمر المكسيك بأن التحدى المباشر الرئيسى الذى تواجهه السياسة السكانية يتمثل في العدم التوازن بين معدل التغير في السكان والتغيرات في الموارد والبيئة والتنمية». واقترح إعطاء اتجاه بيثى للبرامج السكانية من خلال التشديد على أنه المن أجل تحقيق أهداف التنمية يجب أن تُراعى في تحديد الأهداف والسياسات السكانية الوطنية ضرورة المساهمة في تنمية اقتصادية مستدامة بيئيا على المدى الطويل تحافظ على التوازن الإيكولوجي»(١٥). وعلاوة على ذلك أعلن مؤتمر المكسيك أنه النبغى إعطاء الأولوية لبرامج العمل التى تشمل جميع العوامل السكانية والإنمائية الأساسية، مع المراعاة الكاملة لضرورة ترشيد استخدام الموارد الطبيعية وحماية البيئة

والحيلولة دون استمرار تدهورها». ووردت عبارات مشابهة تقريبا في تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية الصادر في عام ١٩٨٧ تحت عنوان «مستقبلنا المشترك».

وفى الآونة الأخيرة، تم التركيز على تحقيق التكامل بين السياسات السكانية والإنمائية والبيئية. وتنص الإستراتيجية الإنمائية الدولية لعقد الأمم المتحدة الإنمائي الرابع التي اعتمدتها الجمعية العامة في ديسمبر ١٩٩٠ على أنه «ينبغي للبرامج السكانية أن تتكامل مع الأهداف والإستراتيجيات الاقتصادية. . . ويختلف الوضع الديموجرافي من بلد إلى آخر، ولكن في معظم البلدان النامية، سيؤدي خفض معمدل النمو السكاني إلى تخفيف الضغوط التي تتعرّض لها الحالة الاجتماعية، والنمو الاقتصادي، والبيئة والموارد الطبيعية».

ويشير إعلان ريو الذى اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية المعقود فى البرازيل فى يونيو ١٩٩٢ إلى أنه "من أجل تحقيق تنمية مستدامة وتحسين نوعية الحياة بالنسبة لجميع الناس، ينبغى للدول أن تقلل من أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة بل أن تزيلها وأن تعمل على اتباع سياسات ديموجرافية ملائمة». ويخصص جدول أعمال القرن ٢١ الذى اعتمده المؤتمر ذاته فصلين لإيجاز أولويات العمل لتغيير الأنماط الاستهلاكية والتعامل مع الحركة الديموجرافية. وهو يشدد على أن السياسات الشاملة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة ينبغى لها أن تتناول الصلات بين الاتجاهات والعوامل الديموجرافية واستخدام الموارد ونشر التكنولوجيا الملائمة والتنمية (١٦).

ولقد أكدت المبادئ التى أقرها المؤتمر العالمي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة في سبتمبر ١٩٩٤ على أن الإنسان هو مركز اهتمامات التنمية المستدامة وأنه يستحق حياة صحية منتجة تتناسق مع الطبيعة (مبدأ رقم ٢)، وقد نص المبدأ السادس على أن التنمية المستدامة لابد وأن تأخذ في الاعتبار العلاقات المتبادلة بين السكان والموارد والبيئة والتنمية، وأن تدار هذه العلاقات بطريقة ديناميكية ومتناسقة(١٧).

ولقد أكد إعلان كوبنهاجن الذى أقرته القمة العالمية للتنمية الاجتماعية التى عقدت فى مارس ١٩٩٥ على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة هى أركان التنمية المستدامة وهى تشكل إطار المجهودات الرامية إلى تحسين نوعية الحياة لكل الناس. ولقد وردت عدة مبادئ وتوصيات للعمل على حماية البيئة والحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة(١٨).

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

ولكن بالرغم من كل هذه المعانى النبيلة التى وردت فى المؤتمرات والإعلانات والتوصيات مازال الطريق طويلا وشاقا لترجمة هذه المعانى والكلمات المنمقة إلى أفعال وواقع على الأرض، فعلى سبيل المثال بالرغم من كل ما قيل فى مؤتمر قمة الأرض عام ١٩٩٢ وما ورد من مثات التوصيات فى أجندة ٢١، وبعد مضى سبعة أعوام، لم يتحقق سوى أقل من ١٪ من هذه التوصيات. ومن قبل ذلك كان الوضع نفسه قائما بالنسبة لمبادئ وتوصيات مؤتمر إستكهولم ١٩٧٢، مما دفع برنامج الأمم المتحدة للبيئة فى دراستة للوضع البيئى فى العالم خلال العشرة أعوام التى تلت المؤتمر(١٩) من التحذير من استمرار تدهور البيئة فى العالم. ولقد كرر البرنامج التحذير نفسه فى دراسته عن أرضاع البيئة فى العالم فى العشرين عاما التى تلت التحذير نفسه فى دراسته عن أرضاع البيئة فى العالم فى العشرين عاما التى تلت مؤتمر إستكهولم، والتى قدمت إلى مؤتمر قمة الأرض(٢٠).

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الباب الأول ا**لوضع البيئى ال**راه**ن فى مص**ر

الفصل الأول النظم البيئية

البيئة هي الإطار الذي يعيش فيه الإنسان، بما فيه من تربة وماء وهواء، وبما يحتويه كل منها من مكونات جمادية أو كائنات تنبض بالحياة، وبما فيه من طاقة طبيعية واردة من الشمس، وبما يسوده من تغيرات طبيعية في المناخ. ويتميز هذا الإطار بالتوازن الطبيعي بين العناصر المكونة له. وقد أطلق عليه تعبير النظام البيثي أو الإيكولوجي. ومن أمثلته: الغابة، النهر، البحيرة، والبحر. وواضح من هذا التعريف أنه يأخذ في الاعتبار كل الكائنات الحية التي يتكون منها المجتمع البيئي، وكذلك كل عناصر البيئة غير الحية. وللإنسان _ كأحد كائنات النظام البيئي _ مكانة خاصة نظرًا لتطوره الفكرى والنفسي. فهو المسيطر _ إلى حد ملموس _ على النظام البيئي، وعلى حسن تصرفه تتوقف المحافظة على النظام البيئي وعدم استنزافه.

ويتكون النظام البيئى من كائنات غير حية (المواد الأساسية غير العضوية والعضوية في البيئة) ومن كائنات حية تنقسم إلى قسمين: كائنات حية ذاتية التغذية، وكائنات حية غير ذاتية التغذية الكائنات الحية ذاتية التغذية هي الكائنات التي تستطيع بناء غذائها بنفسها من مواد غير عضوية بسيطة بواسطة عمليات البناء الضوئي (النباتات الحضراء). أما الكائنات الحية غير ذاتية التغذية فهي الكائنات التي الضوئي (النباتات الحضراء) عند الكائنات الحية غير ذاتية التغذية فهي الكائنات المحللة. لا تستطيع تكوين غذائها بنفسها وتضم الكائنات المستهلكة والكائنات المحللة. فآكلات الحشائش مثل الحشرات التي تتغذى على الأعشاب كائنات مستهلكة أنسجتها وأجسامها. وتسمى مثل هذه الكائنات «المستهلك الأول»، لانها تعتمد مباشرة على النبات. والحيوانات التي تتغذى على هذه الحشرات كائنات مستهلكة أيضًا. ولكنها تسمى «المستهلك الثاني»، لأنها تعتمد على المواد الغذائية المكونة أيضًا. ولكنها تسمى «المستهلك الثاني»، لأنها تعتمد على المواد الغذائية المكونة تعتمد في التغذية غير الذاتية على تفكك بقايا الكائنات النباتية والحيوانية وتحولها إلى مركبات بسيطة تستفيد منها النباتات، ومن أمثلتها البكتيريا والفطريات. وهناك مركبات بسيطة تستفيد منها النباتات، ومن أمثلتها البكتيريا والفطريات. وهناك

العديد من العلاقات الغذائية التي تنشأ بين الكائنات، نذكر منها: الإفادة أو المعايشة، وتبادل النفع، والتطفل.

وتتفاعل كائنات النظام البيئى مع بعضها البعض، ومع المواد غير الحية والعوامل البيئية في توازن واستقرار. فتقوم النساتات الخضراء بتثبيت الطاقة الشمسية وصنع المواد الكربوهيدراتية. فيدخل بذلك الكربون والطاقة في حلقة الحياة. ثم تنتقل الطاقة التي تثبتها النباتات إلى الحيوان والإنسان عن طريق أكلهما للنباتات الخضراء أو لحيوانات تغذت على النباتات. كما تقوم الكائنات المفككة بتفكيك بقايا وجثث الكائنات الحية وتحولها إلى مواد بسيطة تستعملها النباتات في غذائها وفي تكوين جسمها. وللكائنات المفككة أهمية أساسية في كل نظام بيثي؛ إذ إنها تسمح بإعادة استعمال المواد الغذائية بشكل مستمر، فتؤمن بذلك استمرار النظام البيئي.

والنظام البيئى نظام معقد للغاية لما يحتويه من كائنات حية متنوعة وعلاقات متبادلة فيما بين الكائنات من جهة وبينها وبين الظروف البيئية من جهة أخرى. ومعنى هذا وجود شبكة من العلاقات هي أساس التنظيم الذاتي المتبادل بين الطبيعة والحياة. وهذا التعقيد هو أحد العوامل الأساسية في سلامة كل نظام بيئي. إذ إنه يحد من أثر التغيرات البيئية، أما إذا تتابعت التغيرات البيئية، فإنها تحدث خلخلة في توازن النظام البيئي واستقراره.

ويمكن تعريف استقرار النظام البيئى بأنه قدرة هذا النظام على العودة إلى وضعه الأول بعد أى تغير يطرأ عليه، وذلك دون حدوث تغير أساسى فى تكوينه. ولكن إذا حدث تغير أساسى فى مكونات النظام البيئى فإن هذا يحدث خللا فى التوازن الطبيعى وفى استقرار النظام. ومن شأن هذا التعجيل بتدميره. فمثلا الغابة بطبيعتها نظام بيئى مستقر يمكنه تكييف نفسه طبقا للمتغيرات البيئية الطبيعية العادية، لكن إذا اقتلع الإنسان أشجار الغابة فإنه يحطم بذلك توازنها الطبيعى مما يؤدى إلى نتائج سيئة تنعكس عليه وعلى الكائنات الحية الأخرى التى تعيش فيها، مثل انجراف التربة وزوال الدبال وانسياب الأمطار . الخر.

ومن خصائص النظام البيئى أنه يستخدم فضلاته. فإذا أخذنا النظام البيئى البحرى مشلا فإننا نجد أن الأسماك تخرج فضلات عضوية تقوم البكتيريا بتحويلها إلى مركبات مختلفة تستعمل في تغذية الطحالب التي تتغذى عليها الأسماك. وهكذا لا تبقى الفضلات في ماء البحر الذي يظل محتفظا بصفائه. ولكن هذا التوازن والاستقرار البيئي يتعرض للخلل نتيجة الأنشطة البشرية المختلفة. فقدرة هذا النظام

البيئى البسحرى على التخلص من الفضلات التى ترد عن طريق نشاط الإنسان قدرة محدودة. وتجمع هذه الفضلات دون أن تدخل فى حلقة من التفاعلات الحيوية يشكل خطرًا على النظام. فسمثلا تراكم المخلفات السبلاستيكية غير القابلة للتحلل يؤدى إلى تعطيل النظام البيئى، وتراكم المخلفات السائلة فى مياه البحيرات والأنهار بدرجة تفوق قدرة تحمل هذه النظم البيئية المائية (carrying capacity) يؤدى إلى القضاء على الكائنات الحية بها.

ويمثل الإنسان أحد العوامل المهمة ـ بل العامل الرئيسي ـ الذي يتسبب بنشاطاته في إحداث خلل في التوازن الطبيعي للأنظمة البيئية المختلفة. وتستمر آثار هذا الخلل إلى أن يستعيد النظام البيئي توازنه واستقراره مرة أخرى في ضوء الظروف الجديدة. وعادة لا يصل النظام البيئي إلى التوازن بعد أي تغيير محدود فيه إلا خيلال فترات زمنية طويلة. أما إذا كان التغير كبيراً فإن الاخطار تكون كبيرة وقد تؤدى إلى تعطل النظام البيئي كله في نهاية المطاف. فكثرة استخدام المبيدات الحشرية مثلا يمكن أن تؤدى إلى قتل بكتيريا تثبيت النيتروجين، وهي المسئولة عن دورة النيتروجين في النظام البيئي الطبيعي. ويمكن أن تؤدي أيضاً إلى إبادة الحشرات المفيدة كتلك التي تقوم بنقل حبوب اللقاح وتعمل على تلقيح الأزهار، وبالتالي توفر تكاثر النبات. وهذه جميعها تغيرات خطيرة تؤدى إلى اضطراب كبير في النظام البيئي. فإذا حدث ذلك، استحال على الإنسان تصحيح الخلل وإعادة النظام البيئي إلى وضعه الأصلى.

وبذلك يمكن القول بأن الإنسان يعيش في إطار منظومات رئيسية ثلاث: المحيط الحيوى، المحيط المصنوع، والمحيط الاجتماعي. المحيط الحيوى يتكون من الأنظمة البيئية المختلفة. والمحيط المصنوع يتكون من الأنظمة التي صنعها الإنسان في حيز المحيط الحيوى (المزارع والمدن والصناعات المختلفة والبنية التحية إلى غير ذلك). أما المحيط الاجتماعي فيتكون من المؤسسات والانظمة التي وضعها الإنسان ليدير بها شئونه وعلاقاته مع المحيطين الحيوى والمصنوع. وتتوقف نوعية حياة المجتمع على العلاقات والتفاعلات المتعددة والمتبادلة بين هذه المنظومات الرئيسية الثلاث. وأهم خصائص هذه العلاقات والتفاعلات هي:

١ ـ تعتمد الحياة ونشاط المجتمع على تحويل عناصر المحيط الحيوى إلى موارد. وتتم
 تنمية هذه الموارد في إطار التفاعل بين المنظومات الثلاث. وتوزع الفوائد الناتجة
 من عمليات التنمية طبقا لضوابط المنظومة الاجتماعية.

٢ ـ حتى يمكسن للتنمية أن تتـواصل ينبغي أن تبـقى مخرجـاتها في حــدود الطاقة

الاستيعابية للنظم البيئية المختلفة. فمثلا: ينبغى ألا يتجاوز حجم ما يتم صيده من أسماك قدرة النظام البيئي المائي على توليد وإعالة الكتلة السمكية الحية فيه.

٣ ـ تنشأ المشاكل البيئية نتيجة خلل أو تدهور في بعض التفاعلات بين المنظومات الثلاث. وتحليل وفهم هذه التفاعلات يتيح الفرصة لاتخاذ الإجراءات الوقائية والحيلولة دون حدوث الضرر، أو التوصل إلى طرق العلاج المناسبة إذا ما حدث التضرر البيثي.

التكوين الطبيعي لمصر

تشكل مصر مساحة ما يقرب من مليون كيلومتر مربع في الركن الشمالي الشرقي لإفريقيا، وتكون جزءًا من حزام الصحراء الكبرى الممتد من المحيط الأطلسي، شرقا عبر شمال إفريقيا بكاملها إلى الجزيرة العربية. وتتميز مصر بمناخ دافئ شحيح الأمطار، وكثيرًا ما ترتفع درجة حرارة الجو في مصر إلى ما يزيد على ٤٠ درجة مئوية نهارا في الصيف، ونادرًا ما تنخفض إلى درجة الصفر المئوى حتى في أكثر ليالي الشتاء برودة. ويبلغ متوسط سقوط الأمطار على مصر نحو سنتيمتر واحد في العام، ولا يزيد متوسط سقوط الأمطار على المناطق الساحلية على عشرين سنتيمترًا في العام، وتتمتع مصر بالكثير من ساعات سطوع الشمس؛ فتبلغ ما يزيد على ١٠٤٠ ساعة سنويا في الجنوب. والرياح في مصر قوية نسبيا على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر، وتهب رياح الخماسين المحملة بالأتربة والرمال على مصر في الربيع بين شهرى مارس ومايو.

وتنقسم مصر جغرافيا إلى أربعة أقاليم رئيسية : وادى النيل ودلتاه، الصحراء الغربية، الصحراء الشرقية، وشبه جزيرة سيناء.

يشغل وادى النيل ودلتاه مساحة من الأرض المكونة من الرواسب النيلية بطول يقرب من ١٣٥٠ كيلومترا من حدود مصر مع السودان حتى ساحل البحر الأبيض المتوسط. يمر نهر النيل بعد دخوله مصر عند وادى حلفا ولمسافة ما يزيد على ٣٠٠ كيلومتر، خلال واد ضيق تحيطه الصخور الرملية والجرانيتية إلى أن يصل الشلال الأول جنوبى أسوان. وبإنشاء السد العالى تحولت مساحة كبيرة من الصحراء النوبية على جانبى مجرى النهر جنوب أسوان إلى بحيرة صناعية من أكبر البحيرات فى العالم، وهى بحيرة ناصر. ويتسع وادى النيل تدريجيا شمال أسوان. ثم يتفرع عند

مسافة ٢٠ كيلومــترا شمال القاهرة إلى فرعى دمياط ورشيد الذين يتــجها إلى البحر الأبيض المتوسط شمالا مكونان لدلتا نهر النيل فيما بينهما.

وتمتد الصحراء الغربية من وادى النيل غربا إلى الحدود مع ليبيا وتقدر مساحتها بنحو ١٨١٠٠٠ كيلومتر مربع. وتعتبر فى الأساس منطقة صحراوية شاسعة معظمها مكون من الصخور الرسوبية والكثبان الرملية. ويوجد بها عدد من المنخفضات المغلقة أو شبه المغلقة، من أهمها واحات الخارجة والداخلة والفرافرة والبحرية وسيوه. كما يوجد بها منخفض القطارة الذى يعد واحداً من أكبر وأعمق المنخفضات الطبيعية فى الصحراء الكبرى.

وتمتد الصحراء الشرقية من وادى النيل شرقا إلى البحر الأحمر وخليج السويس. وتتكون أساسًا من سلسلة من الجبال المكونة من صخور القاعدة (الصخور النارية والمتحولة التى تمثل أقدم العصور الجيولوجية في مصر)، تتخللها شبكة من الوديان الرئيسية والفرعية التى تتجه أساسا إلى ساحل البحر الأحمر.

وتغطى شبه جزيرة سيناء مساحة نحو ٦١٠٠٠ كيلومتر مربع. وهى مثلثة الشكل وتفصلها قناة السويس وخليج السويس عن باقى مساحة أرض مصر. ويتكون الجزء الجنوبي من سيناء من سلسلة مرتفعة من الجبال المكونة من صخور القاعدة، وأعلى هذه الجبال هو جبل سانت كاترين الذي يصل إلى ارتفاع يقدر بنحو ٢٦٤١ مسترا فوق سطح البحر. أما شمال سيناء فيتكون من جبال وسهول منخفضة من الأحجار الجيرية والرملية والرسوبيات الاخرى.

وتختلف أنواع الحياة البرية في مصر من منطقة إلى أخرى. فالأنظمة الحيوانية الموجودة في الصحراء الشرقية ترتبط في جزئها الشمالي بتلك الموجودة في سيناء، أما في جزئها الجنوبي فلها خصائص إستوائية (سودانية ديكانية). والأنظمة الحيوانية في شمال الصحراء الغربية فلها خصائص حوض البحر المتوسط، أما في الجنوب فلها خصائص الصحراء الكبرى. ويتأثر التوزيع الجغرافي للنباتات البرية بالمناخ العام في مصر. وتمتد الأنواع النباتية المدارية والمتسللة امتدادًا محدودًا من الجنوب. ولا تمتد الأنواع النباتية من عناصر البحر المتوسط بعيدًا في اليابسة، بل تبقى محدودة في الحزام الساحلي الضيق للبحر الأبيض المتوسط.

ويمثل التكوين الطبيعى لمصر الموضح عاليه النطاق البيئى لمصر والذى يمكن تقسيمه إلى عدد كبير من الأنظمة البيئية من الناحية الأكاديمية. فمثلا يمكن القول إن الساحل الشمالى الغربي نظام بيئى، وإن الصحراء الغربية نظام آخر. كما يمكن

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

القول إن كل واحة من الواحات الموجودة في الصحراء الغربية ومنخفض القطارة تشكل نظاما بيثيا مستقلا. إلخ. وبذلك فإن تقسيم الأنظمة البيئية وعددها يتوقف على الدراسة المزمع القيام بها. ونظرا لأن هذا الاتجاه الأكاديمي يعقد من تقييم حالة البيئة ومتابعة رصد التغيرات في عناصرها الرئيسية ذات الصلة المباشرة بصحة الإنسان ونوعية حياته، فإنه لا يتبع في التقارير السنوية التي تصدرها الدول المختلفة عن الأوضاع البيئية فيها، أو في الدراسات الخاصة بالسيناريوهات المستقبلية لحالة البيئة (أو مكون من مكوناتها). وبذلك سوف تتبع في هذه الدراسة الأنماط العالمية السائدة وهي وصف حالة كل من وسائط البيئة (Environmental media) على حدة، أي حالة الهواء والماء والأرض . . إلخ.

الفصل الثاني الموارد الطبيعية واستغلالها

١٠ الأرض

يبلغ إجمالي مساحة الأرض في مصر نحو ٩٨٨ ألف كيلومتر مربع (٢٥٠ مليون فدان)، يزرع منها نحو ٣٠، وتشغل المرافق والمباني والطرق . . إلخ نحو ٤,٠٪، بينما تخطى الأشجار والأحراج والنباتات البرية حوالي ٢,١٪. وتصنف المساحة المتبقية (حوالي ٩٥٠) بأنها أراض «أخرى» (أي أراض صحراوية جرداء).

ويعيش نحو ٩٨٪ من السكان الذين بلغ عددهم ٥, ٦٦ مليون حسب تعداد (٢١) ١٩٩٦ (٢١) داخل النطاق الضيق لوادى النيل وفي الدلتا والمناطق المتاخمة لهما. أما الباقي (٢٪) في عيشون في المحافظات الصحراوية الحدودية. ولا تتعدى المساحة الماهولة بالسكان في مصر ٥, ٦٪ من إجمالي مساحة اليابسة التي تقدر بحوالي ٩٩٨ ألف كيلومتر مسربع. وبذا يبلغ متوسط الكثافة السكانية في مصر حوالي ٥٠٠ شخصًا على الكيلومتر المربع (يجب حساب الكثافة السكانية على أساس المساحة الكلهولة وليس على أساس المساحة الكلية. فطبقا للأخيرة تكون الكثافة السكانية حوالي ٥٠ شخصا على الكيلومتر المربع. وهذه الكثافة السكانية لا تمثل واقع الضغوط المتزايدة على المناطق المأهولة بما لها من آثار بيئية متزايدة). وتختلف الكثافة السكانية من محافظة إلى أخرى وتبلغ أقصاها في محافظة القاهرة (٢٠٠٠ من ورسعيد (٢٥١٦) والجيزة (٣٤٩٤) والقليوبية على الكيلومتر المربع) يليمها كل من بورسعيد (٢٥١٦) والجيزة (٣٤٩٤) والقليوبية على الكيلومتر المربع) يليمها كل من بورسعيد (٢٥١٦) والجيزة (٣٤٩٤) والقليوبية

يقدر معدل النمو السكاني في مصر في الفترة من ١٩٩٠ ـ ٢٠٠٠ بنحو ٣ . ٢٠٠٠)، أي ٣ . ٢٠٠٠ أن عدد سنويا (حسب تقرير البنك الدولي ـ التنسمية في العالم، ٢٠٠٠)، أي أن عدد سكان مصر في ١/١/ ٢٠٠٠ كان نحو ٦٦ مليون نسمة.

وتوضح الإحصائيات أنه في عام ١٩٧٦ كان نسبة السكان الذين يعيشون في ما يسمى بالمناطق الحضرية تبلغ ٤٣,٨٪. وارتفعت هذه النسبة إلى ٤٤,٠ في عام

١٩٨٦، ثم انخفضت إلى نحو ٢,٢١٪ في عام ١٩٩٦(٢١). وهذا الانخفاض ليس معناه انخفاض عدد المهاجرين من الريف إلى المدينة أو أن هناك هجرة عكسية من المدينة إلى الريف، وإنما يرجع إلى انخفاض معدلات النمو السكانى الطبيعية في المناطق الحضرية عنها في المناطق الريفية. ففي الفترة من ١٩٨٦ إلى ١٩٩٦ زاد سكان الحضر بنسبة ١٩٪ في حين زاد سكان الريف بحوالي ٢٦٪. وتوضح الاحصائيات أن معدلات الخصوبة في المناطق الحضرية (تتراوح بين ٢,٨٢ و و ٢,٨٢)، أقل منها في المناطق الريفية (تتراوح بين ٣,٤٥ و ٢,٥٠).

توضح بيانات البنك الدولى المنشورة فى تقريره عن الستنمية فى العالم عام ٢٠٠٠ أن نسبة سكان الحضر فى مصر لم تنخفض وكانت٤٤٪ فى عام١٩٨، وأنها رادت إلى ٤٥٪ فى عام ١٩٩٧.

ومن المرجح أن اختلاف نسب التحضر في الإحصاءات المصرية عنها في إحصاءات البنك الدولي يرجع إلى الاختلاف بين المصدرين في تعريف كل من الريف والحضر.

أما بالنسبة للأرض الزراعية فلقد زادت مساحة الأرض المزروعة في مصر زيادة مسحدودة في الفترة من عام ١٩٧٠ إلى عام ١٩٩٩ (جدول رقم ١)، ولكن مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان تناقص خلال تلك الفترة متوسط ما يخص الفرد من الرقعة المزراعية من حوالي ١٨، و فدان إلى ١٢، فدان. وتعتبر هذه الحصة من أقل المعدلات في العالم.

جدول رقم (١) مساحة الأرض الزراعية في مصر

متوسط ما يخص الفرد (فدان)	مساحة الأرض الزراعية (فدان)	السئة
٠,١٨	۵۳۲۵۰۰۰	197
٠,١٦	۵۷۹۷۰۰۰	1974
.,18	0AYE · · ·	194
٠,١٢	0979	1984
٠,١٢	77	199.
٠,١٢	٧٥٠٠٠٠	1990
.,17	yy	1994

المصدر: تم حساب الجدول من الكتب السنوية للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء(٢١) ومن بيانات البنك الدولي ومنظمة القاو. ويتم رى ٩٨٪ من الأراضى الزراعية بالطرق التقليدية، في حين تستخدم وسائل الرى الحديثة في بقية الأراضى (٢٪)، ومعظمها من الأراضى المستصلحة حديثا. وتوضح الإحصائيات أن إجمالي المساحة المحصولية قسد زاد زيادة متواضعة من ١٢٠٣ مليون فدان في ١٩٩٩ .

وتختلف مساحة الأرض الزراعية من محافظة إلى أخرى. ففي المحافظات الحضرية (القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس) لا تزيد نسبة المساحة المزروعة فيها عن ٤, ٧٪ من إجمالي مساحة تلك المحافظات، في حين تصل نسبة المساحة المزروعة في محافظات الوجه البحري إلى ٦, ٥٦٪ من مساحتها. أما في الوجه القبلي فتصل المساحة المزروعة إلى ٥, ٥٨٪ من مساحة محافظاته. وفي المحافظات الحدودية، التي تبلغ مساحتها الإجمالية ٨٥٣ ألف كيلومتر مربع، لا تتعدى مساحة الأرض المزروعة فيها ١,٠٪.

وبصورة عامة يمكن تقسيم الأراضي الزراعية في مصر كالتالي (٢٢):

- ١ ,٦٪ أراضٍ من الدرجة الأولى (أى أراضٍ تعطى أعلى إنتاجية).
 - ـ ٨ , ٤٤٪ أراضٍ من الدرجة الثانية.
 - ـ ٣٨,٩٪ أراضٍ من الدرجة الثالثة.
- -٢ . ١٠٪ أراضٍ من الدرجة الرابعة (أي أراضٍ تعطى أدنى إنتاجية).

ومنذ ١٩٥٢ تم استصلاح حوالى ٣ مليون فدان (جدول رقم ٢)، ولكن تباينت المساحات المستصلحة من عام إلى آخر. ومنذ السبعينيات تثار تساؤلات كثيرة حول الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لاستصلاح الأراضى. فمعظم مشروعات الاستصلاح الكبرى كان العائد منها متواضعًا، وأدى التسرع في استزراعها وأساليب إدارتها إلى إيجاد العديد من المشاكل الفنية والاقتصادية والبيئية، خاصة التشبع بالمياه (التطبيل) وزيادة التمليح . . إلخ (٢٣).

جدول رقم (٢) مساحة الأرض المستصلحة

المباحة المتصلحة (ألف قدان)	السنة	
۸۷۲/	197A /190Y	
AY	1971 /1974	
177-	1990 /1977	
۷۵	1997/1990	
70	1997 /1997	
44	1994 /1994	
7.90	إجمالى	

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (٢١)

وبالرغم من محدودية الأراضى الزراعية، فقدت مساحة تقدر بنحو ٧٥٠ ألف فدان من الأراضى الزراعية الجيدة في الفترة من ١٩٦٠ إلى ١٩٩٠ لتحويلها إلى استخدامات غير زراعية (مبان ـ طرق ـ مصانع . . إلخ). ويقدر متوسط ما يفقد من الأراضى الزراعية لهذه الاستخدامات منذ عام ١٩٩٠ بنحو ٢٥ الف فدان سنويا (قدرت هذه المساحة بنحو ٣٠ ألف فدان سنويا في التقرير الرسمى للبرنامج الوطني لمكافحة التصحر الذي قدمه جهاز شئون البيئة للأمم المتحدة في مايو ١٩٩٩).

وتمثل الأرض الزراعية والمياه أهم مكونات قاعدة الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها الزراعة. وتوضح الأرقام عدم مواكبة التوسع الزراعي الأفقى للزيادة السكانية في مصر ــ الأمر الذي يعبر بصورة واضحة عن محدودية الموارد الطبيعية وصعوبة إضافة أراض جديدة، وذلك لأسباب عديدة منها عدم وجود أراض يمكن استصلاحها أو عدم توافر الاستثمارات المناسبة. ومن ثم يصبح عدم توفر المياه اللازمة لريها، أو عدم توافر الاستثمارات المناسبة. ومن ثم يصبح المدخل الوحيد المتاح هو تكثيف استخدام مورد الأرض والارتقاء يإنتاجيته. وبوجه عام هناك أربعة مداخل رئيسية يمكن من خلالها تحقيق التكثيف الزراعي :

 ١ ــ زيادة إنتاجية المحاصيل لوحدة المساحة من الأرض والمتر المكعب من المياه لوحدة الزمن (السنة).

٢ ـ زيادة عدد المحاصيل المزروعة في نفس المساحة في السنة. ويتم هذا من خلال زيادة عدد المحاصيل التي تزرع في نفس المساحة في السنة على التوالى أي التكثيف المحصولي، أو زراعة أكثر من محصول في نفس المساحة في نفس الموقت على التوازي، أي تحميل محصول على آخر، أو كلاهما.

٣ ـ التحـول من زراعات أقل قيمة نقدية إلى أخرى أعلى قيمة نقدية، وإدخال محاصيل جديدة.

التحول بالزراعة إلى صناعة (مثل استخدام الصوبات في زراعة الخضر والفاكهة تحت ظروف يتم التحكم فيها، والمزارع لإنتاج البيض واللحوم البيضاء، والمزارع السمكية . . إلخ).

ولكل من هذه المداخل إيجابياته وسلبياته الاقتصادية والاجتماعية وآثاره البيشية المختلفة. وتوضح الدراسات المختلفة (على سبيل المثال ٢٦,٢٥,٢٤) أن التكثيف الزراعي يتطلب مدخلات عالية (مياه للري، أسمدة كيماوية، مبيدات، طاقة إلى غير ذلك)، وكلما كانت نوعية الأرض منخفضة، زادت المدخيلات اللازمة لرفع إنتاجيتها. ولذلك آثاره على استخدام الموارد المختلفة وعلى حالة البيئة. فالإفراط في الرى يؤدى إلى تجـريف مغـذيات التربة ويخلـق مشـاكل ثانوية مثل التـشبع بالميـاه (التطبيل) والتمليح وزيادة القلوية . . إلخ. كما أن زيادة استخدام الأسمدة والمبيدات لها آثارها السلبية على النظم البيئية المختلفة. بالإضافة إلى هذا أدى التوسع في استخدام أصناف البذور عالية الإنتاجية (والمستوردة) إلى اضمحلال قماعدة التنوع الجيني المحلى للنباتات. ولقد ترتب على تكثيف الزراعة مشاكل اجتماعية واقتصادية مختلفة، فغالبا يتعذر على صغار المزارعين الحصول على الحزم التكنولوجية اللازمة لتكثيف الزراعة. ولذا تظل إنتاجية مزارعهم منخفضة. ولقد ترتب على هذا هجر الأعداد المتزايدة من صفار المزارعين لأراضيهم (أو ترك مهنة الزراعة). ومن جهة أخرى اضطرت أعداد متزايدة من المزارعين إلى تغيير أنماط زراعاتهم إلى زراعة المحاصيل التي يستهلكها أهل الحيضر (مثل الخضراوات والفاكهة) أو التي يطلبها المصدرون لأنها محاصيل أكثر ربحية.

ويوضح جدول رقم (٣) التغيرات الرئيسية التي حدثت في التركيبة المحصولية في مصر خلال الفترة من ١٩٧٥ إلى ١٩٩٥ وتم فيها التركيز على تكثيف الزراعة باستخدام المداخل الأربعة المشار إليها عاليه. وأهم معالم هذه التغيرات هي الزيادة الكبيرة في المساحات المزروعة بالخضراوات والفاكهة (وهي زراعات أعلى قيمة نقدية للاستهلاك الحيضري والتصدير)، وزيادة المساحات المزروعة بالقسمح والأرز (باستخدام أصناف البذور عالية الإنتاجية)، والانخفاض الكبير في المساحات المزروعة بالقطن.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

جدول رقم (٣) المساحات المزروعة في مصر (ألف فدان)

ناكهة	فضر	برسيم	لمول	ذرة	أرز	تطن	نبح	السئة
4 8	707	77.7	400	7177	471	1477	18.4	1901
717	٧٩.	TYOY	794	44.10	1.74	1784	1897	1940
771	۸۷۷	11/1	777	7710	177	1710	1441	194.
£ a ¥	444	446.	779	3077	940	1.41	1141	1940
778	460	777.	720	7740	1.77	997	1400	199.
908	1 - 27	754.	[* Y ·	7897	18+1	[V\-	7017	1990

المصدر: تم حساب الجدول من الكتب السنوية للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء (٢١) ملاحظة: الذرة تمثل الذرة الرفيعة والشامية.

ولقد صاحب سياسات تكثيف الزراعة والتغيرات في التركيب المحصولي زيادة واضحة في استخدام الأسمدة الكيماوية. ويوضح جدول رقم (٤) تطور استخدام الأسمدة في مصر منذ ١٩٧٥. ويقدر معدل استخدام الأسمدة في مصر حاليا بنحو ٣٧٥ كيلوجرام للهكتار وهو معدل مرتفع بالنسبة للمعدل المستخدم في مجموعة الدول الأوروبية (٣٣٤ كيلوجراما) أو في أمريكا (١١٣ كيلوجراما). ويرجع ارتفاع الكمية المستخدمة في مصر أساسا إلى انخفاض خصوبة الأرض والاستخدام غير الرشيد للأسمدة. وفي مصر تشكل الأسمدة الأزوتية حوالي ٨٠٪ من إجمالي الأسمدة المستخدمة، يليها الفوسفات (١١٠٪)، ثم البوتاسيوم (٤٪).

جدول رقم (٤) كميات الأسمدة المستخدمة في مصر

کیلوجرام/ هکتار	إجمالي الأسمدة المستخدمة (بالطن)	السبئة
144	0.1197	1940
141	7770	144.
787	۸٦٣a٠٠	1440
478	978410	199.
770	1772770	1990

إجمالى الأسمدة = الفوسفات (خامس أكسيد الفوسفور)+ الآزوت (نيتروجين) + البوتاسيوم (أكسيد بوتاسيوم). المصدر: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) ـ تقارير الأسمدة. ملاحظة ١٠ هكتار ـ ٣٨ , ٢ فدان .

الملاحظات على بيانات الاسمدة

البيانات الواردة في كتب الحهاؤ المركوي للتعنة والإحصاء عمل كميات الاسهدة كما على مباعة ولا فقل الملحقوي من العاصر المقلية ومن الناعلة العلمية ترجاعة قيما يتملق بالقيم السي يلمي التعبير عن استخدام الاستدة تحجواها من المركبات الشعالة (كما هو الحال في إحضافات منظمة المفاود والملك المدرلي)، حب إن الأسميدة المباعة تختلف في تركبها وصحواها من هذه المركبات فلا يحلوي منصاد السوير فوصفات الاجادي على حوالي ١٥٪ حالي أكساء الموصور (المركب المعالي) في حين يحنوي شماذ السوير فوصفات الاجادي بسائلة ٢ على من يحوالي ١٥٪ وهذا مناه أن العلى الواحد من سعاد السوير فوسفات اللائل يعمل الحوالي ١٥٪ وهذا مناه أن العلى تختلف السكة الأروت في سحواها من العصر الفعال لذا يحت الحرص في استخدام احصافات الاسميدة خاصة إحتصافات عا يعد ١٩٠١ إذ توضح الارقيام الوارقة في الكت المنوية للحيهاد المركزي للتحديد والاحتماء أن هناك النقاما عادا في استخدام الاستدة في مضر من ١٩٩٨ إلى ١٩٩٠ وود أن لوصح أساب هذا الالخفاص في التالي

- إ. علما الانجفاض لا يمكن أن يرجع إلى فترشيده استسدام الاسمدة حـــ إن الترشيد لا يمكن
 إن يؤدى إلى خطص استخدام الاسمدة بالخر من ١٥٠ (أي إلى أقل من النصف) كل سنة والواقع أن ممدل استخدام الاسمدة (بحساره المادة المعملة) قد ارتقع.
- التركيبة المحصولية في عام ١٩٩٥ أكثر كنافة منها في عام ١٩٩٠ (بهندل ٢) وهذا معاه
 استخدام المنملة أكثر وليس المل
- ٢- أسبات هذا الانجفاض الطاهري تعود إلى 1 (1) استخدام كميات أكميز من الاحداد الى تحتوي على تركيرات أصل من المواد الفعالة (انظر منتال الفوسفات هلك) ((ن) الإحصابيات بعد 199 تمثل الاستخداد الموادعة بمعرفة البلك المرابس للشعبة والانتمال الزراعي (انظر الكان السنوي للجهاد المركزي للسنعت والإحصاء 1999) وهي بدلك لا شمس الكميات التي يتم شراؤها مواضطة القطاع المعاش بعد تحرير تجارة الاستخدة وزفع الملك بمنابة المعام المعاش المحتوية المرابسة المرابسة المعام على المحتوية المحت
- ق يمكن تغلير كمات الأسملة المستخدمة عام ١٩٩٥ من واقع المسات المحمولة ومقررات الاسملة لكل فلدان، ومعملية جناية ينصح الذكمة الاسمنة المستخدمة كانساسوالي ٢٠٠٠ مليون طن فركبات فعالة وهو ما يتمن علي حوالي ٢٠٠١ مليون طن مركبات فعالة وهو ما يتمن مع أدفام النفاؤ والمسك الدولي. وهذا يوضح أن الكمية الملكورة في كتبات الجهاز المركزي للعشة والإحصاء (١٧٤٠ الف طن أسعدة مباعنة) تمثل جزءا ضبلا من الاعمدة المستخدمة فعلا لاتها عمل ما ولاع بمعرفة الدولة (بنك الاصان) الرواعي).
- ٥ توضيح البيانات الصادرة عن الفاو عنام ٢٠٠٠ أن استخدام الاستمناء في منضر كان
 ١٠٠٠ ، ١٠٩٧ ، ١ طن في عام ١٩٩٦ و ١٥٠٠ ، ١٠ طن في عام ١٩٩٧ .

أما بالنسبة للمبيدات المستخدمة، فتتغير أنواعها وكمياتها من عام إلى آخر. ففى عام ١٩٨٠ استخدم حوالى ٢٠١٩ طنا من المبيدات (منها ٢٠٥ طن د.د.ت، ٣٣٢٨ طنا الدرين، ٢٦٧٩ طن مسركبات كلوروهيدروكربون أخسرى، ٢٣٧ طنا ملاثيون، ٥١٥ طنا مبيدات حشائش . إلخ طبقا لبيانات الفاو). وتتغير أنواع المبيدات (وبالتالى كمياتها) طبقا للتركيبة المحصولية وطبقا لظهور المناعة لدى الحشوات للمبيد المستخدم. وفي الحالة الأخيرة يستبدل المبيد بآخر أكثر سمية للحشرات. ويوضح جدول رقم (٥) كميات المبيدات التي استخدمت. ومنه يتضح الانخفاض الكبير المفاجئ في استخدام المبيدات منذ ١٩٩٠. ويرجع هذا الانخفاض الى:

- (أ) استخدام أنواع أخرى من المبيدات أكثر سمية للحشرات (وبالتالي تكون أوزانها أقل).
- (ب) الإحصائيات بعد عام ١٩٩٠ تمثل المبيدات الموزعة بمعرفة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ولا تتضمن الكميات التى يشتريها القطاع الخاص. ونظرا لعدم توافر البيانات عن أنواع المبيدات المستخدمة وكمياتها الحقيقية فإن ذلك يعقد من عمليات التقييم البيئي لها حيث إن المبيدات يختلف بعضها عن البعض الآخر في درجة بقائه في التربة والفترة الزمنية اللازمة لتحلله طبيعيا. كما تختلف المبيدات في ذوبانها ودرجة إزاحتها مع مياه الصرف الزراعي، وكذلك في درجة حركتها في التربة (وبالتالي تلويثها للمياه الجوفية. . إلخ).

جدول رقم (٥) استخدام المبيدات في مصر

طن سنويا	السنة
70097	1940
7.197	۱۹۸۰
74.621	1940
10.99	199.
٥٣٨٥ (؟)	1990
3°V (1)	1997

المصدر : الكتب السنوية للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء (علامات الاستفهام في الجدول من وضع المؤلف). هذا وتوضح بيانات الفاو الإحصائية المنشورة عام ٢٠٠٠ أن قيمة استسيراد مصر من المبيدات المختلفة بلغ نحو ٩٠ مليون دولار عام ١٩٩٨.

٧ المياه

تتكون مصادر المياه في مصر من :

- ١ ـ مياه نهـ النيل الذي يعتبر المصدر الرئيسي للمياه. وتبلغ جملة تصريف النهر الطبيعية (أي بدون سدود أو خزانات . . إلخ) عند أسوان نحو ٨٤ مليار متر مكعب سنويا. وطبقا لاتفاقية النيل عام ١٩٥٩ يبلغ نصيب مصر الثابت من مياه النيل ٥ . ٥٥ مليار متر مكعب سنويا.
- Y _ مياه جوفية متجددة في وادى النيل والدلتا تختلف تقديرات مخزونها (قد يصل إلى نحو ٣٠٠٠ مليار متر مكعب) ولكن لا يمكن سحب أكثر من ٣ مليار متر مكعب سنويا منها لأسباب اقتصادية وفنية وللحفاظ على التوازن الهيدروجيولوجي في هذه المناطق. وتتغذى طبقات المياه في هذه المناطق من الرشح من النيل ومياه الرى. وفي شمال الدلتا تزداد ملوحة المياه الجوفية نتيجة تداخل مياه البحر.
- ٣ ـ مياه جـوفية متجـددة على امتداد الساحل الشمـالى الغربى من الإسكندرية إلى السلوم مصـدرها الرئيسى مـياه الأمطار التي يصل مـعدلهـا إلى نحو ١٥٠ مم سنويا. وتقدر كمية الأمطار والسيول المتساقطة سنويا بنحو ١١ مليون متر مكعب يستـغل منها حوالى ٢,٢ مليـون متر مكعب في الزراعـة (تستخـدم في المنطقة الأبار الرومانية لتخزين بعض هذه المياه).
- ع مياه جوفية غير متجددة في الغالب في الصحاري المصرية خاصة في الصحراء الغربية وسيناء (غالبا في الحجر الرملي النوبي والصخور الجيرية). وتختلف تقديرات مخزونها وأعماق خزاناتها. ويقدر أقصى سحب آمن منها بحوالي ٩, ٤ مليار متر مكعب سنويا.

وبذلك تكون أقصى كمية من المياه يمكن سحبها من المصادر الطبيعية هي نحو ٢٤ مليار متر مكعب سنويا.

وبالإضافة إلى هذه المصادر الطبيعية هناك كميات من مياه الصرف الزراعى والمخلفات السائلة يمكن تدويرها خاصة لأغراض الرى وبيانها كالتالى:

- 1 ـ تقدر كمية مياه الصرف الزراعى بنحو ١٢,٥ مليار متر مكعب سنويا تتراوح ملوحتها بين ٧٠٠ و ٣٠٠٠ جزء في المليون. وتتوقف الأجزاء التي يمكن إعادة استخدامها من هذه المياه على كمية المياه العذبة المتاحة واللازمة لخلطها مع مياه الصرف الزراعي لخفض درجة ملوحتها. كما تتوقف أيضًا على درجة تركيز الملوثات في مياه الصرف الزراعي (تستقبل مصارف زراعية كثيرة كميات متنوعة من مخلفات الصناعة والصرف الصحى غير المعالج). وعلى أحسن تقدير يمكن الإفادة من حوالي ٦ مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي سنويا.
- ٢ ـ تقدر كـمية الصرف الصحى بحـوالى ٢,٥ مليار متـر مكعب فى السنة يمكن معالجـة حوالى مليار متـر مكعب منها للاستخدام فـى رى الأراضى الصحراوية (الكميات المعالجة سوف تختلف باختلاف الموقع والتكاليف).

وبذلك تكون أقصى كمية من مياه الصرف الزراعى والمخلفات البلدية السائلة التي يمكن تدويرها هي حوالي ٧ مليار متر مكعب سنويا.

وفي عام ١٩٩٦ أمكن سحب الكميات التالية من المياه من المصادر الطبيعية:

- _ ٥ , ٥٥ مليار متر مكعب من نهر النيل.
- ـ ٧, ٤ مليار متر مكعب من المياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة.
 - أى حوالي ٢٠,٢ مليار متر مكعب تم استخدامها كالتالي :
 - ـ ۸۳,۲ ٪ للري
 - ـ ٨ , ٩٪ للصناعة
 - ـ ٥,٥٪ للأغراض المنزلية والتجارية
 - _ ٥,١ ٪ لاستخدمات أخرى

وبذلك كان نصيب الفرد من المياه المسحوبة من المصادر الطبيعية حوالى ٩٧٩ مترا مكعبا في السنة، أى أقل من موشر الضغط المائي (Water Stress Index) وقيمته المعب للفرد في العام. وتوضح التقارير العلمية أنه إذا انخفض نصيب الفرد من المياه في العام تحت هذا المؤشر، فإن ذلك يؤدى إلى آثار ملبية على عمليات التنمية المختلفة وعلى صحة الإنسان. وتجدر الإشارة هنا إلى أن نصيب الفرد من المياه في مصر قد انخفض عن هذا المؤشر اعتباراً من عام ١٩٩١.

وبالإضافة إلى كمية المياه المسحوبة في عام ١٩٩٦ من المصادر الطبيعية، تم تدوير حوالي ٣,٩ مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي ونحو ٥٠٠ مليون متر مكعب من المخلفات البلدية السائلة لاستخدامها في الري.

٣ الطاقة

المصادر الرئيسية للطاقة التجارية في مصر هي النفط والغاز الطبيعي وطاقة المياه. وتوجد في مصر إمكانيات لاستغلال مصادر الطاقـة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولكن مساهمتها في إجمالي إنتـاج الطاقة في مصر مازال مـتواضعا للغاية.

ولقد بلغ الاحتياطى المؤكد من النفط فى مصر فى آخر ديسمبر ١٩٩٧ حوالى ولقد بلغ الاحتياطى المؤكد للغاز الطبيعى ودل مليار برميل (نحو ١٤٠ مليون طن)، كما بلغ الاحتياطى المؤكد للغاز الطبيعى فى نفس التاريخ ٨٩٢ مليار متر مكعب (نحو ٧٤٣ مليون طن نفط مكافئ)، وذلك طبقا لبيانات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. ولا تملك مصر التصرف إلا فى حوالى ثلثى تلك الاحتياطيات طبقا للاتفاقيات الموقعة مع الشريك الأجنبى الذى يبلغ نصيبه من الإنتاج الكلى نحو الثلث فى المتوسط على مدى عمر الحقل أو مدة العقد التى تمتد عادة إلى ٣٥ سنة. وهذا معناه أن نصيب مصر من تلك الاحتياطيات هو فى الواقع ٢٧٣ مليون طن نفط و ٥٩٥ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى.

ويوضح جدول رقم (٦) تطور إنتاج الطاقة التجارية في مصر منذ ١٩٧٥. ومنه يتضح أنه في عام ١٩٧٦ كان النفط يشكل حوالي ٣, ٧٧٪ من الطاقة المنتجة يليه الغاز الطبيعي (٣, ٢٢٪) ثم الطاقة المائية (٤, ٥٪). وتوضح البيانات زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بمعدلات كبيرة في الفترة ١٩٨٠-١٩٩٥. ويوضح جدول رقم (٧) تطور استهلاك الطاقة التجارية في مصر منذ ١٩٧٥، ويلاحظ ثبات كمية البترول تقريبا منذ عام ١٩٩٠ وزيادة حصة الغاز الطبيعي. ويرجع ذلك إلى سياسة إحلال الغاز الطبيعي محل البترول كلما أمكن ذلك لأسباب اقتصادية بالدرجة الأولى. فالكميات التي يمكن توفيرها من البترول هي بمثابة كميات تضاف إلى الاحتياطي الإستواليجي الموجود ؟ وبذلك يمكن مد عمر هذا الاحتياطي للتصدير والاستهلاك المحلى. وبالإضافة إلى ذلك فإن تصدير البترول أسهل وأكثر مرونة من تصدير الغاز الطبيعي. وبذلك فإن إحلال الغاز الطبيعي محل البترول في بعض الاستخدامات لم

يكن لأسباب بيئية بحـــتة كما يتــردد، وإنما جاءت المزايا البيئــية كناتج ثانوى من هذا الإحلال.

جدول رقم (٦) إنتاج الطاقة التجارية في مصر (مليون طن نفط مكافئ)

السنة	بترول خام	غاز طبيعى	طاقة مائية	إجمالى
1940	11,7	_	٧,٠	11,4
194.	74,7	1,7	٠,٩	41,4
1940	٤٣,٢	٤,٧	۲,۵	٤ ه
199-	٤٣,٦	Α, ξ	٧,٨	0 E , A
1990	88,1	17,7	۳,۰	04, E
1997	£Y,V	14,4	۳,۲	49,1
1994	*٤٠,٣	*17", V	۳,۲	7, 70

المصدر: تم حساب الجدول من بيانات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول والبنك الدولى * عن «حمدى البنبي: البترول المصرى ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ ١٩٩٩ ؛

جدول رقم (٧) استهلاك الطاقة التجارية في مصر (مليون طن نفط مكافئ)

إجمالى	طاقة مائية	خاز طبیعی	بترول	السنة
۸٫۸	٠,٧	٠,٠٤	٧,٥	1940
18,4	٠,٩	١,٩	11,0	194.
78.7	۲,٥	۳,۵	17,7	1940
٣٠,٣	٧,٨	٥,٩	7.,9	144.
77, 1	۳,۰	9,0	۲۰,۵	1990
70,7	۲,۲	4,4	41,8	1997
٧٦,٧	٣, ٢	11.7	44, £	1997

المصدر: تم حساب الجدول من بيانات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول والبنك الدولى ـ الفحم يستخدم في بعض الصناعات.

وتوضح بيانات البنك الدولى (٢٧) أن استخدام الفرد من الطاقة التجارية فى مصر قد ارتفع من حوالى ٣٩٠ كيلوجراما نفط مكافئ عام ١٩٨٠ إلى ١٣٨ كيلوجراما نفط مكافئ عام ١٩٨٠ إلى ١٣٨ كيلوجراما نفط مكافئ فى ١٩٩٦، بمعدل زيادة سنوى قدره ٣٪ خلال تلك الفترة. وبالرغم من المجهودات الرامية إلى ترشيد استخدام الطاقة ورفع كفاءة إنتاجها واستخدامها، والتى توضح ظاهريا أن نسبة الناتج المحلى الإجمالي لكل كيلوجرام نفط مكافئ قد زادت من ١,١ دولار عام ١٩٩٧ إلى ١,١ دولار عام ١٩٩٧ بالأسعار الجارية، إلا أن بيانات البنك الدولي(٢٧) توضح أن هذه النسبة قد

انخفضت من ١,٨ دولار عام ١٩٨٠ إلى ١,٦ دولار عام ١٩٩٦ بالأسعار الـثابتة (بدولار ١٩٩٥ الثابت). وتعتبر كـفاءة استخدام الطاقة التجارية في مـصر منخفضة إلى درجة كـبيـرة بالمقارنة مع دول المجمـوعة الأوروبيـة، حيث بلغت نسـبة الناتج المحلى الإجمالي لكل كيلوجرام نفط مكافئ نحو ٢,٣ دولار.

وفى عام ١٩٩٦ كان توزيع استخدام الطاقة التجارية فى مصر على القطاعات المختلفة كالتالى:

- ـ ٥٠٪ في الصناعة.
- ـ ١٨٪ في المنازل والمحال التجارية.
 - ٢٩٪ في النقل.
 - ١ ٪ في الزراعة.
 - ۲ ٪ في أغراض أخرى.

وبالنسبة للكهرباء ارتفع حجم توليد الكهرباء في مصر من ١٩٨٩ مليار كيلووات ساعة في عام ١٩٩٦ إلى حوالي ٢٥٧٥ مليار كيلووات ساعة في عام ١٩٩٠ (٢٧). وكانت مصادر توليد الكهرباء في عام ١٩٨٠ مكونة من الطاقة الماثية (٨٠٥٪) والبترول (٧٠٠٪) والغاز الطبيعي (٥٠٠٪). أما في عام ١٩٩٦ فكانت ٨٠٨٨٪ من الطاقة الماثية و ٢٠٣١٪ من البترول و ٢٠٤١٪ من الغاز الطبيعي. ويوضح هذا زيادة استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء طبقًا لسياسة إحلال الغاز الطبيعي محل البترول. ولقد أدى تحويل وحدات توربينات الغاز من الدائرة المفتوحة إلى الدائرة المركبة إلى زيادة كفاءة توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى

هذا ولقد ارتفعت حصة الفرد من إجمالي استهلاك الكهرباء من ٤٥٠ كيلووات ساعة في ١٩٩٥، وتوضح بيانات ساعة في ١٩٩٥، وتوضح بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (٢١) بأنه في عام ١٩٩٦ كان ٩٨،٣٪ من سكان الحضر و ٨٠٢٪ من سكان الريف في مصر يستخدمون الكهرباء في الإنارة.

الفصل الثالث **التلوث البيئي في مصر**

١. تلوث الهواء

يتكون الهواء النقى من عدة غازات أهمها النيتروجين والأكسجين، وهما يكونان نحو ٧٨٪ و٢١٪ من وزن الهواء على الترتيب، بالإضافة إلى بعض الغازات الأخرى التى توجد بكميات ضئيلة مثل ثانى أكسيد الكربون، الهليوم، النيون والأرجون وغيرها. وتتوقف الحياة على سطح الأرض على هذا التركيب الطبيعي للهواء.

ويعتبر الهواء ملوثا إذا حدث تغير في تركيبه، واحتوى على شوائب أو غازات أخرى بقدر يضر بحياة الكائنات التى تستنشق هذا الهواء وتعيش عليه. ويحدث تلوث الهواء نتيجة عوامل طبيعية ونتيجة أنشطة الإنسان المختلفة. في الحالة الأولى محلى سبيل المثال، انبعاث الاتربة بفعل العواصف، كالخماسين وغيرها) يكون التلوث مؤقتًا وآثاره محدودة وسرعان ما يعود الهواء إلى طبيعته الأولى بعد انتهاء فعل هذه العوامل الطبيعية. أما في الحالة الثانية فيستمر تلوث الهواء باستمرار الأنشطة البشرية المختلفة. وتنقسم مصادره عادة إلى نوعين: مصادر ثابتة (مثل المصانع، محطات توليد الكهرباء التى تعمل بالطاقة الحفرية أو النووية، المحارق المصانع، ومصادر متحركة (السيارات المختلفة التى تستخدم البترول والغاز وقودًا لها). ويثير تلوث الهواء من الأنشطة البشرية الاهتمام والقلق لتعدد مكوناته وكمياته بدرجة أحدثت خللاً في التركيب الطبيعي للهواء في مناطق مختلفة في العديد من دول العالم. ونتج عن ذلك آثار سلبية متنوعة على صحة الإنسان والنظم البيئية من دول العالم.

وملوثات الهواء الشائعة هي أكاسيد الكبريت والنيتروجين والجسيمات الكلية المعالقة (مثل الأتربة والدخان ورذاذ المركبات الكيميائية المختلفة) وأول أكسيد الكربون والهيدروكربونات. وبالإضافة إلى هذه الملوثات كشفت البحوث العلمية الحديثة عن

تواجد مثات من المركبات غير العضوية والعضوية فى الهواء الخارجى و فى الهواء الداخلى (داخل المبانى) نتيجة أنشطة الإنسان المختلفة. ويعتبر قطاع الصناعة القطاع الرئيسى المسبب لتلوث الهواء، يليه قطاع النقل، ثم قطاع الزراعة (٢٠، ٢٤).

ويختلف مصير الملوثات المنبعثة في الهواء من مكان إلى آخر طبقًا لخواصها الطبيعية والكيميائية والظروف الجوية السائدة حول مصادر التلوث. ففي بعض الأماكن قد تساعد سرعة الرياح على حمل وانتشار الملوثات إلى مسافات بعيدة، وبالتالى إلى تخفيف تركيزاتها. وبذلك فإن تركيزات الملوثات في الهواء لا تتوقف على كمياتها المنبعثة فحسب، وإنما أيضا على الظروف الجوية المحيطة بمصادرها. بإلاضافة إلى ذلك غالبا ما تحدث بعض التفاعلات الطبيعية والكيميائية بين بعض هذه الملوثات، مما قد يزيد أو يخفف من حدة آثارها. فمثلا تتفاعل أكاسيد النيتروجين مع الهيدروكربونات في وجود ضوء الشمس تحت ظروف جوية معينة لتنتج عددًا من المركبات الكيميائية السامة مثل نترات البيروكسي استيل والأوزون، التي تؤدي إلى تكوين ما يعرف بالضباب الدخاني عند اختلاطها مع الجسيمات العالقة والملوثات الأخرى.

مصادر وأحمال ملوثات الهواء في مصر

تتكون المصادر الرئيسية لتلويث الهواء في مصر من: مصادر ثابتة (مثل المنشآت الصناعية ومحطات توليد الكهرباء والمحارق . . إلخ)، ومصادر متحركة مثل وسائل النقل المختلفة التي تستخدم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي كوقود.

تتكون الصناعة في مصر من الصناعات الاستخراجية (استخراج البترول الخام والغاز الطبيعي وبعض الخامات المعدنية، خاصة خام الفوسفات وخام الحديد) والصناعات التحويلية التي تتكون أساسا من: صناعة المنتجات الغذائية (٣٦,٩٪ من إجمالي القيمة المضافة للصناعات التحويلية)، صناعة الغزل والمنسوجات (٧,٠٠٪)، الصناعات المعدنية والهندسية (١,١٤٪)، الصناعات الكيميائية والدوائية (١,٤١٪)، وصناعة مواد البناء والحراريات (٥,٨٪).

وتعتبر الصناعة القطاع الرئيسى الذى يسبب تلويثًا كبيرا للبيئة. وتختلف نوعية وكميات الملوثات المنبعثة من الصناعة اختلافا كبيرًا من صناعة إلى أخرى، وتتوقف على عدة عوامل أهمها:

١ ـ نوع الصناعة.

- ٢ ـ حجم المصنع وعمره ونظام الصيانة به.
 - ٣ ـ نظام العمل بالمصنع وكمية الإنتاج.
- ٤ _ التكنولوجيات المستخدمة في العمليات الصناعية.
 - نوعية الوقود والمواد الأولية المستخدمة.
- ٦ _ وجود الوسائل المختلفة للحد من الملوثات ومدى كفاءة عملها.

أما بالنسبة لقطاع النقل، فقد حدثت فيه تطورات وتغيرات كبيرة فيما بين ١٩٨٥ و ١٩٩٨. ويعد نقل الركاب والبضائع بالطرق البرية من أكثر أنماط النقل استخدامًا في مصر. ولقد أدى التوسع في النقل البرى إلى ارتضاع عدد السيارات في مصر من حوالي مليون سيارة في عام ١٩٨٥ إلى حوالي ٢،٩ مليون في آخر عام ١٩٩٨. ويوضح جدول رقم (٨) التغير في عدد وأنواع السيارات الموجودة بالحركة في آخر ديسمبر ١٩٩٨. ومنه يتضح أن عدد السيارات الموجودة بالحركة قد زاد بحوالي ٤٩٢٧٥ سيارة خلال الثلاثة أعوام، أي بمتوسط ١٦٤٢٥٣ سيارة سنويا. وفي عام ١٩٩٨ تواجد حوالي ٣٢٪ من إجمالي السيارات في محافظة الإسكندرية و ١٢٪ في محافظة الجيزة (٢١).

وعلى الرغم من زيادة عدد المسافرين بالسكك الحديدية بين عامى ١٩٨٤ وعلى الرغم من زيادة عدد المسافرين بالسكك الحديدية بين عامى ١٩٨٩ (من حوالى ٢٤ ألف مليون راكب/كيلومتر إلى ٢٥,٦ ألف مليون راكب/كيلومتر) فإن إجمالى كميات البضائع المنقولة بالسكك الحديدية خلال نفس الفترة قد انخفض من ٢,٢ ألف مليون طن/كيلومتر إلى ٣,٢ ألف مليون طن/كيلومتر. وصاحب هذا الاتجاه زيادة كبيرة في كميات البضائع المنقولة على الطرق العامة، حيث ارتفع عدد سيارات النقل من ٢٦٥ ألف عام ١٩٨٥ إلى ٣٤٥ ألف في آخر ١٩٩٨، وكان لهذا آثاره المختلفة على البيئة، حيث أسهم ذلك في زيادة استهلاك الوقود وما تبع ذلك من زيادة في الانبعاثات المختلفة في الهواء (عادم السيارات)، وزيادة حدة مشاكل المرور.

ويوضح جدول رقم (٩) تقديرات أحمال ملوثات الهواء على المستوى القومى، والتى تم حسابها باستخدام معاملات الانبعاثات للصناعات الرئيسية المختلفة (بما فى ذلك توليد الكهرباء) ووسائل النقل (٢٩). ويتضح منه الزيادة الكبيرة فى أحسال التلوث منذ ١٩٧٥ نتيجة زيادة استخدام الوقود الحفرى (خاصة البترول)، والتوسع فى الصناعات الاكثر تلويعًا للبيئة مثل الأسمنت الذى زاد إنتاجه من حوالى ٣,٣

مليون طن عام ١٩٧٥ إلى نحو ٢, ١٥ مليون طن عام ١٩٩٦، مما أدى إلى الزيادة الكبيرة فى أحمال الجسيمات الكلية العالقة فى الهواء. وبالإضافة إلى ذلك ترجع الزيادة الكبيرة فى أحمال ملوثات الهواء إلى عدة أسباب أهمها: قدم بعض المصانع وتهالك معداتها، عدم وجود المعدات اللازمة للحد من ملوثات الهواء (وإن وجدت لا تعمل بالكفاءة المطلوبة)، تهالك نسبة كبيرة من سيارات النقل والأوتوبيس والأجرة وعدم صيانتها بصورة دورية، عدم كفاءة استخدام الطاقة فى القطاعات المختلفة، والتراخى فى تطبيق تشريعات حماية الهواء من التلوث.

جدول رقم (۸) عدد السيارات الموجودة بالحركة في مصر

عدد السيارات نلوجودة بالحركة حتى آخر ديسمبر ١٩٩٨	عدد السياوات الموجودة بالحركة حتى آخر ديسمبر ١٩٩٥	نوع السيارة
1777 ٣	1.07184	ملاكي
	18307	ملاکی أجرة
£0\£4	***	أتوبيس
173730	. 773 73	نتخل
4.484	7 \0 0 / 7	جرار زراص
87.494	70A/ · 3	موتوسيكل
·37/6/	14441	أخرى (تجارى ـ جمارك إلخ)
7AY\$ 7 A0	7771 277	إجمالى

المصدر: الكتب السنوية للجهاز المركزي للتعبثة والإحصاء (٢١)

جدول رقم (٩) تقديرات أحمال ملوثات الهواء في مصر (بالألف طن)

الجسيمات العالقة	أكاسيد النتروجين	ثانى أكسيد الكبريت	السنة
41.	£A.	777	1940
1110	90	EEA	194 •
714.	150	747	۱۹۸۵
40	140	AY -	199.
£17·	۱۸۵	۸۱۰	1940
£0 · ·	197	۸۳۹	1997
	Y - 0	A79	1997
	41. 1110 114. To £14. £0	41.	\(\partial \chi \chi \chi \chi \chi \chi \chi \chi

المصدر: تم حسابه بواسطة المؤلف

نوعية الهواء

كما سبق أن أوضحنا عاليه، تتوقف تركيزات الملوثات المختلفة في الهواء على خواصها الطبيعية والكيميائية وعلى الأحوال الجوية السائدة حول مصادر التلوث. ويذلك فإن تركيزات الملوثات في الهواء العام تختلف من مدينة إلى أخرى طبقا لموقعها الجغرافي وحجم ونوع الصناعة بها وحولها وحركة النقل فيها، إلى غير ذلك من عوامل تؤثر في نوع وكمية ومصير الملوثات. كذلك تختلف تركيزات الملوثات في الهواء داخل المدينة الواحدة من مكان إلى آخر، وتصل إلى أقصاها في المناطق الصناعية، وأقلها في المناطق السكنية البعيدة عن مصادر التلوث. كما تختلف تركيزات الملوثات وأنواعها من منطقة صناعية إلى أخرى. فمثلا تعتبر الجسيمات الكلية العالقة الملوث الرئيسي في منطقة حلوان (لوجود صناعة الأسمنت)، بينما يعتبر الرصاص ملوثا مهما في هواء شبرا الخيمة (لوجود مسابك الرصاص التي يعتبر الرصاص ملوثا مهما في هواء شبرا الخيمة (لوجود مسابك الرصاص التي تنبعث منها أتربة محملة بالرصاص)، وتعتبر الهيدروكربونات والمركبات العضوية الأخرى من الملوثات المهمة بجوار معامل تكرير البترول، وهكذا.

وتوضح القياســات المتفرقة التي أجريت في الفــترة ١٩٩١/ ١٩٩١ في ١٦ مدينة في مقدمتها القاهرة والإسكندرية (٣٠) الخصائص التالية للهواء العام فيها :

- 1 كان المتوسط السنوى لتركيز ثانى أكسيد الكبريت في الهواء في حدود ١٠-٣٠٠ ميكروجرام/ متر مكعب (التركيزات المنخفضة كانت في المناطق السكنية والمرتفعة في المناطق الصناعية). ووجد أن جميع التركيزات التي سجلت في القاهرة تفوق المعايير الإرشادية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لحماية صحة الإنسان (١٠٤٠ ميكروجراما/ متر مكعب).
- ٢ ـ ارتفاع المتوسط السنوى للجسيمات الكلية العالقة في جميع المدن (١٠٠-٥٠٠ ميكروجرام/ متر مكعب). وسجلت أعلى التركيزات في القاهرة والجيزة والمنيا.
 وجميع القياسات تفوق معايير منظمة الصحة العالمية (٦٠-٩٠ ميكروجراما/ متر مكعب).
- ٣ ـ اختلفت تركيزات أكاسيد النيتروجين في هواء القاهرة من فصل إلى آخر من فصول السنة. وكانت أكثر ارتفاعا في فصل الصيف لزيادة حركة مرور السيارات. ولقد تراوحت تركيزات أكساسيد النتروجين بين ٣٧٠ و ٠٠٤ ميكروجرام/متر مكعب وهي تركيزات تفوق بكثير المتوسط السنوى المنصوص عليه في المعايير الأمريكية (١٠٠ ميكروجرام/متر مكعب).

- ٤ ـ بالنسبة لأول أكسيد الكربون، ومصدره الرئيسى هو السيارات بأنواعها المختلفة، تباينت تركيـزاته فى الهواء تباينًا كبيـرًا طبقا لكثافة حركـة السيارات فى المناطق المختلفة. ولقد أظهـرت القياسات التى أجريت فى القاهرة أن تركيـز أول أكسيد الكربون فى الهـواء كان يتـرواح بين ٢٠ و٤٧ ملليـجرامـا/ متـر مكعب. وهى تركيزات تزيد عن ما أوصت به منظمة الصحة العـالمية (لا يجوز التعرض لأكثر من ساعة لتركيز قدره ٣٠ ملليجراما/ مـتر مكعب أو أكثر من ٨ ساعات لتركيز قدره ١٠ ملليجرام/ متر مكعب. كما لا يجـوز أن يتجاوز امتصاص أول أكسيد الكربون فى الدم ـ والمعرف بنسبة الكربوكسى هيـموجلوبين ـ عن ٥ و ٢-٣٠/). ولذلك وجـد أن رجال المرور الذين يعـملون فى الأماكن المزدحـمة بالسـيارات لفتـرات طويلة (وردية ٨ ساعات وأكثـر) يتعرضون لتـركيزات من أول أكسيد الكربون أعلى من المسـمـوح بهـا، مما ترتب عليـه ارتفـاع نسبـة الكربوكـسى هيموجلوبين لديهم إلى حوالى ١٤٪.
- ٥ ـ كانت تركيزات الرصاص فى هواء القاهرة تتراوح بين ١ و٣ ميكروجرام/متر مكعب، ولقد حدث انخفاض طفيف فى هذه التركيزات مؤخراً لتعميم استخدام البنزين الخالى من الرصاص. ولكن ما تزال تركيزات الرصاص فى الهواء مرتفعة (٥,٠٠٢ ميكروجرام/متر مكعب) مقارنة بالمعايير الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية (٥,٠٠١ ميكروجرام/متر مكعب). ويرجع ذلك إلى الانبعاثات من مسابك الرصاص، والتى تقدر بنحو ١١٠٠ طن من الرصاص سنويا(٣١).

وتجدر الإشارة هنا إلى أن خفض تركيز ملوث ما في الهواء لا يعنى أن نوعية الهواء قد تحسنت، لأن نوعية الهواء تتحدد بمؤشر يتم حسابه طبقا لتركيزات جميع الملوثات الرئيسية؛ [في الوقت الراهن لا يمكن حساب هذا المؤشر لهواء القاهرة لعدم توفر قياسات لجميع الملوثات الرئيسية (خمسة على الأقل) على فترات رمنية منتظمة وطويلة]. لذلك فإن القول بأن خفض تركيزات الرصاص في الهواء نتيجة تعميم استخدام البنزين الخالي من الرصاص، أو بأن خفض الجسيمات الكلية العالقة من صناعة ما قد أدى إلى تحسين نوعية الهواء قول لا يتفق مع الحقائق العلمية. فعلى سبيل المشال يوضح جدول رقم (١٠) أن أحمال الملوثات في هواء القاهرة وبالتالي تركيزاتها) قد رادت في الفترة من ١٩٩٥ إلى ١٩٩٨ نتيجة لزيادة عدد السيارات، بالرغم من انخفاض تركيزات الرصاص في الهواء إلى درجة ما كما أوضحنا عاليه.

جدول رقم (١٠) تقدير ات أحمال تلوث الهواء من السيارات الموجودة بالحركة في محافظة القاهرة (بالطن)

جسيمات عالقة (دخان)	أكاسيد كبريت	أكاسيد نتروجين	أول أكسيد الكربون	البنة
110.	٣٦٠.	75	\7Va · ·	1990
180.	٤٤٠.	As	\7Fa · ·	

المصدر: تم حسابه بواسطة المؤلف وطبقا لعدد السيارات وأنواعها (انظر جدول ٨) يحتوى دخان صادم السيارات التي تستخدم السولار أو الديزل (خاصة النقل والأتوبيس) على مئات من المركبات العضوية ثبت أن بعضها يسبب السرطان (٢٨٠٢٠).

توضح نتائج رصد ملوثات الهواء (يوليو ١٩٩٨ إلى يوليو ١٩٩٩) التالى:

- 1 _ المتوسط السنوى للجسيمات الكلية العالقة في هواء القاهرة الكبرى يتراوح بين ٢٠٠ و ٨٠٠ ميكروجرام/متر مكعب، ويبلغ أقصاه في مناطق التبين وشبرا الخيمة. كما يبلغ ٥٥٠ ميكروجرام/متر مكعب في بعض مناطق السويس. وجميع القياسات أعلى من معاييسر منظمة الصحة العالمية أو تلك المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤.
- ٢ ـ تركيزات الجسيمات الأقل من ١٠ ميكرون(المعروفة باسم PM10) تتراوح بين ١٤٥ و ٢٧٥ ميكروجراما/ متر مكعب وتصل في بعض المناطق إلى ٥٠٠ ميكروجراما/ متر المكعب، مع وجود اختلافات موسمية. وجميع القياسات أعلى من معايير منظمة الصحة العالمية ومن تلك المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤.
- ٣ ـ تركيزات الرصاص فى هواء القاهرة الكبرى تتراوح بين ٣٧، و ١٣,٧ ميكروجـراما/ متر مكـعب. ومعظم القياسات مازالت أعلى من معـايير منظمة الصحة العالمية بالرغم من تعميم البنزين الخالى من الرصاص.
- ع ـ تختلف تركيزات أكاسيد الكبريت من مدينة إلى أخرى ومن موقع إلى آخر داخل نفس المدينة. ومعظم القياسات في مدينة القاهرة الكبرى والمحلة الكبرى أعلى من معايير منظمة الصحة العالمية ومن تلك المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤.

المصادر: مشروع تحسين هواء القاهرة الكبرى (نمول من هيئة المعونة الأمريكية)، ومشروع رصد ملوثات الهواء (نمول من هيئة المعونة الدانيمركية) ـ جهاز شئون البيئة ١٩٩٩ .

نوية تلوث مواد تحاد في الفاهرة.

العرصة القاهرة الكرى الآول ميرة في التاريخ الربة في تلوث الهواه الجاد للت المتاه الورم الآرا الكور الهرام الهواء الهاهرة المعاه المعاه

ولقد أوصّت القناطات التي أجرين جبلال ثوية تلوث الهواء إلحاد ارتفاع تركنوات إطسيمات العالقة في الهواء جامية تلك التي تقل عن السكرون (الي 20% معتقد المعاديم المستقدة من اكماسيد و 30% فيعقف المعاديم المستقد من المحاسد الكيرين والنسووجين بلغت في بعض المواقع ضيقف التركيرات العادية التي هي العنالة المستقد 1882 التي هي العنالة والقانون كالسنة 1882

الأثار الصحية الناجمة عن تلوث الهواء

تؤثر مكونات البيئة المختلفة - طبيعية أو كيميائية أو بيولوجية - في صحة الإنسان بدرجات مختلفة، وبينما تؤدى العوامل الوراثية (أو الجينية) إلى الإصابة ببعض الأمراض الخلقية والعوامل البيئية إلى الإصابة بالأمراض المكتسبة، إلا أن هناك تفاعلا بين الاثنين. وتتفاوت الآثار الصحية لملوثات الهواء من تلك التي تنتج عن تعرض مجموعة العاملين في بيئة العمل لجرعات عالية من الملوثات، إلى تلك التي تنتج عن تعرض عامة الناس لجرعات منخفضة منها في البيئة العامة.

وتعتبر عملية تقييم الآثار الصحية للملوثات في البيئة العامة عملية معقدة تبدأ بالتعرف على مصدر التلوث ونوع الملوثات وتركيزها، ثم دراسة عمليات نقل الملوثات وتحولاتها وتفاعلاتها المحتملة في البيئة العامة، ومن ثم درجة تراكم أو

انتشار كل ملوث فيها. ويلي ذلك تحديد جرعة الملوث التي يتعرض لها الإنسان. ونظرًا لأن كمية الملوث التي يتعرض لها الإنسان لا تدخل جسده بالكامل (جزءا منها قد يحتجز بواسطة الأغشية الأنفية) يتم حساب ما يعرف بالجرعة الداخلية- أي كمية الملوث التبي تدخل جسم الإنسان فعلا. ومن المعروف أن جـزءًا كبيرًا من هذه الجرعة الداخلية لا يمتصه الجسم ولكن يتم إفرازه (مع البول أو البراز أو العرق). أما الجزء الذي يمتصه الجسم (وهو ما يشار إليه بالجرعة المؤثرة) فقد يتراكم أو يتحول إلى مركبات أخرى داخل الجسم (في الدهن أو العظم). وتتوقف الآثار الصحية للملوثات على تركيز هذه الجرعة المؤثرة. فعندما تكون تركيزاتها منخفضة جدا لا تحدث آثارا صحية واضحة. ويقال حينئذ إنه قد حدثت عملية تكيف طبيعية للجسم. أما إذا زادت الجرعة المؤثرة على ذلك بدرجة محدودة حدث توعك مؤقت سرعان ما يزول ويعود الجسم إلى طبيعته. وفي هذه الحالة تعتبر الجرعات المؤثرة في نطاق ما يعرف بالطب الوقائي _ أى أنه يمكن التحكم في الآثار باتخاذ إجراءات وقائية. أما إذا زادت الجرعة المؤثرة للملـوث على هذه الحدود الوقائية، فإن الإنسان يمرض بدرجات مختلفة طبــقا للجرعة وطبقا لحالته الصحيــة العامة وعمره. . إلخ. ونظرا لأن عملية تقييم الآثار الصحية الكاملة للمركبات الكيميائية عملية طويلة ومكلفة للغاية، اقتصر في معظم الأحوال على تحديد مدى «التسمم» من المركب (ما يعرف بالجرعة القاتلة) واستخدام ذلك في نماذج مبسطة لتحديد المخاطر الصحية للملوثات الكيميائية. ولكن البحوث العلمية التي أجريت خلال العقدين الأخيرين أوضحت أن الأمر ليس بهذه البساطة وبينت الحقائق التالية:

- ١ ـ لا توجد معلومات كافية لتقييم الأخطار الصحية الكاملة إلا لنسبة تقل عن ٢٪
 من المركبات الكيميائية المعروفة.
- ٢ ـ بالرغم من أن الخطر من جرعات بعض المركبات الكيميائية معروف (مثل التسمم)، إلا أننا لا نعلم الآثار الصحية المترتبة على التعرض لجرعات قليلة لمعظم المركبات الكيميائية خاصة على المدى الطويل (٣٠ أو ٥٠ سنة مثلا).
- ٣ هناك اتفاق عام الآن على أن نحو ٨٠٪ من جميع حالات السرطان تنتج من عوامل بيئية. ولكن لم يتحدد حتى الآن مجموع هذه العوامل والتفاعلات التى تحدث بينها. ومما يزيد الأمور تعقيدًا أن السرطان مرض لا يصيب الإنسان فجأة وإنما تحدث الإصابة به بعد التعرض لمستويات منخفضة من الملوثات لسنوات طويلة (مثل سرطان الرثة الذى يحدث لدى العاملين في المناجم والذى وجد أن التدخين يسرع من الإصابة به).

٤ ـ تعتبر عملية تقييم الآثار الصحية للملوثات الكيماوية في البيئة العامة عملية مكلفة تتطلب وقتًا طويلاً، لأن الإنسان لا يتعرض في العادة لملوث واحد، بل يتعرض طوال اليوم لملوثات مختلفة عن طريق الاستنشاق والأكل وامتصاص الجلد . . . إلخ. وفي كثير من الأحيان قد يؤدى التعرض لملوث ما إلى زيادة أو نقص حدة آثار ملوث آخر.

ويعتبر الأطفال ومن لديهم حساسية من الكبار من أكثر الناس تأثرًا بتلوث الهواء. فيصاب الأطفال عند تعرضهم لتلوث الهواء بالتهابات الشعب (ومن ثم زيادة الإصابة بالحربو وحدته) وكذلك بالالتهابات الرئوية الحادة (يتنفس الإنسان البالغ حوالى ١٣ مترا مكعبا من الهواء يوميا، في حين يحتاج الطفل خاصة في سنوات عمره الأولى إلى كميات أكبر من الهواء تقدر بحوالى ٢٦ مترا مكعبا من الهواء يوميا. وبذا يكون الأطفال الصغار أكثر حساسية لتلوث الهواء).

ويوضع جدول (١١) أهم الآثار الصحية لملوثات الهواء . ولحماية صحة الإنسان وضعت منظمة الصحة العالمية حدودا «إرشادية» لملوثات الهواء الرئيسية لا يجوز تعديها (٣٢). وهذه الحدود «إرشادية» لأننا مازلنا لا نعرف الكثير عن آثار بعض الملوثات. وتجرى منظمة الصحة العالمية، وكذلك الدول المتقدمة، مراجعات دورية لهذه الحدود الإرشادية كلما توفرت معلومات أدق عن الآثار الصحية للملوثات المختلفة.

وفى ضوء ما سبق، أوضحت عدة دراسات (٣٤، ٣٤) أجريت فى الفترة ١٩٩٠/ ١٩٩١ أن تلوث الهواء فى مصر قد تسبب فى عدد من الآثار الصحية نوجز أهمها فى التالى:

- ١ ـ يقدر عدد السكان المعرضين لتركيزات غير صحية لملوثات الهواء في المناطق الحضرية
 في مصر بنحو ١٠ مليون نسمة، نسبة كبيرة منهم في القاهرة الكبرى والإسكندرية.
- ٢ ـ ظهر من مسح طبى أجرى فى منطقة شبرا الخيمة الصناعية أن نحو ٢٠٪ من سكان المنطقة يعانون أمراض الجهار التنفسى نتيجة تعرضهم لمستويات مرتفعة من ثانى أكسيد الكبريت والدخان.

جدول رقم (١١) الآثار الصحية لملوثات الهواء الرئيسية

أكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين	ضيق التنفس _ أمراض الشعب الهوائية _ خفض مناعة الجسم _ أمراض مزمنة بالرئتين.
الحسيمات العالقة	تسبب الجسيمات التي يتنفسها الإنسان في زيادة الحساسية والربو وغيرها من الأمراض الصدرية.
أول أكسيد الكربون	يحد من قابلية حمل الدم للأكسجين، وبلما قــد يسبب أضرارا بخلايا المنح أو الاختناق، كما يؤثر لمى
	الدورة الدموية والجهاز العصبي.
الهيدروكربوتات	أمراض صدرية مختلفة.
الضباب الدخائى (خاصة الأوزون السطحى)	التهابات العين ـ الربو ـ التأثير على وظائف الرئتين والقلب.
الرصاص	أمراض الكلى والجهاز العصبي ويؤثر خاصة في الأطفال (يؤدي إلى ويادة التخلف العقلي والتشتجات
	ونوبات التغيرات السلوكية . إلخ) .

- ٣ ـ أظهر مسح صحى للمناطق المتاخمة لمصانع الأسمنت بمنطقة حلوان أن ٢٩٪ من
 تلاميــذ المدارس يعانون أمراض الجــهاز التنفسى، وذلك بالمقــارنة بنحو ٩٪ من
 تلاميذ مدارس المناطق الريفية البعيدة.
- ٤ ـ يؤدى تلوث الهواء في القاهرة الكبرى إلى نحو ٩٠٠٠ حالة وفاة مبكرة سنويا
 (Premature deaths)، وإلى حدوث ١١٥٠٠ حالة من حالات
 الأزمات القلبية، طبقا لتقديرات البنك الدولي في أوائل التسعينيات (٣٤).
- ارتفعت في السنوات العشر الأخيرة نسبة إصابة الأطفال بالربو نتيجة التعرض لتلوث الهواء في خارج وداخل المنازل (ثبت من بعض الدراسات أن تلوث الهواء داخل المبائي أكثر منه في خارجها نتيجة تراكم بعض الملوثات وسوء التهوية خاصة في المباني الحديثة المحكمة).
- ٦ ـ منذ أكثر من عشرة أعوام ابتدع جهاز شئون البيئة فكرة زيادة ارتفاع شكمانات سيارات الأوتوبيس والنقل بحجة تقليل الدخان المنبعث منها. ولكن من الناحية العلمية والعملية لم تؤد فكرة الشكمانات العلوية إلى خفض الانبعاثات من هذه السيارات، إنما أدت إلى زيادة انتشارها في الهواء. ولقد نتج عن ذلك زيادة تعرض الإنسان لجرعات مؤثرة أكبر من هذه الملوثات.
- ٧ ـ قدرت التكاليف الصحية لتلوث الهواء (نفقات العلاج والفاقد في أيام العمل والموت المبكر) في منطقتي شبرا الخيمة وحلوان فقط بنحو ٤٠ مليون دولار سنويا(٣٣). وتقدر التكاليف الناجمة عن الآثار الصحية لتلوث الهواء في مصر بصورة عامة ما يزيد عن ٥٠٠ مليون دولار سنويا.

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أوضحت إحدى المدرانسات الحديثة العي أجرات في إطار مشهورج تحسين هواء القاهرة الكرى المعول من هيئة المعونة الامريكية والذي ينفذه حهار شنون البيئة أن:

راً الله من سكان الفاهرة الكرى الذين يقال عددهم بنجو ١٦ مليون سمه معرضون بصفة (محت ١٠ مكرون) أكثر ممارضون بصفة والمنة لتركيزات من الجسيمات العالقة (محت ١٠ مكرون) أكثر من ١٠ مكرون)

ـ ۱۸ ٪ من سکان القاهرة الکبری معرضون للسرکترات من هذه الجنسمات بين. ۵۰ ـ ۱۰ ميگروجراما/مئر مکعب

ـــ ٩٤٪ من سُكان الفاهرة الكبرى معرضون لتركيرات من هذه الحسيمات بين ١٥ و ٥ ميكروخواما/متر مكعب

اى أن أكثر من تصف مكان القناهرة الكبيري (أي حوال 1 مليون تسمية) معرضون لتركيرات من الحبيمات العالقة نزيد على معاير صطمة الصحة العالمية أو تلك المتصوص عليها في اللائحة التنقيلية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤

، ولقد أوضحت الدراسة أن تلوث الهواء في القاهرة الكبرى يسبب في التالي. سنه با:

- ي ٣٤٠٠ حالة وفاة مبكرة .

١٥٠٠٠ حالة النهاك شعبي مزمن

ا ـ ٢٢٩ حالة عدوى بأمراض الجهار التنفسي

ے : ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ و ۸ نوبه ربو

المراجية المرجن ٢٨ يوم بنشاط محدود نتيجة المرجن

وتقلر التكاليف (الحنائر) الناجمة على تلوث الهواء في الصاهرة الكرى بنحو ١-٢- مليار دولار ضويا.

الآثارالأخرى لتلوث الهواء

يساهم ارتفاع تلوث الهواء (خاصة بثانى أكسيد الكبريت) في سرعة تدهور أسطح المبانى الأثرية خاصة تلك المشيدة من الحجر الجيرى (مثل تمثال أبو الهول). كما يؤدى تلوث الهواء الداخلى داخل المتاحف إلى تدهور حالة الآثار واللوحات الفنية خاصة تلك التى استخدمت فيها ألوان حساسة للملوثات. ومن جهة أخرى أدى تلوث الهواء إلى آثار سلبية مختلفة على الأراضى الزراعية والزراعات الحساسة للملوثات (كما هو الحال في المناطق الزراعية القريبة من مصانع الأسمنت)، كما أوضحت بعض المدراسات ارتفاع تركيزات بعض الفلزات الشقيلة في الخضراوات المزروعة على جانبى الطرق السريعة (مثل طريق القاهرة ـ الإسكندرية الزراعي) نتيجة التعرض للتلوث من عادم السيارات.

٢ـ تلوث المياه

تلوث المياه هو كل تغيير في الصفات الطبيعية أو الكيميائية أو البيولوجية للمياه يحد من صلاحيتها _ أو يجعلها غير صالحة _ للاستعمالات المختلفة. وتتعرض المياه السطحية (الأنهار والبحيرات) للتلوث نتيجة لصرف المخلفات السائلة غيسر المعالجة فيها. ولا يقتـصر تلوث المياه على المياه السطحية فقط بل أصبـح تلوث المياه الجوفية مشكلة في كثير من المناطق نتيجة استخدام كميات متزايدة من الأسمدة الكيميائية والمبيدات في الحقول الزراعية ونتيجة صرف المخلفات المختلفة (مياه الصرف الصحى والمخلفات الصناعية) في مناطق غير مـؤهلة لذلك، مما يحدث تسربًا لمركبـاتها إلى المياه الجوفية. ويؤدى صرف المخلفات السائلة المحتوية على تركيزات مرتفعة من المواد المغذية مثل الفوسفات والنترات إلى المسطحات المائية إلى إحداث ما يعرف بالتخثث، أو زيادة المواد المغذيــة للطحالب والأعشــاب في المياه. وينتج عن ذلك نمــو طحالب ونباتات مختلفة مثل ورد النيل وخس الماء وكرنب النيل وغيرها. ويزدهر نمو هذه الأحياء في الجو الدافئ وفي المياه بطيئة الحركة. ويلحق التخثث أضرارًا مختلفة بالثروة السمكية في المسطحات المائية وبالأحياء التي تعيش في القاع نتيجة حجب ضوء الشمس عنها والإخلال بدورة الأكسجين في المياه. كما يساعــد نمو النباتات المختلفة على خلق بيئة مناسبة لتكاثر البعوض والقواقع والحـشرات الأخرى الحاملة للعديد من الأمراض.

تلوثنهرالنيل

مصادر التلوث:

تصرف فى نهر النيل ـ على طول مـجراه من أسوان إلى مصباته عند دمياط ورشيد ـ كميات كبيرة من المخلفات السائلة، بطريق مباشر وغير مباشر (عن طريق الترع والمصارف التى تصب فى نهر النيل وفروعـه). ويمكن تقسيم المخلفات السائلة التى تصرف فى نهر النيل كالتالى:

- ١ مياه صرف زراعى بها كميات مختلفة من بقايا الأسمدة والمبيدات المستخدمة فى الزراعة، وتقدر كمياتها بنحو ٢٠٠٠ مليون متر مكعب سنويا، منها حوالى ٠٠٠٠ مليون متر مكعب فى الوجه القبلى بين أسوان والقاهرة.
- ۲ ـ مخلفات صرف صحى غير معالجة، تقدر كمياتها بنحو ۱۷۰۰ مليون متر
 مكعب سنويا، منها حوالى ۱۰۰۰ مليون متر مكعب فى الوجه القبلى.
- ٣ ـ مخلفات صناعية سائلة غير معالجة يختلف تركيبها وكمياتها من صناعة إلى أخرى، وتقدر كمياتها بنحو ٣٨٧ مليون متر مكعب سنويا.
- ٤ مياه تبريد من محطات توليد الكهرباء، وتقدر كمياتها بنحو ٣٠٠٠ مليون متر مكعب سنويا. وهي لا تعتبر مخلفات سائلة بالمعنى المفهوم لانها لا تحتوى على ملوثات إضافية تذكر سوى كميات قليلة من المركبات الكيميائية التى تضاف لمياه التبريد لمنع التآكل والصدأ. وهذه المياه تخرج من محطات توليد الكهرباء ودرجة حرارتها مرتفعة قليلا عن درجة حرارة المياه المستقبلة لها (أعلى بحوالى ٧ درجات مثوية). وتعتبر آثار هذا «التلوث الحراري» محدودة للغاية.

توعية مياه النيل:

بصورة عامة توضح التحاليل الكيميائية والبيولوجية نوعية مياه النيل كما يلى:

ا ـ هناك ريادة ملحوظة فى ملوحة مياه النيل وارتفاع مستوى حمضيتها وكذلك ريادة الطلب على الأكسحين الحيوى فيها، من أسوان إلى القاهرة. وتزداد تركيزات الملوثات الرئيسية فى نهر النيل قرب نقاط صرف المخلفات السائلة (ما يسمى أحيانا بالمناطق الساخنة). ويختلف مصير هذه الملوثات باختلاف تركيبها الكيميائى وكمياتها وتفاعلاتها فى النهر. فبعض الملوثات يتم تخفيفه أو تحلله

بسرعة ، في حين يبقى البعض الآخر مقاوما للتحلل لفترات كبيرة. كذلك تتراكم بعض الملوثات في رسوبيات قاع النيل لتكون مناطق عالية التلوث تتأثر فيها نوعية الرسوبيات والمياه والأحياء الموجودة بدرجة كسرة.

٢ - مياه النيل قرب القاهرة وفى فرعى دمياط ورشيد أكثر تلوثا منها فى المسافة بين أسوان والقاهرة. ويزداد تدهور نوعية المياه شمالى القاهرة باتجاه دمياط ورشيد. ومياه فرعى دمياط ورشيد تحتوى على تركيزات عالية من بكتيريا القولون (نتيجة التلوث بالصرف الصحى) ومن الملوثات الأخرى الرئيسية. وتتدهور نوعية مياه فرع رشيد فى فصل الصيف نتيجة انخفاض كمية الأكسجين الذائب فى المياه بدرجة تؤثر على الأحياء الماثية فيه.

وبحساب مؤشرات تلوث المياه المختلفة مثل مؤشر الطلب على الاكسجين الحيوى ومؤشر (Index of Total Toxic Releases to Water) ، وجد أن مياه نهر النيل أصبحت أكثر تلوثًا في ١٩٩٩ عنها في ١٩٨٥ أو ١٩٩٠ والتلوث المنتشر في نهر النيل هو تلوث ميكروبيولوجي (أي بالبكتيريا والفيروسات المختلفة) نتيجة الصرف الصحى . أما التلوث بالمخلفات الصناعية ، فينحصر أساسًا بالقرب من مناطق الصرف نتيجة عدم التزام الصناعات المختلفة بمعالجة مخلفاتها السائلة قبل صرفها في المصرف نتيجة عدم التزام الصناعات المختلفة بمعالجة منه المناير التي وردت في لا تحته التنفيذية . وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون لم يمنع الصرف في نهر النيل إذا كانت المخلفات السائلة المنصرفة من المنشآت المختلفة في حدود هذه المعايسر. أما الاتجاه إلى «منع» بعض الصناعات والمنشآت من صرف مخلفاتها السائلة في نهر النيل فيعتبر تطبيقًا سيئًا لأحكام القانون ولن يؤدي إلى حل المشكلات البيئية ، وذلك المنساب التالية:

- ا ـ اتجاه بعض الصناعات إلى تحويل صرف مخلفاتها السائلة كما هي، دون معالجة، إلى شبكة الصرف الصحى. ومن شأن هذا زيادة أحمال بعض الملوثات في محطات معالجة الصرف الصحى مما يؤدى إلى تعقيد عمليات المعالجة فيها أو الإضرار بها كلية.
- ٢ ـ لجوء بعض الصناعات إلى إنشاء بيارات يتم صرف المخلفات السائلة فيها ثم نزحها بصورة دورية بواسطة سيارات خاصة لصرفها في الترع أو المصارف المجاورة(تتم هذه العمليات بالمخالفة للقانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢)، بما يؤدى إلى زيادة أحمال الملوثات في هذه المجارى المائية.

٣ ـ قيام بعض الصناعات بتحويل صرف مخلفاتها السائلة إلى المصارف الزراعية المجاورة مما أدى إلى زيادة تدهور المياه فيها، مما يعقد من عمليات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى في الرى.

ولقد آدت هذه الحلول «السهلة» التي تحقق ظاهريا «تنفيذ التعليمات» بعدم صرف المخلفات السائلة في نهر النيل وفروعه إلى إحجام بعض الصناعات والمنشآت عن إنشاء محطات لمعالجة مخلفاتها السائلة، والتراخي في إدخال وترسيخ مفاهيم الإدارة البيئية فيها.

الأثار الصحية لتلوث نهرالنيل

بالرغم من وصول مياه الشرب إلى أعداد متزايدة من القرى المصرية، مازال نهر النيل وترعه المختلفة تمثل مسدراً مهما للمياه لأهالى هذه القرى (للاستخدامات المنزلية و غسيل الأوانى و استحمام الأطفال إلى غير ذلك). ويؤدى تلوث المياه إلى الإصابة بالعديد من الأمراض المعوية والطفيلية وتعتبر البلهارسيا والكوليرا من أهم الأمراض الناتجة عن تلوث المياه، يليها المتيفود والدوسنتاريا الباسيلية والدوسنتاريا الأميية والالتهاب الكبدى الوبائى وغيرها. ويؤدى تلوث المياه ـ خاصة المياه الراكدة ـ إلى تعاظم توالد البعوض مما يساعد على انتشار الملاريا في بعض المناطق.

تلوث المياه الجوفية

يتزايد تلوث المياه الجوفية في مصر، خاصة في وادى النيل والدلتا، نتيجة لتسرب المياه الملوثة (مشل مياه الصرف الصحى ومياه الصرف الزراعي المحملة بالمخصبات والمبيدات ومياه الصرف الصناعي) إلى الخزانات الجوفية. وقد أوضحت التحاليل أن المياه الجوفية في بعض مناطق الدلتا تحتوى على تركيزات عالية من الميكروبات والنوسفات والمبيدات والمعادن الثقيلة (مثل الحديد والمنجنيز) والألومنيوم، مما يجعل هذه المياه الجوفية غير مطابقة لمواصفات مياه الشرب التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية. وفي شمال الدلتا والساحل الشمالي الغربي تزداد ملوحة المياه الجوفية نتيجة لتداخل مياه البحر مع خيزانات المياه الجوفية، ويتزايد هذا التداخل (وبالتالي ملوحة المياه) مع زيادة ضخ المياه الجوفية عن المعدلات المناسبة لهيدروجيولوجية المنطقة.

تلوث بحيرات شمال الدلتا

تحمل المصارف الزراعية ما يزيد على ١٦ مليار متر مكعب في السنة من الماء المحمل بالمخلفات الزراعية والصناعية ومخلفات الصرف الصحى إلى بحيرات شمال الدلتا المتصلة بالبحر الأبيض المتوسط. وتعتبر بحيرة المنزلة وبحيرة مريوط من البحيرات الأكثر تلوثا. فمصرف بحر البقر يمتد لمسافة ١٩٠ كيلومترا من جنوب القاهرة مارا بمحافظات القليوبية والشرقية والإسماعيلية والدقهلية ليصب في بحيرة المنزلة ما يقرب من ٨٤٥ مليون متر مكعب سنويا من مياه الصرف الصحى غير المعالجة من هذه المحافظات، مختلطة بها مخلفات حوالي ٨٠ مصنعًا في منطقة المعالجة من هذه المحافظات، مختلطة بها مخلفات حوالي ٨٠ مصنعًا في منطقة القاهرة الكبرى. ولقد أدى هذا التلوث إلى تغيرات بيئية متعددة حول المصرف (يستخدم بعض المزارعين مياه المصرف في الري) وفي منطقة بحيرة المنزلة، مما أدى إلى خفض إنتاجها من الأسماك وارتفاع معدلات تلوث بعض أنواع الأسماك فيها؛

أما بحيرة مربوط فتستقبل سنويا ما يقرب من ٣٧٠ مليون متر مكعب من الصرف الصحى ومخلفات المصانع السائلة من منطقة الإسكندرية؛ عما أدى إلى تدهور الأحوال البيئية في البحيرة والمناطق المجاورة لها. فلقد زادت عمليات التحلل اللاهوائية في البحيرة، عما أدى إلى ارتفاع تركيزات غاز كبريتيد الإيدروجين المسئول عن الرائحة الكريهة التي تنبعث من البحيرة. ولقد أدى هذا إلى القضاء على الأكسجين الذائب في المياه واندثار أنواع مختلفة من الأحياء الماثية وتلوث شديد لبعض أنواع الأسماك. فمشلا بينت بعض القياسات في أوائل التسعينيات ارتفاع تركيزات الزئبق في بعض أسماك البحيرة إلى ١٢٩٥ جزء في المليون، مقارنة بالحد الأقصى الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية، وهو جزء واحد في المليون فقط (٣٤).

٣. المناطق الساحلية والبيئة البحرية

يبلغ طول السواحل المصرية حوالى ٢٤٢٠ كيلومتراً. وتمثل المناطق الساحلية مواقع إنمائية مختلفة بالنسبة للاستجمام والسياحة والثروة السمكية والتصنيع والتجارة العالمية. وتتعرض المناطق الساحلية في مصر للتلوث من عدة مصادر الهمها:

- ١ _ عمليات النقل البحرى.
- ٢ ـ عمليات استكشاف وإنتاج البترول والغاز الطبيعي من المناطق الساحلية.
- ٣ ـ صرف المخلفات السائلة (الصرف الصحى ومخلفات المصانع) غير المعالجة من مصادر أرضية.
 - ٤ _ أعمال الهدم والردم الناجمة عن تشييد القرى السياحية وتهذيب شواطئها.
- المخلفات والـتسربات من الأعـداد المتزايدة من اللنشـات والمركبـات الترويحـية
 والسياحية المختلفة.

ويعتبر الساحل الشمالي من بورسعيد شرقًا إلى الإسكندرية غربًا من أكثر المناطق الساحلية تلونًا. فالبيئة البحرية في تلك المنطقة تستقبل نحو ٧٥٠ مليون متر مكعب من الصرف الصحى ونحو ٥٠٠ مليون متر مكعب من مخلفات الصناعة السائلة كل عام. وفي منطقة غرب الإسكندرية وحدها يتم صرف حوالي ٢٠٠٠ مليون متر مكعب من المخلفات سنويا من مصرف العموم وبحيرة مريوط، وفي شرقي الإسكندرية يستقبل خليج أبو قير نحو ٧٠٠ مليون متر مكعب من مخلفات الصناعة من منطقة كفر الدوار الصناعية والطابية بالإسكندرية سنويا. وتتضح آثار هذا التلوث على شواطئ الساحل الشمالي حيث توجد كميات من القار تتراوح بين هذا التلوث على شواطئ الساحل الشمالي حيث توجد كميات من القار تتراوح بين الثقيلة في الأسماك والرواسب البحرية. بالإضافة إلى هذا أدت العناصر المغذية الموجودة في المخلفات السائلة إلى انتشار الطحالب والأحياء البحرية الرخوية (مثل قاديل البحر) في بعض المناطق.

وفى منطقة خليج السويس الذى يعتبر مسارًا مائيا للسفن وناقلات النفط المتجهة إلى قناة السويس والخارجة منها، والذى توجد به عدة منصات بحرية لإنتاج البترول، يزداد التلوث بالزيت. وبالإضافة إلى ذلك تقوم المنشآت الصناعية فى منطقة السويس بصرف ما يقرب من ١٠ مليون متر مكعب من مخلفاتها السائلة غير المعالجة إلى خليج السويس كل عام. ومن المتوقع أن تزداد هذه الكمية بدرجة كبيرة بعد تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية بخليج السويس.

وتتضرر بعض المناطق الساحلية في البحر الأحمر من أساليب التنمية السياحية غير الرشيدة، حيث تتم عمليات تدمير للشعاب المرجانية القريبة من الشواطئ وعمليات ردم بالرمال . . إلخ لتشييد القرى السياحية وإعداد الشواطئ الممهدة لها .

كذلك زادت الضغوط على البيئة الساحلية نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد اللنشات والمركبات التروحية والسياحية التي تلقى بمخلفاتها المختلفة في المياه؛ مما نتج عنه تدهور الشواطئ في بعض مناطق جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وفي عام ١٩٧٦ وقعت دول حوض البحر الأبيض المتوسط(ومنها منصر) على اتفاقـية برشلونة لحماية البـحر المتوسط من التلوث، وبروتوكـول منع تلوث المتوسط بنفايات البواخــر والطائرات، وبروتوكول التعاون في مكافحــة تلوث المتوسط بالنفط والمواد الضارة الأخرى في حالات الطوارئ. ولقد بدأ سريان اتفاقية برشلونة في عام ١٩٧٨ ، وفي نفس العام أنشئ في مالطا مركز إقليمي لمكافحة التلوث بالنفط. وفي عام ١٩٧٩ وضمعت «الخطة الزرقاء» للإدارة الطويلة الأجل للمتوسط بهدف دمج الخطط الإنمائية مع تدابير حماية البيئة. ثم تم إقرار بروتوكول يحد من تلوث البحر من مصادر برية، وبروتوكول يتعلق بحماية أنواع الحياة الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض وموائلها. وهناك بروتوكول خامس يتعلق بالتلوث الناجم عن التنقيب والاستخلال في الرصيف القاري وقياع البحر وتربته التحتية. وفي عام ١٩٩٨ تم الاتفاق في لشبونة على حظر إلقاء المنشآت الفولاذية في البحر، كما تقرر إجراء تخفيضات جوهرية في تصريف المواد المشعبة مع حلول سنة ٢٠٠٠. وفي سنة ٢٠٢٠ يجب أن تصبح تركسيزات المواد المشعة التي تطمر في قاع البحر قسريبة من الصفر. ويقضي الاتفاق أيضًا بجعل تركيزات المواد الكيميائية الدائمة المقاومة (persistent chemicals) قريبة من الصفر بحلول سنة ٢٠٢٠ وبالرغم من كل هذه البروتوكولات والنوايا الطيبة، لم تفلح الجهود المختلفة في إحراز تقدم ملموس في حالة البحر المتوسط. فلا تزال قدرات البلدان النامية المطلة على البحر (ومنها مصر) قاصرة بصورة عامة عن التصدى للمشكلات التي تتعرض لها بيئاتها البحرية والساحلية.

ومن ناحية أخرى، بدأت في منتصف السبعينيات بعض الأنشطة المتواضعة لحماية بيئة البحر الأحمر تحت مظلة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. ونظراً للظروف السياسية التي سادت المنطقة لم يتم التوصل إلى اتفاق حول خطة عمل مشتركة إلا في ١٩٨٧، حيث تم إقرار خطة عمل لحماية البيئة البحرية وتنمية المناطق الساحلية في البحر الأحمر وخليج عمدن، واتفاقية إقليمية لحماية البيئة، وبروتوكولا للتعاون الإقليمي لمكافحة التلوث بالنفط والمواد الضارة الأخرى في حالات الطوارئ. وفي عام ١٩٩٨ تم وضع برنامج إستراتيجي بمساعدة

البنك الدولى يكون بمشابة إطار إقليمى لحسماية البيشة والتنمية المستدامة للمناطق الساحلية والموارد البحرية بالبحر الأحمر وخليج عدن. وتقوم المنظمة الإقليمية لصون بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (ومقرها جدة) بالإشراف على تنفيذ هذا البرنامج.

٤. تدهور الترية والتصحر

تعتمد إنتاجية الأراضى الزراعية أساسا على تكوين التربة وأسلوب إدارتها. فالتربة تحتوى على مكونات معدنية ومواد عضوية وحيوية دقيقة فى توازن ديناميكى طبيعى تكونت مفرداته على امتداد آلاف وملايين السنين خلال عصور جيولوجية. ويؤدى الإخلال بهذا التوازن، والذى قد ينتج عن سوء استخدام الأرض وإدارتها، إلى تدهور التربة فى أعوام قليلة.

وتعتبر عملية تدهور التربة عـملية معقدة تسـببها عوامل مـختلفة طبيـعية وكيمـيائية وبيولوجية. وتتعرض الأراضى الزراعية في مصر لأنماط متعددة من التدهور أهمها: زيادة ملوحة التربة والتشبع بالمياه (التطبيل)، وزحف الرمال، والتلوث الكيميائي والبيولوجي.

وترجع عمليات تشبع الأرض بالمياه وزيادة ملوحتها إلى استخدام وسائل الرى القديمة، فمثلا أدى الاستخدام المفرط لمياه الرى - مع سوء الصرف - إلى ظهور مناسب ضحلة للمياه الجوفية، مع زيادة ملوحة التربة فى الواحات بالصحراء الغربية. كذلك أدى التحول إلى الرى الدائم فى وادى النيل والدلتا دون مصاحبة ذلك بإنشاء نظام صرف جيد إلى رفع مستوى المياه الجوفية وزيادة ملوحة التربة فى العديد من المناطق المنخفضة. وفى شمال الدلتا وساحل البحر الأبيض المتوسط أدى السحب الزائد للمياه الجوفية إلى تسرب مياه البحر المالحة إلى خزانات المياه الجوفية عما ترتب عليه زيادة ملوحة الأراضى الزراعية فى هذه المناطق. وتشير التقارير المختلفة إلى أن حوالى ٣٥٪ من الأراضى الزراعية فى مصر كانت تعانى مشكلة زيادة الملوحة فى سنة ١٩٩١/١٩٩. وتصل النسبة المثوية لهذه الأراضى إلى ديادة الملوحة فى سنة ١٩٩١/١٩٩. وتصل النسبة المثوية لهذه الأراضى إلى ١٠٠٪ فى محافظة المحيرة (٢٢).

ويشكل التكلس مع وجود جبس بالتربة وتأثير الرياح على سطح التربة خاصة عند حواف الصحراء، ظواهر إضافية لتدهور التربة. هذا ولقد أدت الزيادة الكبيرة في استخدام الكيماويات الزراعية والمواد البيولوجية المحفرة على نمو النباتات في مصر إلى زيادة تلوث التربة بهذه المركبات مما أدى إلى تدهور إنتاجيتها.

ويقدر أن التسبع بالمياه وزيادة ملوحة التربة تسبباً في خفض إنتاجية الأرض بحوالي ١٤٪، في حين تسببت العوامل الكيميائية والبيولوجية والطبيعية في خفض الإنتاجية بحوالي ١٠٪، وذلك في منتصف الأمانىنيات(٣٥٪).

ويرجع تدهور الأراضي المستخدمة في الزراعة إلى تضافر مجموعة من العوامل هي:

١- الاستغلال المتزايد والذي يفوق طاقة التحمل الطبيعية لنظام الموارد الأرضية.

٢_ النظام البيتي الهش للأراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة.

وأهم القوى المؤدية للإفراط في الاستغلال هي:

١- الزيادة السكانية والتزايد المستمر في احتياجات السكان.

- ٢- العمليات الاجتماعية _ السياسية التى تدفع المجتمعات الريفية لإعادة توجيه إنتاجها نحو السوق المحلى والعالمي (أى التحول من اقتصاد الكفاف إلى الاقتصاد التجاري).
- ٣- العمليات الاقتصادية (وتشمل آليات السوق الدولية) التي تؤدى إلى إضعاف القيمة التسويقية للمنتجات الريفية، والزيادة المستمرة في أسعار السلع التي يحتاج إليها السكان الريفيون.
- ٤ـ عمليات التنمية القومية، وخاصة التوسع في الأراضي الزراعية لإنتاج المحاصيل النقدية، والتي تؤدى إلى تزايد الصراع على استخدام الأرض والمياه.

وتمثل ظاهرة تدهور الأرض، خاصة في المناطق المتطرفة قرب الحدود بين الزراعة والصحراء، خطرا يهدد التنمية الـزراعية المستمرة. إذ إن تدهور الأراضي في هذه المناطق يؤدي إلى التصحر. ويشجع على ذلك الجيفاف وعدم سقوط الأمطار(التي تساعد على تثبيت التربة) والرياح النشطة. وهناك مناطق تعرضت فعلاً لما يمكن أن يسمى بالتصحر في بني سويف والمنيا وأسيوط بالقرب من الحد الفاصل مع الصحاري المجاورة(٣٦).

وفى يونيو ١٩٩٤ تم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر فى البلدان التى تعمانى الجفاف الشديد أو التمصحر، وبخاصة فى إفريقيا. وهى تلزم البلدان الأعضاء باتخاذ إجراءات فعالة مدعومة بتعاون دولى بهدف الإسهام فى تحقيق التنمية المستدامة فى المناطق المتأثرة. كما تدعو إلى اعتماد إستراتيجيات متكاملة طويلة

الأجل في المناطق المتأثرة تركز على تحسين إنتاجية الأراضى وإعادة تأهيلها وحفظ الموارد من الأراضى والموارد المائية وإدارتها إدارة مستدامة، مما يؤدى إلى تحسين أحوال المعيشة، ولا سيما على مستوى المجتمعات المحلية. وتتعهد الأطراف من البلدان المتقدمة بدعم جهود البلدان النامية المتأثرة بمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وبتقديم موارد مالية كبيرة وأشكال دعم أخرى لمساعدة هذه البلدان على وضع وتنفيذ الخطط والإستراتيجيات الطويلة الأجل الخاصة بها، وبتعزيز حصولها على التكنولوجيا والمعرفة والدراية العلمية المناسبة. ولقد وقعت مصر على اتفاقية مكافحة التصحر في أكتوبر ١٩٩٤، وصدقت عليها في يوليو ١٩٩٥.

٥- المشكلات البيئية في المناطق الحضرية

تبلغ نسبة السكان الذين يعيشون في المناطق الحضرية في مصر نحو 33%، وتقدر نسبة النمو الحضرى بحوالى ٧٪ سنويا. ويرجع هذا النمو إلى الزيادة الطبيعية في سكان الحضر وإلى الهجرة من الريف إلى المدينة. وتعد القاهرة والإسكندرية ومدن منطقة قناة السويس المراكز الرئيسية لجذب المهاجرين من الريف الذين يأتى معظمهم من محافظات المنوفية والدقهلية والشرقية وأسيوط وسوهاج وقنا.

والمناطق الحضرية توفر اقتصاديات متعددة تسمح بازدهار وتنوع الصناعة والتجارة وخلق فرص العمل وبتوفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية المختلفة، مما يجعلها تشكل مناطق جذب خاصة مع تدنى نوعية الحياة فى الريف. ولقد أدت معدلات الزيادة المطردة فى التحضر إلى إيجاد مشكلات اقتصادية واجتماعية وبيئية متنوعة لأن البنية الأساسية واقتصاديات المناطق الحضرية لم تتمكن من استيعاب هذه الزيادة. وأصبحت المدن الآن مسرحًا لتناقضات كثيرة. ففى الوقت الذى تساهم فيه المدن فى التنمية البشرية، أصبحت تحد منها. وفى الوقت الذى تشكل فيه المدن مراكز للثروة، فإنها تحتوى على جزر متزايدة من الفقر المدقع. وفى الوقت الذى تظهر فيه المدن إبداع البشر، فإنها أيضا تظهر أسوأ صحور الجشع . وإذا كانت المدن تخظى بأفضل الخدمات الاجتماعية فى الدولة، فإنها أصبحت أيضا موطنًا المدن اجتماعية متنوعة وخطيرة.

بالإضافة إلى هذا، هناك تباين واضح فى نوعية الحياة وحالة البيئة داخل المناطق الحضرية نفسها. وأولى معالم هذا التباين انتشار ما يعرف بالمناطق الهامشية والعشوائية التى تشترك فى عدة صفات أهمها:

- ـ الكثافة السكانية العالية والمكدسة في منازل دون المستوى.
 - ـ النقص في مياه الشرب وفي الصرف الصحي.
 - ـ النقص في الطرق المهدة.
 - ـ نقص عمليات جمع القمامة كلية أو لدرجة كبيرة .
- ـ نقص الخدمات العامة، خاصة الخدمات الطبية والتعليمية الأساسية.
 - _ انتشار البطالة والأمية.

ولقد أدت المشاركة في هذا البؤس إلى تحويل معظم هذه المناطق إلى مجتمعات شبه مغلقة. أصبحت مصادر رئيسية لأعمال غير مسشروعة، مثل الاتجار في المخدرات والإدمان والسرقة والعنف وغيرها. وبالإضافة إلى ذلك ترتفع في هذه المناطق معدلات الإصابة بالأمراض المعدية، نتيجة التلوث البيئي، ومعدلات الوفيات بين الأطفال تحت سن الخامسة، مقارنة بالأحياء الأخرى من المدينة. ومن ناحية أخرى أصبحت المناطق العشوائية مصدرا للعمالة المتنقلة وخاصة الأطفال الذين يطلق عليهم «أطفال الشوارع». وهؤلاء الأطفال يعيشون على بيع منتجات مختلفة لتجار أكبر سنا، أو يحترفون النشل وسرقة المتاجر والمنازل لحساب الغير وسرعان ما ينتهى بهم الأمر إلى عالم الجريمة والسجن.

وتعد المناطق العشوائية من أكثر المناطق تأثرا بالكوارث الطبيعية والحوادث الصناعية. فمعظم ضحايا زلزال أكتوبر ١٩٩٢ كانوا من الأحياء الفقيرة المكتظة بالسكان الذين يعيشون في منازل آيلة للسقوط أو دون المستوى. وكذلك كان من أصيبوا في حريق منشية ناصر عام ١٩٧٦ _ وهي ذات المنطقة التي تعرضت بعد ذلك إلى انهيار جزء من جبل المقطم عليها في ديسمبر ١٩٩٢ _ وضحايا السيول التي اجتاحت مناطق متفرقة في مصر في شتاء ١٩٩٤ .

وقد قدرت وزارة الإسكان والمرافق في سنة ١٩٩٤ نسبة السكان الذين يعيشون في مناطق عشوائية في محافظة القاهرة بنحو ٢٨٪، وفي محافظة الجيزة ٢٥٪، وفي محافظة القلوبية ٤٤٪. أي أنه في منطقة القاهرة الكبرى يعيش نحو ٤٤٪ من السكان في تجمعات عشوائية. وفي محافظة الإسكندرية يعيش نحو ٤٪ من السكان في مثل هذه التجمعات. وتتفاوت نسب السكان الذين يعيشون في مناطق عشوائية في باقي المحافظات، ولكنها بصورة عامة أعلى في الوجه القبلي عنها في الوجه البحري.

مياه الشرب

توضح بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء(٣٧) الوضع التالي بالنسبة لإمدادات مياه الشرب في المناطق الحضرية في عام ١٩٩٦:

_ ٩ , ٨٥٪ من السكان تصل إلى مساكنهم مياه الشرب عبر توصيلات الشبكة العامة

- ٨, ٤٪ من السكان يحمصلون على المياه من حنفية مركزية تصل إلى داخل منازلهم من الشبكة العامة

- ٦, ٥٪ من السكان يحصلون على المياه من حنفية مركزية خارج منازلهم متصلة بالشبكة العامة.

- ٧ و٣٪ من السكان يحصلون على المياه من طلمبات.

والمجمموعات الثلاثة الأخميرة من السكان(١, ١٤٪) يعيش معظمها في مناطق عشوائية.

وقد قدرت وزارة الإسكان والمرافق في سنة ١٩٩٨ سعة محطات مياه الشرب في المناطق الحضرية بحوالي ١٤,٤ مليون متر مكعب يوميا. وبفرض أنها تعمل بطاقة ٠٨٪ في المتوسط، وبحساب الفاقد في مياه الشرب نتيجة المشكلات الفنية والتسرب من التوصيلات . إلخ (حوالي ٣٠٪ على أقل تقدير)، فإن متوسط حصة الفرد في المناطق الحضرية من مياه الشرب يكون ٣٣٥ لترا يوميا. وهذا المتوسط لا يعكس الفروق الكبيرة الموجودة بين المدن المختلفة أو بين المناطق المختلفة داخل المدينة الواحدة.

ويقدر مـتوسط استـخدام المياه للفـرد في القاهرة والإسكندرية بنحـو ٣٥٠ لترا يوميا، وهو أعلى من متوسط اسـتخدام الفرد في المدن الأخرى (١٠٠-١٥٠ لترا). وتجدر الإسـارة هنا إلى أن المتطلبـات الأساسـية من الميـاه النظيفة تقدر بنـحو ٥٠ لترا/ فرد/يوم للشرب والنظافة الشخـصية والطهى (٣٨) وهناك تقديرات أخرى لهذا الحد الأدنى (١٠٠ لتر/ فرد/يوم).

وتختلف نوعية المياه من مدينة إلى أخرى، وحتى من منطقة إلى أخرى داخل المدينة نفسها طبقا لمصدر المياه والتكنولوجيا المستخدمة في عمليات تنقيتها. ولقد وجد أن مياه الشرب في بعض المدن لا تطابق المعاييسر الإرشادية التي وضعتها منظمة

الصحة العالمية، كما يتكرر الإعلان في كل عام تقريبا عن حالات تلوث لمياه الشرب ينتج عنها حالات وباثية من الكوليرا والتيفود في بعض المناطق، خاصة في الصيف. ولقد أدى تدنى نوعية مياه الشرب إلى انتشار صناعة تنقية المياه وتعبئتها في زجاجات تباع تجاريا تحت أسماء مختلفة. وهذه المياه المعبأة ليست مياها «معدنية»، وإنما هي مياه عادية تمت تنقيتها باستخدام تكنولوجيات متقدمة.

الصرف الصحي

تقدر نسبة سكان الحضر الذين تصلهم شبكات الصرف الصحى (المجارى) بحوالى ٧٤,٨٪، في حين أن الباقى (٢,٢٥٪) ومعظمهم من سكان المناطق العشوائية ـ لا تصلهم هذه الشبكات(٣٧)، ويعتمدون على سيارات «نزح» المجارى التى تقوم من آن إلى آخر بسحب المخلفات وتفريغها في المصارف الزراعية القريبة من المدن أو في أماكن صحراوية قريبة، حسب الموقع الجغرافي للمدينة. وبالرغم من وجود محطات لمعالجة مياه الصرف الصحى في عدد من المدن، إلا أن الغالبية منها قديمة ومتهالكة المعدات ولا تعمل بالكفاءة المطلوبة. وفي أغلب الأحوال لا تتعدى مرحلة المعالجة المرحلة الأولى (المعالجة الابتدائية).

المخلفات البلدية الصلبة

تتكون المخلفات البلدية الصلبة (القمامة) من المخلفات المنزلية ومخلفات المحال التجارية وغيرها من المنشآت وبقايا أعمال الهدم والبناء. وتختلف كمية المخلفات التي يولدها الفرد من مدينة إلى أخرى، وكذلك من منطقة إلى أخرى داخل نفس المدينة. وتشير دراسات المركز الدولى للبيئة والتنمية بالقاهرة خلال الفترة من ١٩٩٥ حتى الآن إلى أن متوسط ما يتولد من مخلفات صلبة بالمناطق الحضرية هو نحو ٩ و كيلوجرام للفرد كل يوم وذلك في عام ١٩٩٩. أى أن كمية المخلفات البلدية الصلبة التي تتولد في المناطق الحضرية في مصر تبلغ ما يقرب من ٢٤٢٩ طنا يوميا(أو ٩ و ٨ مليون طن سنويا). كما يشير نفس المصدر إلى أن المخلفات البلدية الصلبة تتكون عادة من ٥٠٪ مواد عضوية (بقايا الأكل والخضراوات . . إلخ)، ١٥٪ ورق، ٣٪ معادن (علب الومنيوم وصفيح . . إلخ)، ٣٪ زجاج، ٣٪ بلاستيك، ٢٪ أقمشة (كهنة)، والباقي (٣٣٪) مكونات أخرى.

وتشكل المخلفات البلدية الصلبة في المناطق الحضرية مشكلة بيئية مهمة بسبب

القصور العام في إدارة هذه المخلفات (التجميع - النقل - الفرز والتدوير - أو التخلص النهائي من المخلفات). وفي الرقت الحالي يتراوح معدل جمع المخلفات الصلبة في المدن بواسطة القطاع الحاص (الزبالين) وأجهزة النظافة الحكومية ما بين عدر ٧٤٠٠٠. وتحدث أعلى معدلات لجمع المخلفات الصلبة في المناطق التي يسكنها أصحاب الدخول العالية. أما في الأحياء الفقيرة، فلا تتعدى نسبة جمع المخلفات فيها ٢٠٠٠. ويؤدى هذا إلى تكدس المخلفات في الشوارع وفي المساحات الفضاء، وتتحول أكوامها إلى مواقع لتكاثر وانتشار الحشرات والقوارض والحيوانات الضالة. وفي بعض الأحياء يقوم بعض الأهالي بحرق أكوام القمامة، مما يؤدى إلى انبعاث الدخان وملوثات أخرى في الهواء.

وفي بعض المدن (خاصة القاهرة والإسكندرية) يقوم القطاع الخاص (الزبالون) بعمليات فرز مختلفة لتدوير بعض مكونات القمامة (مثل الزجاج والورق والكهنة والصفيح والبلاستيك). وتتم هذه العمليات في تجمعات الزبالين العشوائية على أطراف هذه المدن (منشية ناصر بالقرب من المقطم مشلا). ويوجد الآن وحدات لتصنيع السماد العضوى من المكونات العضوية الموجودة في المخلفات الصلبة في حوالي عشر مدن، ويبلغ إجمالي سعة هذه الوحدات ١٦٠٠ طن يوميا. ولكن تواجه هذه الوحدات مشكلات مختلفة في تشغيلها أهمها عدم انتظام عمليات جمع وتوريد القمامة لها، وقلة المواد العضوية في مخلفات بعض المدن، وسوء عمليات الفرز (مما ينتج عنه تواجد كسر زجاج ومواد أخرى في السماد العضوى المنتج)، وعدم وجود أسواق قريبة لبيع السماد العضوى المنتج، وغير ذلك من مشاكل تؤثر في كفاءة وجدوى هذه الوحدات.

ولا توجد فى مصر مدافن صحية للمخلفات البلدية الصلبة بالمعنى المتعارف عليه عالميا. وتقوم أجهزة النظافة فى بعض المدن (قطاع حكومى أو خاص) بإلقاء ما يتم جمعه من مخلفات من الشوارع والمنشآت المختلفة فى المناطق الصحراوية القريبة من المدن (على سبيل المشال طريق القطامية وطريق مصر ـ السويس والمناطق القريبة من مدن الصعيد حسب موقع كل مدينة). وفى بعض الأحيان يؤدى الاشتعال الذاتى فى أكوام القمامة إلى تصاعد الدخان الكثيف منها لينقله الهواء إلى مسافات مختلفة.

تلوث الهواء والضوضاء

أشرنا فيما سبق إلى موضوع تدهور نوعية الهواء في المناطق الحيضرية، ونود

الإشارة هذا إلى أن اختناقات المرور المتزايدة في المدن لها أثر كبير على ريادة تدهور نوعية الهواء. فالسيارات الواقفة أو التي تسير ببطء في اختناقات المرور تستهلك وقودا أكثر وتنبعث منها كميات من بعض الملوئات (مثل أول أكسيد الكربون) أكبر عما لو كانت تسير بمعدلاتها الطبيعية. ويعد هذا خسارة اقتصادية كبيرة (الخسارة لا تقتصر على ثمن الوقود الضائع، فحسب وإنما تتضمن أيضًا نفقات علاج المرض المترتب على تلوث الهواء والتي سبق الإشارة إليها). ولقد قدرت الخسارة الاقتصادية الناجمة عن اختناقات المرور في مدينة بانجكوك بتايلاند بحوالي ٢٧٢ مليون دولار سنويا، ويرى المؤلف أنها تزيد على ذلك (قد تصل إلى ٣٠٠ مليون دولار سنويا) في القاهرة الكبرى وحدها.

٦- المشكلات البيئية في المناطق الريضية

تعتبر الأوضاع البيئية في المناطق الريفية أكثر تدهورا منها في المناطق الحضرية، خاصة مع انتشار الفقر والأمية في الريف (نسبة السكان الفقراء في المناطق الريفية 7,00% مقارنة بنحو 3,73% في المناطق الحضرية، ونسبة الأمية نحو 23% مقارنة بنحو 77%، طبقا لتقرير التنمية البشرية في مصر عام 1997). وتوضيح الدراسات أن هناك مشكلات كثيرة لها تأثير سلبي على الحياة الاقتصادية والاجتماعية (وبالتالي على الأحوال البيئية) في القرى المصرية، وأهم هذه المشاكل هي:

- ا ـ تنتشر مشكلات الرى والصرف فى معظم القرى. ومن أهم هذه المشكلات عدم انتظام نوبات الرى وعدم تطهير الترع والقنوات، وارتفاع مستوى المياه الجوفية. وقد ترتب على ذلك تدهور إنتاجية الأراضى الزراعية القديمة، وارتفاع تكاليف الإنتاج بها. بل إن الأراضى المستصلحة تعانى مشكلات فى الرى، خاصة عدم كفاية إمدادات المياه، وذلك على الرغم من تطبيق أساليب الرى الموفرة للمياه فيها. كذلك تواجه شبكة الصرف المغطى فى بعض القرى مشاكل ناجمة عن انعدام الصيانة وكثرة الأعطال. ويترتب على مشكلات الرى والصرف ارتفاع ملوحة التربة فى الكثير من الأراضى الزراعية خاصة فى صعيد مصر.
- ٢ ـ تنتشر الأسر كبيرة العدد في الريف المصرى بينما لا يحتكم معظمها سوى على حيازات صغيرة جدا من الأرض الزراعية. وينعكس ذلك في شكل ارتفاع معدلات الإعالة من جهة، وزيادة حجم البطالة المقنعة من جهة أخرى.

- " _ غالبية أهل القرى من العمال غير المهرة الذين يفتقدون الخبرات الفنية الضرورية سواء لتحديث الزراعة أو القيام بعمليات تصنيع دراعى، أو أعمال حرفية، يمكن أن تتيح لهم دخولا أكبر. وهم يعتمدون بصفة رئيسية على دراعة محاصيل تقليدية منخفضة العائد.
- ٤ ـ هناك قصور شديد فى الخدمات التعليمية الأساسية والرعاية الصحية والاجتماعية فى معظم القرى. وبالإضافة إلى ذلك هناك نقص شديد فى شبكات الطرق المهدة والمرافق (إمدادات مياه الشرب والصرف الصحى) وسائر مكونات البنية الاساسية اللازمة لسد المتطلبات الأساسية لسكان الريف.

ونتيجة للتدنى المستمر فى نوعية الحياة فى المناطق الريفية ارتفعت معدلات الهجرة من الريف إلى المدينة وإلى خاج البلاد (خاصة إلى دول الخليج العربية) بحثا عن فرص أخرى وحياة أفضل. ومع أن الهجرة خارج الحدود القومية أدت إلى تحسين نوعية الحياة بالنسبة لعدد كبير من الأفراد، واعتبرت مصدراً مهما للعملات الأجنبية للدولة، إلا أنها أوجدت عدداً من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. فمثلا أدت هجرة الأعداد المتزايدة من المزارعين من المناطق الريفية إلى نقص العمالة الزراعية على الإنتاج الزراعي عما ترتب عليه ارتفاع كبير فى أجورها. وكان لهذا آثار سلبية على الإنتاج الزراعي فى المزارع الصغيرة والتجارية. ومن ناحية أخرى أدت هجرة العمالة الزراعية (ومعظمها من الذكور) إلى ارتفاع نسبة عمالة الإناث فى الزراعة فى بعض المناطق الريفية ؟ عما نتج عنه ما يعرف بتأنيث العمالة الزراعية. ولقد زاد هذا من الأعباء الكثيرة التي تتحملها المرأة فى المناطق الريفية بالفعل.

ومع انخفاض الطلب على الأيدى العاملة في الدول العربية تسبب العمالة العائدة مشكلات مختلفة. فغالبية العائدين يحجمون عن العودة إلى قراهم الأصلية، ويفضلون الإقامة في المناطق الحضرية؛ مما زاد من الضغوط السكانية فيها، وأدى إلى تفاقم الأوضاع البيئية بها. وحتى إذا عادت العمالة المهاجرة إلى قراها، فنادرًا ما تعود إلى مزاولية مهنة فلاحة الأرض. فهناك أعداد كبيرة من العائدين استثمرت مدخراتها في المباني أو في فتح محال تجارية ومقاه إلى غير ذلك من أنشطة تجارية ساهمت في إحداث تحولات مهمة في نمط الحياة التقليدي في القرية وفي سلوكيات أهلها. وقد أصيبت القرية المصرية بعقدة "محاكاة أهل الحضر"، وتحولت تدريجيا من قرية منتجة إلى قرية مستهلكة. وترتب على ذلك تفاقم المشاكل البيئية فيها.

مياهالشرب

توضح بيانات الجهاز المركزى للتعبثة والإحصاء(٣٧) الوضع التالي بالنسبة لإمدادات المياه في المناطق الريفية:

- ٢٤٣,٠ من السكان تصل المياه إلى مساكنهم عبر توصيلات الشبكة العامة.
- ٤, ١٢٪ من السكان يحصلون على المياه من حنفية مركزية خارج منازلهم (على مسافات مختلفة) متصلة بالشبكة العامة.
 - ٥ , ٢٦٪ من السكان يحصلون على المياه من طلمبات.
 - ـ ٢ . ٠٪ من السكان يحصلون على المياه من آبار .
 - ـ ٩ , ٢٪ من السكان يحصلون على المياه من مصادر أخرى (الترع. . إلخ).

وتتفاوت نوعية المياه تفاوتًا كبيرًا طبقًا لمصدرها. وطبقًا لتقرير حالة البيئة ١٩٩٦ الذي أصدره جهاز شتون البيئة، وجدت تركيزات عالية من الألومنيوم والحديد والمنجنيز في مياه السرب في عدد من المناطق الريفية، خاصة تلك الستى تعتمد على المياه الجوفية كمصدر لها.

الصرف الصحي

تقدر نسبة السكان المتصلة منازلهم بشبكات الصرف الصحى بنحو ١٧,٢٪ فقط. أما الباقى (نحو ٨,٢٨٪) فيتخلصون من مخلفاتهم بطرق بدائية مختلفة، أدت إلى إحداث تلوث ملحوظ فى التربة وفى المصارف الزراعية والترع والمياه الجوفية. ويرجع استمرار انتشار البلهارسيا وبعض الأمراض الأخرى فى الريف المصرى أساسا للتلوث بالصرف الصحى.

الكهرياء والوقود

تصل الكهرباء إلى منازل نحو ٩٢,٨٪ من سكان الريف، في حين يستخدم ٥,٦٪ منهـم الكيروسين للإضاءة و ٤,٠٪ البوتاجاز و ٣,٠٪ وسائل أخرى(٣٧).

ويستخدم أهل القرية المصرية البوتاجار والكيروسين في الطهى والأغراض المنزلية الأخرى، بالإضافة إلى مصادر الطاقة غير التجارية (مثل المخلفات الزراعية من حطب وقش . إلخ وروث الحيوانات المجفف). وتختلف نسب استخدام مصادر الطاقة من قرية إلى أخرى طبقا لموقعها، خاصة قربها من المناطق الحضرية (في هذه الحالة تستخدم كميات أكبر من الكيروسين والبوتاجار لسهولة الحصول عليها). وبصورة عامة تقدر الكميات المستخدمة من مصادر الطاقة غير التجارية في الريف المصرى بنحو ١٢ مليون طن من المخلفات الزراعية ونحو ٢ مليون طن من روث الحيوانات المجفف سنويا. وتعادل هذه الكميات ما يقرب من ٦ مليون طن مكافئ نفط، وذلك طبقًا لتقرير حالة البيئة ١٩٩٦ الصادر عن جهاز شئون البيئة .

ويعتبر حرق المخلفات الزراعية وروث الحيوانات من أهم مصادر تلوث الهواء داخل المنازل في الريف. فينتج عن ذلك انبعاث كميات متفرقة من الدخان المصاحب بمركبات عضوية مختلفة (بعضها يسبب السرطان) وأول أكسيد الكربون وأكاسيد الكبريت والنيتروجين. وتعتبر المرأة أكثر أهل البيت تعرضًا لهذه الملوثات، وكذلك الأطفال الصغار. ولقد بينت دراسات مختلفة (٤٧، ٥٢) زيادة الإصابة بالانسداد الرثوى المزمن والسرطان الأنفى البلعومي لدى النساء في بعض المناطق الريفية نتيجة التعرض لفترات طويلة لدخان المخلفات الزراعية والحيوانية التي تستخدم كوقود. كما يصاب الأطفال عند تعرضهم لمثل هذا التلوث بالتهابات الشعب الهوائية والرثوية الحادة لضعف أجهزتهم التنفسية.

المخلفات الصلية

المخلفات الصلبة التقليدية في المناطق الريفية هي المخلفات الزراعية وروث الحيوانات المجفف وتقدر كميات هذه المخلفات في سنة ١٩٩٩ حسب دراسات المركز الدولي للبيئة والتنمية بالقاهرة كالتالي :

- ـ ٢٣ مليون طن من المخلفات الزراعية سنويا.
- ـ ١٧ مليون طن من روث الحـيوانات (الأبقار ـ الجامـوس ـ الأغنام ـ الماعز . . . إلخ) سنويا.

وكما سبق أن أوضحنا عاليه تستخدم بعض هذه المخلفات كوقود في الأغراض المنزلية. كما تستخدم بعض المخلفات الزراعية كغذاء للحيوانات، ويستخدم بعض

روث الحيوانات كسماد بلدى خاصة فى المزارع الصغيرة. ويتم التخلص من المخلفات التي لا تستخدم إما بحرقها وإما بإلقائها فى المصارف والترع القريبة.

ومع التغيرات التى حدثت فى أنماط الاستهلاك فى القرية المصرية، ارتفعت كمية ما يولده الفرد من مخلفات منزلية صلبة (القمامة). وتقدر الكمية التى يولدها الفرد الآن بنحو ٣٠٠ كيلوجرام يوميا، أى أن إجمالى ما يتولد من قمامة فى المناطق الريفية يبلغ نحو ٣٠٩ مليون طن سنويا. وتتكون هذه المخلفات أساسا من علب الصفيح والألومنيوم والبلاستيك (زجاجات وأكياس) وبعض الزجاج والورق وقلة من المواد العضوية. وهذه التركيبة توضح أنه يتم استخدام معظم المخلفات العضوية (بقايا الخضراوات والأكل. الخ) لإطعام الدواجن أو الحيوانات، كما توضح انخفاض إعادة استخدام العلب والزجاجات عن ذى قبل. ونظرا لأنه لا توجد عمليات جمع للقمامة فى الريف فإنه يتم التخلص منها إما بحرقها أو إلقائها فى المصارف الزراعية والترع المجاورة.

٧. قضايا البيئة العالمية ومدى تأثر مصربها

تآكل طبقة الأوزون

يتكون غاز الأوزون في طبقات الجو العليا (الإستراتوسفير) من التفاعل الطبيعى بين جزيئات الأكسجين وذراته. وفي نفس الوقت تتفكك جزيئات الأوزون إلى جريئات وذرات الأكسجين باستصاص الأشعة فوق البنفسجية _ ب. وهذه التفاعلات(أى تكوين الأوزون وتفتيته) تفاعلات طبيعية مستمرة ومتوازنة تحكمها العوامل الجوية والتركيب الكيميائي لطبقات الجو العليا.

وفي بداية السبعينيات أوضحت بعض الدراسات أن بعض المركبات الكيميائية المنبعثة من أنشطة الإنسان (مثل أكاسيد النتروجين ومركبات الكلوروفلوروكربون والهالونات) تساعد على الإسراع من عملية تفتيت جزيئات غاز الأورون، وبالتالى تخل بالتوازن الطبيعي الموجود، مما قد يؤدي إلى حدوث تآكل للأورون الموجود في طبقات الجو العليا (والمعروف بطبقة الأورون). ولقد ثار جدل علمي كبير منذ ذلك الوقت حول النماذج التي استخدمت في استشراف احتمالات تآكل طبقة الأورون فوق ومدى التآكيل المتوقع، كما اختلفت الآراء حول تفسير حدوث ثقب الأورون فوق القطب الجنوبي في فصل الربيع هناك واختفائه في فصل الصيف (٢٠، ٢٨).

وتوضح التقارير العلمية أن انخفاض ١٪ في طبقة الأوزون قد يؤدى إلى زيادة كمية الأشعة فوق السنفسجية ب ب التي تصل إلى سطح الأرض بنحو ٢٪. وهذه الزيادة قد تؤدى إلى إحداث خلل في جهاز المناعة في جسم الإنسان مما ينتج عنه زيادة الإصابة بالأمراض المعدية المختلفة، وزيادة الإصابة بأمراض العيون خاصة المياه البيضاء، وارتفاع حالات الإصابة بسرطان الجلد. ومن جهة آخرى فإن الزيادة في مستويات الأشعة فوق البنفسجية قد تصاحبها آثار ضارة على عدد كبير من النباتات ومن بينها بعض المحاصيل مثل الخضراوات وفول الصويا والقطن (٢٨).

لذلك اتخد المجتمع الدولى إجراءً وقائيا بالتوقيع على بروتوكول مونتريال فى ١٩٨٧ الذى وضع جدولاً زمنيا لخفض إنتاج واستهلاك مركبات الكلوروفلوروكربون والهالونات التى قد تساعد على تآكل طبقة الأوزون. وفى عام ١٩٩٠ أجريت بعض التعديلات فى بسروتوكول مونتريال للإسراع بإيقاف إنتاج واستهلاك هذه المركبات بحلول عام ٢٠٠٠.

وقضية احتمال تآكل طبقة الأوزون قضية فرضتها الدول المتقدمة (المنتج والمستخدم الرئيسي للمركبات المؤثرة في الأوزون) على المستوى العالمي (أو عولمتها) ذلك أن النماذج أوضحت أن التآكل الذي قد يحدث في طبقة الأوزون لن يكون متساويًا حول الكرة الأرضية، وإنما سيكون بدرجة أكبر في أقصى الشمال وأقصى الجنوب، أي في طبقات الجو العليا فوق هذه الدول. وبمعنى آخر فإن شعوب هذه الدول ستكون أكشر تعرضًا للزيادة المحتملة في الأشعة فوق البنفسجية من شعوب الحزام الأوسط من الكرة الأرضية (بين ٣٠ درجة شمالا و ٣٠ درجة جنوبا) والذي توجد فيه معظم الدول النامية (٢٠ ، ٢٤).

ومصر ليست من الدول المنتجة لمركبات الكلوروفلوروكربون أو الهالونات أو غيرها من المركبات المنصوص عليها في بروتوكول مونتريال وملحقاته، ولكنها تستورد هذه المركبات لصناعات مختلفة. وحيث إن مصر قد وقعت على بروتوكول مونتريال فإنها اهتمت باستبدال هذه المركبات بمركبات بديلة لا تسبب أضرارا بطبقة الأورون. ويرجع هذا الاهتمام أساسًا إلى حصول مصر على عدة معونات أجنبية، خاصة من صندوق حماية الأورون التابع للأمم المتحدة. وتشير بيانات الأمم المتحدة أن مصر كانت تستخدم ٢٨٠٣ طن من مركبات الكلوروفلوروكربون في عام ١٩٨٦ في صناعة المطاط الإسفنجي وأجهزة التبريد والإيروصولات. ولقد تم خفض هذه الكمية إلى حوالي ٢٠١٧ في عام ١٩٩١ نتيجة استبدال مركبات

الكلوروفلوروكربون فى الإيروصولات بمسركبات بديلة وخفض استخدامها فى الصناعات الأخرى. ومن ناحية أخرى تستورد مصر حوالى ٣٦ طنا من الهالونات وحوالى ٢٠٠ طن من ميثيل البروميد سنويا.

غازات الاحتباس الحراري

غار ثانى أكسيد الكربون هوالغار الرئيسى المسبب لما يعرف بظاهرة الاحتباس الحرارى. وتتوقف تركيزاته فى الهواء على الكميات المنبعثة من نشاطات الإنسان خاصة من حرق الوقود الحسفرى كما تتوقف على معدلات إزالته وامتصاصه فى البحار وفى الغطاء النباتى على سطح الأرض فسيما يعرف بالدورة الجيوكيميائية للكربون. ولقد أوضحت الدراسات المختلفة زيادة تركيزات ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى على المستوى العالمي منذ بداية الثورة الصناعية (٢٠، ٢٤). وبالإضافة إلى ثانى أكسيد الكربون هناك عدة غازات أخرى تؤدى إلى حدوث وبالإضافة إلى ثانى أكسيد الكربون هناك عدة غازات أخرى تؤدى إلى حدوث الاحتباس الحرارى أهمها الميشان الذي يتكون من تفاعلات ميكروبية في حقول الأرز وتربية الحيوانات المجترة ومن حرق الكتلة الحيوية (الأشجار والنباتات ومخلفات الحيوانات)، وغاز أكسيد النيتروز الذي يتكون أيضًا من تفاعلات ميكروبية تحدث في الحيوانات)، وغاز أكسيد النيتروز الذي يتكون أيضًا من تفاعلات ميكروبية تحدث في المياه والتربة، ومجموعة غازات الكلوروفلوروكربون.

ولقد أوضحت النماذج الرياضية الحديثة أنه لو تضاعفت تركيزات غاز ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى عن معدلها فى عصر ما قبل الصناعة، فإن هذا سيؤدى إلى رفع درجة الحرارة على سطح الأرض بما يتراوح بين ١,٥ و ٦ درجة مئوية خلال المائة عام القادمة.

ولا تتوافر اليوم أدلة توضح أن ارتفاع درجة حرارة الجو وما قد يصحب ذلك من تغيرات مناخية سيكون له أثر كبير على النظم البيئية على سطح الأرض. فالبعض يرى أن التغيرات التى قد تحدث ستكون مفيدة، في حين يرى البعض الآخر أنها ستكون ضارة. فمثلا بينما قد تزداد إنتاجية بعض الغابات والمحاصيل، فإن البعض الآخر قد تتدهور إنتاجيته. كذلك بينما قد تزداد كمية الأمطار في بعض المناطق في العالم (وبالتالي مواردها المائية)، فإنها قد تشح في بعض المناطق الأخرى مسببة مشكلات كبيرة في موارد المياه. وبالإضافة إلى ذلك يرى البعض أن ارتفاع درجات الحرارة في العالم سيودى إلى ارتفاع سطح البحر (حوالي ٢٠ سم بحلول عام ٢٠٣٠ و ٢٠ سم في نهاية القرن الحالي) مما قد يتسبب في إغراق بعض الجزر المنخفضة والمناطق الساحلية في نهاية القرن الحالي) مما قد يتسبب في إغراق بعض الجزر المنخفضة والمناطق الساحلية

في عدد من الدول. هذا في حين يرى البعض الآخر أن ما سيحدث هو انخفاض في سطح البحر وأن هناك احتمالا لحدوث عصر جليدي جديد.

وتقدر كمية ثانى أكسيد الكربون التى انبعثت فى الغلاف الجوى فى العالم فى عام ١٩٠٠ بحوالى ١٩٦٠ مليون طن، ارتفعت إلى ١٩٥٠ مليون طن فى عام ١٩٥٠ ثم إلى ١٦٩٠ مليون طن فى ا١٩٥٠ ووصلت إلى ٢٢٦٥٤ مليون طن فى عام ١٩٥٦ ثم إلى ١٦٩٠ مليون طن فى عام ١٩٩٦. وتوضح هذه الأرقام الزيادة الكبيرة فى معدلات انبعاث ثانى أكسيد الكربون منذ منتصف القرن الماضى (٢٧، ٣٩). وفى عام ١٩٩٦ كانت الدول المتقدمة مسئولة عن حوالى ٥٠٪ من إجمالى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وحدها مسئولة عن حوالى ٣٣٪ من إجمالى الانبعاثات فى العالم تليها الصين (٨,١٤٪) ودول الاتحاد الأوروبى (٣,٧٪) وروسيا (٧٪)

وكإجراء وقائى تم التوقيع أثناء مؤتمر قمة الأرض فى ريودى جانيرو ١٩٩٢ على معاهدة المناخ الدولية التى بمقتضاها تعمل الدول ـ اختياريا ـ على خفض انبعاث غازات الاحتباس الحرارى، خاصة ثانى أكسيد الكربون، بحلول عام ٢٠٠٠، إلى مستويات عام ١٩٩٠، وفي عام ١٩٩٧ تم توقيع بروتوكول كيوتو، وبمقتضاه تعهدت ٣٨ دولة والاتحاد الأوروبي بخفض الانبعاثات الكلية لغازات الاحتباس الحرارى منها، مجتمعة، بنسبة ٥٪ على الأقل عن مستويات انبعاثات عام ١٩٩٠ وذلك بحلول ٢٠٠٨ ـ ٢٠١٢ (فترة الالتزام المقررة في البروتوكول). كذلك نص بروتوكول كيوتو على أن كل دولة متقدمة ستقوم بمساعدة دولة نامية أو أكثر على خفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحرارى، سيحسب لصالحها نسبة التخفيض حفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحرارى، سيحسب لصالحها نسبة التخفيض التي ستتحقق.

ويوضح جدول رقم (١٢) تقديرات كميات ثانى أكسيد الكربون المنبعثة من مختلف النشاطات في مصر. ومنه يتضح أن مصر كانت مسئولة عن انبعاث ٤٠٠٪ فقط من إجمالي انبعاثات ثانى أكسيد الكربون في العالم في عام ١٩٩٦. وبالرغم من هذا تعمل مصر على خفض هذه الانبعاثات بطرق مختلفة مساهمة منها في التعامل مع قضية احتمال التغيرات المناخية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه القضية هي قضية عالمية لا تكفي مجهودات دولة واحدة أو عدة دول للتعامل معها، وإنما يتطلب ذلك تعاون وتكانف جميع الدول، خاصة تلك التي تنبعث منها أعلى النسب من غازات الاحتباس الحراري في العالم.

جدول رقم (١٢) انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر (بالألف طن)*

إجمالى	من صناحة الأسمنت	من الوقود الحفرى	السنة
711/4	1877	19804	197.
707	3441	PFAAY	1970
2017	10.9	\$7778	194.
77017	4410	7.787	1440
٧ - ۵۲۸	YAYI	۷۵٦٤٠	144.
4178	797	۸۳۷۱۱	1990
474	A · YY	474.64	1997

المصدر: بنك معلومات معهد موارد العالم بواشنطن ومرجع (۲۷) *بالإضافة إلى ذلك هناك حوالى * ٤٥ ألف طن من غاز الميثان و٣٣ ألف طن من غاز أكسيد النيتروز تنبعث سنويا احتبارا من ١٩٩٠

الأثار المحتملة للتغيرات المناخية على مصر

هناك سيناريوهات مختلفة لما يمكن أن يحدث في الدول التي بها مساحات من الأراضى الساحلية المنخفضة إذا ما ارتفع سطح البحر نتيجة الارتفاع المحتمل في درجات الحرارة خلال القرن القادم. وبالنسبة لمصر هناك احتمالات لتأثر مناطق شاسعة في شمـال الدلتا خاصة بين الإسكندرية ودمياط بطول ١٨٠ كيلومـترا تقريبًا وعمق ٥٠ كيلومترا داخل الدلتا. ففي هذه المنطقة يترواح ارتفاع سطح الأرض بين صفر و ٢ متر تقريبا، باستثناء بعض المناطق الصغيرة المتفرقة المعطاه بالكثبان الرملية الساحلية. وطبقا لسيناريوهات ارتفاع سطح البحر المحتمل، إذا ارتفع سطح البحر بنصف متر فسوف يؤدى ذلك إلى غمر نحو ١٥٨,٠٠٠ هكتار في شمال الدلتا بمياه البحر. وفي حالة ارتفاع سطح البحر مترًا واحـدًا فسوف يغمـر نحو ٣٣٩,٠٠٠ هكتار، وإذا ارتفع بمقــدار متريــن فسوف يغــمر نحو ٤٨٤,٠٠٠ هكتـــار. وسوف يترتب على هذا فقدان مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وفقدان الثروة السمكية للبحيرات الشمالية (تشكل حاليا نحو ثلث كمية الأسماك المنتجة في مصر)، والإضرار الكبير بالمنشآت المختلفة خاصة المواني وغيرها في المدن الكبيرة مثل وسوف يترتب على كل هذا آثار اجتماعية واقتصادية هائلة (إزاحة قرابة ٨ ـ١٠ مليون شخص إلى مناطق أخرى _ بطالة _ آثار صحية _ مشكلات اجتماعية مختلفة . . إلخ).

التنوع البيولوجي

التنوع البيولوجي هو تنوع الحياة على الأرض بكل ما فيها من أنواع نباتية وحيوانية، وهو يظهر في ثلاثة مستويات مختلفة من الحياة: النظم الإيكولوجية، والأنواع التي تعيش فيها، والموارد الجينية داخل الأنواع، وهذه النظم والأنواع والموارد عنية ومتنوعة، وقد يصيبها الاندثار والتدهور أو التبسيط مما يؤدى إلى إفقارها واضمحلالها. ويحدث هذا الاضمحلال إما باختفاء بعض الأنواع النباتية والحيوانية في النظم الإيكولوجية، وإما بزوال بعض الأنماط الإيكولوجية أو الأصناف ضمن الأنواع، وإما بندهور العناصر غير الحية واندثارها في البيشات الطبيعية، كاغراف التربة وقلة المياه وجفاف الهواء والتلوث.

ويشكل التنوع البيولوجي مصدرًا رئيسيا للغذاء والكساء والدواء والطاقة على المستوى العالمي، خاصة لأن ٤٠٪ على الأقل من الاقتصاد العالمي ونحو ٩٠٪ من حاجات الفقراء تعتمد على موارد التنوع البيولوجي. ويوجد حوالي ٣٠ مليون نوع على الأرض، تم وصف حوالي مليون ونصف فقط منها ٢٠٠٠، ٥٠٠ حشرات، على الأرض، تم وصف حوالي مليون ونصف فقط منها ٢٥٠، ٥٠٠ حشرات، وليات، ٢٥٠، ٢٥٠ نباتات والباقي من اللافقاريات والفطريات والكائنات العضوية الدقيقة. وتوجد معظم الأنواع بالقرب من خط الاستواء وتقل كلما اتجهنا إلى القطبين الشمالي والجنوبي. ويبلغ تنوع السلالات ذروته في الغابات الاستوائية والشعاب المرجانية (٢٠، ٢٤).

ومصر ليست غنية بالتنوع البيولوجي لطبيعتها الجافة الصحراوية. وطبقًا لتقرير جهاز شتون البيئة عن حاله البيئة ١٩٩٦، تتضمن الحيوانات الثديية في مصر ١٠٣ نوع منها ٣٥ نوع مهدد بالانقراض. وتشمل هذه الحيوانات الغزال المصرى وابن آوى والمضبع المخطط والحفافيش والثعالب وغيرها. وتعد القوارض من أكثر الشدييات انتشاراً في مصر. وهي تعيش في ستة أنواع بميزة من الموائل هي المناطق الصخرية والوعرة، الصحراء، المياه الضحلة الملحية، بساتين النخيل، جداول المياه ويابسة البحر المتوسط ذات المصاطب المدرجة بنباتاتها الصحراوية. وفي مصر حوالي ٤٥٠ نوعا من الطيور منها ١٦ نوعا تعتبر مهددة نتيجة ضغوط الصيد. ومن بين الطيور الصحراوية التي اختفت في مصر النعام. وتسعرض الصقور القناصة للصيد بكثرة بما يهددها بالانقراض.

ويصل عدد الزواحف والبرمائيات في مصر إلى نحو ١٠٠ نوع منها ١٥ نوعا مهددة بالانقراض. ومن بين اللافقاريات هناك نحو عشرة آلاف حشرة. وفي مصر

ظهر ٧٥٥ نوعا من السمك انقرض منها حتى الآن ١٦ نوعا. وتشتمل الأنظمة النباتية في مصر على ٤٤ نوعا من الفيروسات، ٢٣٨ نوعا من البكتريا، ١٢٦٠ نوعا من الفطر، ١١٤٨ نوعا من النباتات الوعائية غيير المؤهرة، ٢٠٧٧ نوعا من النباتات المزهرة. كذلك يوجد في مصر شعاب مرجانية في مواقع مختلفة على ساحل البحر الأحمر، أهمها في جنوب سيناء وبالقرب من الغردقة وساحل علبة عند الطرف الجنوبي من حدود مصر.

وهناك عدة عسوامل تهدد التنوع البيـولوجي في مصر: تدمـير المواثل الطبيعـية، التلوث، والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية. فتجفيف أجزاء من البحيرات شمال الدلتا (وتلويثها) أدى إلى تقلص أعداد الطيور التي تتخذ من هذه البحيرات موثلاً دائمًا أو موسمياً. كذلك أدت التنمية السياحيـة غير السليمـة بيثيا إلى تلف كـبير للشعاب المرجانية في عدة مناطق بالبحر الأحمر، خاصة بالقرب من الغردقة. ولقد صدر القانون ١٠٢ لـسنة ١٩٨٣ في شأن المحميات الطبيعية لينظم أسلوب الحفاظ على الموارد الطبيعية داخل ما يعرف بالمحمية الطبيعية، وهي أي مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية تتميز بما تضمه من كائنات حية: نباتات أو حيوانات أو أسماك أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية. وينص القانون على حظر القيام بأعمال أوتصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحمية. كما يحظر صيد أو نقل أو قتل أو إرعاج الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها. ولقد تم إنشاء ١٧ محمية طبيعية في مصر حتى الآن تغطى نحو ٥,٧٪ من إجمالي مساحة مصر. ومن المخطط زيادة عدد هذه المحميات لكي تغطي نحو ١٥٪ من مساحــة مصر في عام ۲۰۱۷.

الفصل الرابع السياسات و الإدارة البيئية

١. الإجراءات المؤسسية

تعتبر البيئة من القطاعات الأفقية التي تتضمنها أنشطة الوزارات والمؤسسات المختلفة في مصر. ولقد قام عدد من هذه الوزارات والمؤسسات بأنشطة بيئية منذ السنوات الأولى من القرن العشرين. فقام الجيولوجيون والجغرافيون والإيكولوجيون ببعض عمليات المسح لعدد من الموارد الطبيعية في صحاري مصر. وقام مهندسو الري بقياس سرعة سريان مياه النيل ومعدلات تراكم رسوبياته. كذلك اهتمت وزارة الصحة بقضايا تلوث الأغذية ومكافحة بعض الأمراض البيئية مثل البلهارسيا والأمراض المهنية. كما اهتمت وزارة العمل بشئون الأمن الصناعي وبيئة العمل، إلى غير ذلك من أنشطة متعددة في عدد من الوزارات والهيئات الأخرى.

ويمكن تقسيم المؤسسات العاملة في مجالات البيئة في التالي:

- ١ _ مؤسسات تخطيطية.
 - ٢ _ مؤسسات علمية.
- ٣ ـ أجهزة تنفيذية (وزارية).
- ٤ ـ أجهزة تنفيذية محلية (على مستوى المحافظات) .
 - ٥ ـ منظمات غير حكومية (جمعيات أهلية).

أولاً . المؤسسات التخطيطية

أكاديمية البحث العلمي

بعد مـؤتمر إستكهولم ١٩٧٢ أنشأت أكـاديمية البحث العلمي والتكنولوجـيا أول مجلس لبحوث البيئـة لتشجيع البحوث البيئية على المسـتوى القومي والتنسيق بينها.

ووضع المجلس في ١٩٧٤/ ١٩٧٥ أول خطة قومية لبحوث البيئة تضمنت عددًا من مشروعات الأولوية مثل تلوث الهواء والمياه في مناطق حلوان وشبرا الخميمة والإسكندرية. وكانت الأكاديمية تتولى من خلال مجلس بحوث البيئة القضايا البيئية التالية :

- الدراسة وإبداء الرأى في الموضوعات ذات الطابع المحلى والإقليمي أو الدولي الخاصة بالبيئة.
 - ـ تبادل المعلومات وإنشاء النقطة المركزية للمعلومات البيئية .
- دراسة التشريعات الوطنية الصادرة في شأن المسائل البيئية، واقتراح تطويرها وفق المعايير البيئية المتطورة، وبما يلائم ظروف المجتمع المصرى، وأنواع الخدمات العلمية اللازمة لإيجاد مقومات تنفيذها. وكذا التوصية بما يجب الانضمام والموافقة عليه من اتفاقيات دولية تتعلق بموضوعات بيئية.
 - ـ متابعة الأنشطة الدولية في مجال البيئة .
- تنظيم وعقد ندوات علمية على المستويين المحلى والإقليمي المرتبطة بقضايا علمية بيئية .

كما أن تشكيلات الأكاديمية تضم عددا من اللجان القومية، منها ما يهتم بالقضايا البيئية مثل اللجنة القومية العلمية للمسائل البيئية، واللجنة القومية فصون الطبيعة والموارد الأرضية، واللجنة الوطنية للاتفاقية الدولية لحماية البحر المتوسط من التلوث.

مع تراجع البحث العلمى فى مصر بصورة مطردة، تراجعت البحوث الأصلية المتعمقة للموضوعات السيئية، واضمحلت الرؤية المستقبلية لأولويات العمل العلمى فى مجالات البيئة.

جهازشنون البيئة

فى أكتوبر ١٩٨٠ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوزارية لحماية البيئة برئاسته وعضوية ٩ وزراء. وحددت مهمة اللجنة فى رسم سياسة قومية لحماية البيئة وتحسينها والمحافظة عليها، وذلك بمراجعة التشريعات المعمول بها فى شأن حماية البيئة ورسم سياسة التنسيق بين جهود الهيئات المحلية والمركزية ومتابعة الخبرة

والتطورات الدولية. وتفرعت عن هذه اللجنة الوزارية لجنة فنية على مستوى وكلاء الوزارات عقدت اجتماعات في عام ١٩٨١ وأجرت حصرا للتشريعات والقرارات الوزارية التي صدرت واتصلت بشنون البيئة، وأعدت ورقة عمل بالخطوط الرئيسية للسياسة القومية المقترحة بشأن البيئة. وعرضت كل هذه البيانات على اللجنة الوزارية للنظر فيها وتقديم توصيات بشأنها للأجهزة التنفيذية.

ومع إعادة تشكيل الوزارة في عام ١٩٨١ ألغيت اللجنة الوزارية لشئون البيئة، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠ لسنة ١٩٨٧ بتشكيل لجنة لشئون البيئة ضمت في عضويتها ١٦ من وكلاء الوزارات المعنية، ورُثى أن ترفع توصياتها إلى اللجنة الوزارية للسياسات والشئون الاقتصادية لإقرارها واتخاذ ما يلزم لتنفيذها. وفي نفس العام صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦١ لسنة ١٩٨٧ بإنشاء جهاد لشئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء ليكون حلقة الاتصال بين رئاسة مجلس الوزراء ومختلف الوزارات والجهات في مجال الحفاظ على البيئة، على أن يتولى الجهاز دراسة وإعداد الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة التي تعرض على اللجنة العليا للسياسات أو على لجنة شئون البيئة، وكذلك متابعة تنفيذ البرامج والخطط المعتمدة.

وفى عام ١٩٨٣ صدر القانون رقم ١٠٢ فى شأن المحميات الطبيعية، ونص على إنشاء صندوق خاص للمساهمة فى تحسين بيئة المحميات وإجراء الدراسات والبحوث فى هذا المجال. وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٦٧ لسنة ١٩٨٣ بإلحاق الصندوق بجهاز شئون البيئة وتسميته "صندوق المحميات الطبيعية". ثم صدر قرار آخر فى ١٩٩٠ باللائحة الداخلية للصندوق.

وفى ١٩٩١ أصدر وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية القرار رقم ٢٠ لسنة ١٩٩١ بإعادة تنظيم جهاز شئون البيئة. وحدد القرار تشكيل مجلس إدارة الجهاز برئاسة الوزير وعضوية عمثلين عن قطاعات الصناعة والموارد المائية والنقل والزراعة والأراضى والصحة والبحث العلمي والبترول والطاقة الجديدة والمتجددة والحكم المحلى والسياحة والآثار واتحاد الإذاعة والتلفزيون والتعاون الدولي والتخطيط واثنين من الخبراء الدوليين وممثل عن رجال الأعمال وممثل عن التنظيمات الشعبية.

وفى عام ١٩٩٤ صدر القانون رقم ٤ فى شأن حماية البيئة، ونص على إنشاء جهاز لحماية وتنمية البيئة برئاسة مجلس الوزراء يسمى «جهاز شئون البيئة» تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص بشئون البيئة، ليحل محل الجهاز المنشأ بالقرار الجمهورى رقم ٦٣١ لسنة ١٩٨٢. كما نص القانون على إنشاء فروع

للجهاز بالمحافظات بقرار من الوزير المختص. وحددت المادة الخامسة من القانون مهام جهاز شئون البيئة في رسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، وتنفيذ بعض المشروعات التجريبية. كما نصت المادة ١٤ من القانون على إنشاء «صندوق حماية الميئة» الذي آلت إليه موارد صندوق المحميات الطبيعية المشار إليه عاليه.

ويتضح من القانون ٤ لسنة ١٩٩٤ أن جهاز شئون البيئة له مسئوليات تنفيذية محدودة للغاية، وأن دوره الرئيسي يتركز في كونه «حافزا ومنسقا» للأنشطة البيئية التي تقوم بها (أو المفروض أن تقوم بها) الوزارات والهيئات المختلفة. ويعمل جهاز شئون البيئة على تشجيع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية بالقيام بدور أكبر في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. ويولى الجهاز أهمية خاصة للتدريب وبناء القدرات القومية. ولقد تم إنشاء فرع لجهاز شئون البيئة لتنسيق جهود الجهات المعنية بحماية البيئة في منطقة القاهرة الكبرى. ومن المنتظر إنشاء سبعة فروع أخرى لتغطى باقي مناطق الجمهورية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا توجد في مصر وزارة للبيئة. وقد تولى وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية مسئولية الإشراف على جهاز شئون البيئة منذ أواخر الثمانينيات. ثم تولى هذه المسئولية وزير قطاع الأعمال ووزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة. وبعد ذلك تم فصل المناصب الشلائة وتعيين «وزير دولة» لشئون البيئة يرأس مجلس إدارة جهاز شئون البيئة.

ثانياً مؤسسات علمية

يهتم عدد كبير من المؤسسات العلمية بالبحوث والدراسات البيئية ويأتى فى مقدمة هذه المؤسسات المركز القومى للبحوث الذى بدأت فيه البحوث العلمية البيئية منذ إنشائه فى عام ١٩٥٦. وتجرى فيه بحوث في مجالات الموارد الطبيعية _ تلوث المياه _ معالجة مخلفات المصانع _ تلوث الهواء – الصحة المهنية إلى غير ذلك من مجالات تتعلق بالبيئة .

وتقوم بعض المعاهد البحثية التابعة لأكاديمية البحث العلمى ببعض البحوث المتعلقة بمجالات البيئة. فيختص معهد علوم البحار ببحوث البيئة البحرية، كما يقوم معهد الأرصاد الفلكية والجيوفيزيقية ومعهد بحوث البترول ومعهد تيودر بلهارس وهيئة الاستشعار من بعد ببعض الأنشطة البحثية في مجالات البيئة.

كذلك أنشأت الجامعات معاهد أو وحدات خاصة تقوم بدراسات بيئية مختلفة. ومن هذه معهد الصحة العامة بجامعة الإسكندرية، ووحدة بحوث الهندسة الصحية التابعة لهندسة الإسكندرية، ومعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس (دراسات عليا في مجالات البيئية)، والمركز القومي لدراسات الأمن الصناعي، ومركز صحة البيئة والصحة المهنية التابع لوزارة الصحة. ولقد قامت معظم الجامعات بتعيين نائب رئيس جامعة لشئون البيئة لتنسيق الدراسات والبحوث الجارية في مختلف الكليات الجامعة.

ثالثًا ـ أجهزة تنفيدُية (وزارية) وزارة الصحة:

تقرم الوزارة بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى بإصدار التشريعات البيئية التى تحد من انتشار التلوث، كما تقوم بالرقابة والتفتيش وإجراء التحاليل الدورية للمخلفات والمنتجات. كذلك تقوم الوزارة بالتفتيش الدورى على الصحة المهنية للعمال المعرضين لأخطار المهنة، ويعاونها في ذلك أجهزة وزارة العمل لمراعاة قوانين الأمن الصناعي.

وزارة الرى:

تعتنى وزارة الرى بحماية مجرى نهر النيل وروافده والمصارف والمسطحات المائية. ومن منطلق مسئوليتها قامت بإصدار القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ لحماية نهر النيل من التلوث، وهي المسئولة عن تطبيق هذا القانون، وقد أعطيت لمهندسيها صفة الضبطية القضائية وتجريم المخالف. كما أنها المسئولة عن إعطاء التراخيص الخاصة بالصرف في المجارى المائية. ويتبع وزارة الرى مركز بحوث المياه الذي يتضمن عدة معاهد بحثية، من بينها معاهد للمحافظة على المياه الجوفية والترع والمصارف ومقاومة الحشائش، ودراسة الآثار الجانبية للسد العالى والاستفادة من بحيرة السد العالى والمنطقة المحيطة، وتنمية الموارد المائية واقتصادياتها.

وزارة الصناعة،

تقوم وزارة الصناعة، من خلال الهيئة العامة للتصنيع، بدراسة العمليات الصناعية وكيفية تطوير العمليات الإنتاجية بغرض الحد من الفاقد في المدخلات الصناعية،

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

وإعادة استخدام المياه بداخل الوحدات الإنتاجية المختلفة، واستبدال المواد الأولية أو الوسيطة الخطرة بأخرى أقل ضررًا بالبيئة، وترشيد استخدام الطاقة في العمليات الصناعية. كما تقوم الوزارة بالإشراف على ضرورة وجود وحدات للحد من التلوث ومعالجة المخلفات في المشروعات الصناعية الجديدة.

وزارة الإسكان؛

يدخل ضمن مستولية وزارة الإسكان إصدار القرارات والتشريعات التى تنظم سلامة البيئة السكانية من مساكن وطرق وحدائق ومرافق. ولذلك فهى مسئولة عن دراسة ومتابعة الاشتراطات الخاصة بمختلف أنواع الأبنية سواء أكانت سكنية أم للصناعة أم للتجارة، محددة لكل نوع منها الاشتراطات الواجب مراعاتها فى تصميم البناء، وذلك حفاظًا على الصحة العامة. كذلك يدخل فى إطار مسئوليات وزارة الإسكان بناء وتشغيل محطات مياه الشرب وإنشاء شبكات الصرف الصحى ومعالجة مياه الصرف الصحى ومعالجة مياه الصرف الصحى ومعالجة مياه الصرف الصحى فى مختلف المدن والقرى.

وزارة البترول:

تراعى الوزارة فى مباشرة نشاطها ـ سواء اعتمدت فى ذلك على الأجهزة الوطنية أم باشرته عن طريق تعاقدات تتم مع الجهات الأجنبية المختصة ـ على وجوب مراعاة الاشتراطات البيئية فى عمليات استكشاف وإنتاج البترول وتكريره. كما تقوم الجهات المعنية التابعة للوزارة بالإشراف على محطات بيع المنتجات البترولية وعمليات تجميع وتدوير الزيوت البترولية المستخدمة، وتشجيع إحلال الغاز الطبيعى محل المنتجات البترولية فى الصناعة والنقل.

وزارة الداخلية:

تقوم وزارة الداخلية عن طريق شرطة المسطحات المائية بمراقبة كافية المسطحات المائية وتحرير المخالفات عن الأعامال التي قد تؤدى إلى التاثير على بيئة هذه المسطحات. كذلك تتولى وزارة الداخلية مسئولية إدارة المرور وتطبيق قانون المرور (بما في ذلك المواد التي تتناول الحد من الانبعاثات من المركبات المختلفة والضوضاء إلى غير ذلك من مواد تتعلق بالبيئة).

وزارة الزراعة:

تختص وزارة الزراعة بوضع السياسة الزراعية من حيث تنظيم الدورة الزراعية وتحديد التركيب المحصولي ومتابعة الإنتاج الزراعي، وتتعاون مع وزارة الرى فيما يتعلق بالمقننات الماثية وتحسين الصرف الزراعي. كما تختص الوزارة بإجراءات الحد من تجريف وتبوير الأراضي الزراعية والحفاظ عليها من التدهور. كذلك تقوم الوزارة بوضع القواعد والإرشادات المنظمة لاستخدام الكيماويات الزراعية (الاسمدة والمبيدات . الخ) للحد من آثارها على البيئة. وتقوم مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة بتنفيذ سياسة الوزارة على مستوى المحافظات المعنية. وتضم الوزارة مركز البحوث الزراعية الذي يضم عدة معاهد بحثية متخصصة، بالإضافة إلى شبكة من محطات تجارب حقلية لإجراء الدراسات والتجارب الحقلية لمختلف مقومات الإنتاج محطات تجارب حقلية لإجراء الدراسات والتجارب الحقلية لمختلف مقومات الإنتاج الزراعي والمحاصيل المختلفة وتحت كافة الظروف المناخية.

وزارة الخارجية،

تتابع وزارة الخارجية الاجتماعات الحكومية الإقليمية والدولية ـ خاصة اجتماعات الأمم المتحدة ـ التى تتناول قضايا البيئة. ولقد أنشأت الورارة مؤخرًا وحدة للتنمية المستدامة لتتبع ما يحدث على الصعيد الإقليمي والدولي في هذا المجال.

رابعًا . أجهزة تنفيذية محلية (على مستوى المحافظات)

صدر قرار بإنشاء مكتب لشئون البيئة بديوان عام كل محافظة من محافظات الجمهورية، بهدف حماية البيئة فيها من التلوث والتدهور وعلى الأخص في مجالات: مياه الشرب، صرف المخلفات السائلة الآدمية والصناعية، الصرف الزراعي، حماية مياه البحر من التلوث وخاصة في المحافظات الساحلية، النظافة العامة، ردم البرك والمستنقعات، تلوث الهواء، صيانة الحياة البرية والحيوانات النافعة، المحافظة على التربة من الكيماويات الصناعية والزراعية بما في ذلك المبيدات والمواد الضارة. كما يختص المكتب بالتعاون مع الأجهزة الأحرى في تنفيذ التشريعات البيئية، ودراسة المشاكل التي تعوق تنفيذها، ودراسة وتحديد المشكلات البيئية المحلية والاستعانة بالأجهزة الفنية المحلية والقومية لوضع الحلول المناسبة لها، ومتابعة الأنشطة المختلفة في المجالات البيئية، بالإضافة إلى نشر الوعي البيئي في

المحافظة عن طريق الندوات والبرامج التدريبية واستخدام أجهزة الإعلام، وتشجيع اشتراك الجماهير في أعمال حماية البيئة .

خامسًا. المنظمات غير الحكومية

تعرف المنظمات غير الحكومية، والتي يطلق عليها في مصر «الجمعيات الأهلية»، بأنها منظمات أو جمعيات تطوعية غير هادفة للربح، يتجاوب المواطنون من خلالها مع قضايا محددة ويعملون من أجلها بصفتهم أفرادا أو مجموعات عمل. وفي دراسة شاملة عن الجمعيات الأهلية في مصر (٤٤) اتضح أن عدد هذه الجمعيات قد بلغ حوالي ١٤٠٠٠ جمعية تعمل في ١٢ نشاطا. ومعظم هذه الجمعيات (٥٤٪) يعمل في مجال المساعدات الاجتماعية، ٢٨٪ في مجال التنمية المحلية، ٢٥٪ في مبدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية، والباقي في مجالات أخرى. وبالنسبة للجمعيات العاملة في مجال حماية البيئة فإنها تصنف ضمن مجموعة الخدمات الثقافية والعلمية. ويقدر عددها بنحو ١٥٠ جمعية .

ويرجع اهتمام الدولة بالموافقة على إنشاء المزيد من الجمعيات الأهلية في السنوات الأخيرة إلى التجاوب مع سياسات مؤسسات التمويل الأجنبية والمنظمات العالمية. فمعظم هذه المؤسسات والمنظمات يقضل الآن تمويل المشروعات التي تتبناها الجمعيات الأهلية. ومؤخرًا أدركت الدولة قيمة الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الأهلى في مواجهة مشكلات المجتمع، خاصة ما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والمشاركة في تقديم الخدمات العامة التعليمية والصحية على وجه الخصوص (الجمعيات العاملة في مجال تنظيم الأسرة، التعليم الأساسي، الأمومة، والمرأة الريفية).

وبالرغم من هذا تواجمه الجمعيات الأهلية في مسصر مشاكل كثيرة تحد من نشاطها، خاصة بعض القيود التشريعية، والنقص في الموارد المالية، بالإضافة إلى مشاكل إدارة الجمعيات وعدم وضوح مفهوم العمل التطوعي. فالتطوع يمتد في مفهومه إلى أبعد بكثير من مجرد العضوية في الجمعيات الأهلية. ولكن تبني هذا المفهوم يحتاج إلى قدرات إدارية وتنظيمية، كما يحتاج إلى تضافر وتعاون بين الجمعيات الأهلية وبين وسائل الإعلام، وهو الأمر المفتقد إلى درجة كبيرة في مصر. وبالرغم من أن نشاط جمعيات حماية البيئة يقتصر في غالب الأمر على عقد الندوات والدورات التدريبية، إلا أن هذا قد ساهم بقدر ملموس في نشر الوعي بقضايا البيئة. ولكن الجمعيات الأهلية لم تستطع حتى الآن تحقيق أهدافها الرئيسية،

وهى إحداث تغيرات ملموسة في سلوكيات الأفراد وتشجيع العمل التطوعي والمشاركة الشعبية الفعالة للتعامل مع المشاكل البيئية المختلفة .

٢. الإجراءات التشريعية

صدر في مصر منذ أوائل القرن الحالى أكثر من ٢٠٠ تشريع تتعلق بطريق مباشر وغير مباشر بحماية البيئة، منها حوالى ١٠٠ تشريع مازال ساريا (أى لم يُلغَ، ولا يعنى ذلك أنه ينفذ). وتتضمن هذه التشريعات مراسيم ملكية، وقرارات جمهورية، وقسوانين، وقرارات لرئيس منجلس الوزراء، وقسرارات وزارية. ويمكن تقسيم هذه التشريعات إلى الأقسام التالية:

- ١ _ تشريعات في مجال النظافة العامة.
- ٢ _ تشريعات خاصة بصرف المخلفات السائلة.
- ٣ ـ تشريعات في مجال البيئة البحرية وتنظيم صيد الأسماك.
 - ٤ _ تشريعات في مجال حماية الهواء من التلوث.
 - ٥ _ تشريعات لتنظيم استخدام المبيدات.
 - ٦ _ تشريعات للحماية من الإشعاعات المؤينة.
 - ٧ ـ تشريعات لحماية نهر النيل والمسطحات المائية.
 - ٨ ـ تشريعات للتخطيط العمراني.
 - ٩ ـ تشريعات لتنظيم استخدام وحماية الأرض الزراعية.
- ١٠ـ تشريعات تنظيمية (مثل إنشاء بعض الأجهزة والمحميات الطبيعية . . إلخ).
 - ١١ _ تشريعات تتعلق ببيئة العمل.

وآخر هذه التشريعات هو القانون ٤ لسنة ١٩٩٤ في شأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٣٨ لسنة ١٩٩٥.

ولكن هناك عدة مشكلات تعوق تنفيذ معظم هذه التشريعات. منها ما يرجع إلى قصور في صياغتها (من النواحي التشريعية والفنية، خاصة فيما يتعلق بالمعايير المختلفة للحد من التلوث). ومنها ما يرجع إلى قصور آليات التنفيذ، والتضارب بين

الجهات المختلفة التي يعهد إليها بالتنفيذ. ولقد أدى ذلك إلى الإحساس العام بعدم جدية وجدوى هذه التسريعات، ونتج عنه عدم النزام مختلف القطاعات والجماهير بها. فعلى سبيل المشال منح القانون لا لسنة ١٩٩٤ المنشآت القائمة مهلة ثلاث سنوات، اعتبارًا من تاريخ نشر لا ثحته التنفيذية، لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه. وانتهت تلك المهلة في أول مارس ١٩٩٨، ولم توفق منشأة واحدة أوضاعها طبقا للمعايير الواردة في اللائحة التنفيذية (معايير الانبعاثات المختلفة) للقانون لا لسنة ١٩٩٤ أو طبقا للمعايير الواردة في اللاؤلاج التنفيذية للقوانين الأخرى المكملة، وفي مقدمتها القانون ٤٨ لسنة ١٩٩٤ نيم النيل والمجارى المائية من التلوث. وبالرغم من أن القانون ٤ لسنة ١٩٩٤ نيظم في مواده ١٩-٢٣ الإجراءات التي تتبع لتقييم الآثار البيئية للمشروعات الجديدة (أو التوسعات في مشروعات قائمة)، إلا أن تنفيذ هذه الإجراءات لا يتم بالجدية الواجبة، واعتبر إعداد تقارير تقييم الآثار البيئية للمشروعات مجرد إجراء شكلي لاستكمال الأوراق للحصول على الترخيص بإنشاء المشروعات مجرد إجراء شكلي لاستكمال الأوراق للحصول على من المشروعات الاستثمارية والقومية تم تنفيذها (أو البدء في تنفيذها) دون إعداد أي من المشروعات الاستثمارية والقومية تم تنفيذها (أو البدء في تنفيذها) دون إعداد أي تقييم لآثارها البيئية.

صدير في عام ١٩٩٩ القانون رقم ١٥٥ بعديل بعض أحكام فانون الرور (القانون رقم ١٥٥ بعديل بعض أحكام فانون الرور (القانون رقم ١٥٥ المورد (القانون رقم ١٧٥ المورد رود اللائحدة رف ١٧٧٧ لملية ١٠٠ وركسفى القانون ولائحت التعديم ورد اللائحاء والمورد المورد والمورد والمورد المورد والمورد وا

ومن ناحية أخرى وقعت مصر على عدد كبير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال حماية البيئة، على سبيل المثال :

- _ الاتفاقيـة المتعلقة بالحفـاظ على الحيوانـات والنبـاتـات على حالتهـا الطبيعـية (لندن ١٩٣٣).
 - ـ الاتفاقية الدولية لحماية الطيور (باريس ١٩٥٠).
 - ـ الاتفاقية الدولية لحماية النباتات (روما ١٩٥١).

- ـ الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالنفط (لندن١٩٥٤ومعدلة في١٩٦٢ و ١٩٦٩).
- ـ اتفاقــية فــيينا الخاصــة بالمسئولــيـــة المدنيــة عن الضرر الناجم عن الطــاقة النووية (١٩٦٣).
 - ـ الاتفاقية الإفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية (الجزائر ١٩٦٨).
 - ـ الاتفاقية المتعلقة بالأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية (رامسار ١٩٧١).
 - ـ الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي في العالم (باريس ١٩٧٢).
 - ـ الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الذي تتسبب فيه السفن (لندن ١٩٧٣).
- اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث (برشلونة ١٩٧٦)، والبروتوكولات التابعة لها .
 - ـ اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة (بون ١٩٧٩).
 - ـ الاتفاقية الإقليمية لحفظ بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (جدة ١٩٨٢).
 - ـ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (١٩٨٢).
 - ـ اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون (فيينا ١٩٨٥).
- ـ بروتوكــول مــونتــريال بشأن المــواد المستنفــذة لطبــقــة الأوزون (مــونتــريال ١٩٨٧ وتعديلات لندن ١٩٨٠ وكوبنهاجن ١٩٨٢).
 - ـ اتفاقية بشأن التبليغ المبكر عن الحوادث النووية (فيينا ١٩٨٦).
- ـ اتفاقيـة بشأن تقـديم المساعـدة في حـالة وقوع حـادث نووى أو إشعـاعي طارئ (فيينا١٩٨٦) .
- اتفاقية بارل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود (بازل ١٩٨٩).
- ـ المعاهدة الإفريقية لخطر استـيراد ونقل النفايات الخطرة عـبر الحدود في إفريقـيا ـ (باماكو ١٩٩١).
 - ـ معاهدة التنوع البيولوجي (ريودي جانيرو ١٩٩٢).
 - ـ المعاهدة الدولية للمناخ (ريودى جانيرو ١٩٩٢).

ـ المعاهدة الدولية للحد من التصحر (١٩٩٤).

وبالإضافة إلى هذه الأمثلة من المعاهدات والاتفاقات، هناك توصيات وإرشادات إقليمية ودولية ليس لها صفة الإلزام القانونية ولكنها تستخدم في إطار النوايا الطيبة والتعاون الدولى، مثل إرشادات لندن الخاصة بتبادل المعلومات عند الاتجار في المواد الكيماوية (لندن ١٩٨٧) وإرشادات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) الخاصة بتوزيع واستخدام المبيدات (روما ١٩٨٥) وغيرها .

اعتمات الحمصة العامة للأم المتحدة في ٢١ مايو ١٩٩٧ اتفاقية دولية حديدة حول قانون الاستحدامات غير الملاحة للمحارى المائية الدولية. ولقد امتعت منصر عن التصلويت عند إفراز الاتفاقية فحمصر ترئ أن هناك عنددا من الاتفاقيات الدولية السارية التي تشكل الإطار القانوني الذي يحكم تقاسم وباء النيل، منها إتفاقيت ١٩٢٩ و١٩٩٩ بين مصر والسودان. وفي ضوء نباين مواقف دول حوض نهير النيل من اتفاقية ١٩٩٧ (امتعت إليبوبيا عن التصويت ولم تشدك كيل من إربتها واعتمال وحمه ورية الكونغو الدعقراطية في التصويت، ووافقت على الاتفاقية كل من الموذان وكينيا؛ واعترضت بوروندي) أصبح غير ذي خدوى الموافقة على الاتفاقية، إذ إنها لي تكون قابلة للتطبيق المناشر ما لم تقم الدول النهرية بإدام اتفاق خاص ينظم العلاقة بينها:

المصلورة محمود أبوريد «المياه مصدر للتؤثر في الفرن (١٩٢٪ متركز الأهرام للترجية والنشر القاهرة ١٩٩٨:

٣. الإجراءات الاقتصادية

أيقن عدد متزايد من الدول _ خاصة المتقدمة _ أن بعض الأساليب المالية يمكن أن تكون وسيلة فعالة للحث على حماية البيئة. وبعض هذه الأساليب يأخذ شكل حوافز والآخر شكل غرامات وضرائب. وقد قامت دول مختلفة بتطبيق مبدأ «الملوث يدفع»، أى أن الذي يحدث تلوثا عليه تحمل نفقات إزالة هذا التلوث وإعادة تأهيل البيئة إلى ما كانت عليه. وفي مجموعة بلدان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية _ استخدمت عدة أساليب مالية منها فرض رسوم على الانبعاثات ورسوم على الاستخدام (مثل استخدام بعض الطرق والحدائق والسواحل إلى غير ذلك) ورسوم إدارية إلنغ . ومن ناحية أخرى استخدمت هذه الدول الدعم في شكل منح

وقروض ميسرة وإعفاءات لتشجيع الحد من النشاطات الملوثة للبيئة، باستخدام طرق وتقنيات بديلة. كذلك يتم تشجيع إعادة استخدام الفوارغ (مثل رجاجات المشروبات وغيرها لتدويرها) والتخلص من النفايات بطرق أكثر ملائمة للبيئة (على سبيل المثال تجميع البطاريات الجافة لإعادة تصنيع بعض مكوناتها أو التخلص منها بأسلوب سليم).

وفى مصر اتخدت بعض الإجراءات الاقتصادية لحماية البيئة منذ أكثر من خمسين عاما، أقدمها هو فرض رسوم للنظافة تقدر بحوالى ٧٪ من القيمة الإيجارية، وفرض غرامات مالية على إلقاء مخلفات أعمال البناء والهدم فى الشوارع أو فى غير الأماكن المحددة لها. كما استخدم أسلوب إرجاع زجاجات المشروبات على نطاق واسع لإعادة استخدامها (كان الهدف اقتصاديا بالدرجة الأولى). ولقد انقرض هذا الأسلوب مع الانفتاح الاستهلاكى الذى أدى إلى زيادة كمية العبوات الفارغة (من رجاج وبلاستيك وألومنيوم) التى تلقى كمخلفات صلبه (قمامة).

وفى السنوات الأخيرة قامت الدولة بإلغاء الدعم للكيماريات الزراعية (الأسمدة والمبيدات)، وتم رفع أسعار الوقود والكهرباء إلى المستوى العالمي. كما تمت زيادة رسوم المياه بالنسبة للمصانع وكبار المنتفعين. واتخذت هذه الإجراءات لأسباب اقتصادية بحتة، في إطار سياسة التكيف الهيكلي والإصلاح الاقتصادي، ولم تتخذ بهدف ترشيد الاستهلاك أو بهدف بيئي. إذ إن رفع الدعم وزيادة الأسعار لم يحقق ترشيداً يذكر في استهلاك المياه أو الوقود أو غيرها من الموارد، وبالتالي لم يحقق تحسنا يذكر في حالة البيئة. ومن ناحية أخرى فإن الغرامات المنصوص عليها في التشريعات البيئية المختلفة لا يتم تحصيلها في معظم الأحوال نتيجة التراخي في تطبيق هذه التشريعات.

٤ ـ سياسة حماية البيئة في مصر

بالرغم من مرور أكثر من ربع قرن على مؤتمر إستكهولم والصحوة البيئية فى العالم، ومرور نحو عشر سنوات على مؤتمر قمة الأرض الذى عقد فى ريو دى جانيرو فى عام ١٩٩٢، لا توجد فى مصر سياسة قومية لحماية البيئة، أو رؤية مستقبلية لأولويات العمل البيئى. فالخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مستقبلية لأولويات العمل البيئة. فالخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالزراعة والرى «البيئة سوى إشارة عابرة فى الجنوء الخاص بالزراعة والرى «البيعامل مع تدهور الأرض وحسماية الأرض الزراعية والاستخدام الرشيد لمياه الرى، والتنمية الريفية».

وفي عام ١٩٩٢ أصدر جهاز شئون البيئة «خطة العمل البيئي في مصر» التي تضمنت سبعة مجالات هي: المياه والأراضي، تلوث الهواء، النفايات الصلبة، حماية تراث مصر، المحميات الطبيعية، حماية المناطق الساحلية، والجوانب المؤسسية لحماية البيئة. وورد تحت كل مجال من هذه المجالات عدد من الأنشطة الواجبة المتنفيذ. وقد قدرت الاستشمارات اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى من تلك الخطة بنحو ٠٠٠ مليون دولار أمريكي، والمرحلة المثانية بنحو ١٠٠٠ مليون جنيه دولار (أي إجمالي ١٥٠٠ مليون دولار أمريكي، أو نحو ٢٠٠٠ مليون جنيه مصري).

وجاء أول ذكر للسياسات البيئية في الخطة الخمسية الثالثة ١٩٩٣/١٩٩٢_

- ـ وضع البرامج المناسبة في مجال استخدام الموارد وصون البيئة.
 - ـ إنشاء قاعدة للبيانات عن الموارد وعن حالة البيئة.
- التصدى للقفضايا البيئية الرئيسية التي تدخل في مجالات عمل عدد من الهيئات الحكومية والمؤسسات الأهلية.
- السعى لاستكمال التشريعات البيئية باستصدار قانون البيئة الموحدة، وقانون حماية المهواء من التلوث، وقانون حماية المياه البحرية الإقليمية، والعمل على دعم الأجهزة والمؤسسات المنوط بها تنفيذ هذه التشريعات، وهي أجهزة تتبع وزارات ومؤسسات حكومية.
- استكمال دراسة التوابع البيئية لمشروعات التنمية بما فى ذلك موقع الوحدات الصناعية والزراعية والخدمات، واختيار التكنولوجيا المناسبة لمتطلبات حماية البيئة وكفاءة استخدام الموارد، ونظم تناول المخلفات .
- إعطاء الأولوية لتقديم العون الفنى والدعم المالى لمشروعات حماية البيئة وصون الطبيعة والموارد الطبيعية وحماية الستراث الحضارى مما أصابه نتيجة لتدهور الأحوال البيئية.
- ـ وضع برنامج للبحوث والدراسات العلـمية والتطبيقية في مجـالات البيئة وبرنامج للتعليم والتثقيف البيئي ونشر الوعى البيئي.
 - إنشاء الشبكة المتكاملة للرصد البيئي.

وحددت الخطة الخمسية البرامج ذات الأولوية التالية ، على أن تتولى تنفيذها القطاعات المختلفة:

- _ زيادة المساحات الخضراء.
- إدارة المياه العذبة ومعالجة تلوث نهر النيل.
- _ الحفاظ على الأراضي من التدهور البيثي.
- إدارة الموارد البحرية والعمل على حماية الشواطئ والمياه البحرية.
 - إعداد الخريطة البيئية للموارد الطبيعية.
 - حماية الهواء بالمدن المصرية.
 - _ إدارة الخلفات الصلية والخطرة.
 - _ تحسين البيئة المهنية.
 - _ تحسين نوعية الغذاء.
 - ـ حماية التراث الطبيعي والحضاري.
 - _ مجابهة الآثار البيئة للكوارث الطبيعية.
 - ـ تطوير أدوات الإدارة البيئية في مصر.
 - ـ دعم الوعى البيثي والمشاركة الشعبية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن السياسات والبرامج التى وردت فى تلك الخطة الخمسية هى أساسًا عبارة عن قائمة بالموضوعات التى وردت فى خطة العمل البيئى التى أصدرها جهاز شئون البيئة فى عام ١٩٩٢ .

وفى مارس ١٩٩٧ صدرت وثيقة «مصر والقرن الحادى والعشرون». وحددت فيها عدة اتجاهات للسياسة العامة في المستقبل. ووردت فيها فقرة عن «صون البيئة» جاء فيها:

"وفى جميع الأحوال علينا ـ الآن ومستقبلا ـ إدخال البعد البيئى فى خططنا وسياستنا الإنتاجية والاقتصادية، بحيث يكون إنشاء أى مصنع أو إقامة آية منشأة أو مجتمع عمرانى جديد متضمنا ـ منذ دراسة جدواه ـ عوامل ووسائل وتكاليف حماية

البيئة وسلامتها، وفى الوقت نفسه صيانة مواردنا الطبيعية من التدهور، وحمايتها من الاستنزاف، وبذلك نرسى القاعدة الإنسانية والدعامة الاقتصادية للتنمية المتواصلة التى ننشدها من أجل حياة طيبة للإنسان المصرى».

وفى المحاور الإستراتيجية للتنمية وأهدافها حتى ٢٠١٧/٢٠١٦ خصص المحور التاسع للبيئة وحمايتها، وتم التأكيد فيه على ضرورة «المحافظة على حماية البيئة من التلوث بكافة أشكاله وأنواعه ومصادره، إذ لا يتصور أن تتم التنمية دون المحافظة على البيئة ونظافتها وحمايتها». وورد في إطار هذا المحور عدد من الأنشطة البيئية التي ينبغي التعامل معها، معظمها تكرار لما سبق ذكره في خطة ١٩٩٣/١٩٩٢ _ التي ينبغي التعامل معها، معظمها تكرار لما سبق ذكره في خطة ١٩٩٧/١٩٩٢ _ الرابعة ١٩٩٧/١٩٩٠ . وبالرغم من هذا لم تشر المحاور التي ترتكزت عليها الخطة الخمسية الرابعة ١٩٩٧/١٩٩٠ . وإنما أوردت بعض الرابعة ١٩٩٨/١٩٩٠ . وأنما أوردت بعض الأنشطة البيئية في محاور عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة .

وتشير جميع الدراسات والبيانات إلى أنه لم يتم تنفيذ إلا قلة من البرامج التي وردت في خطة العمل البيئي الصادرة في عام ١٩٩٢ وفي الخطة الخمسية المحالم ١٩٩٣/١٩٩٢ عا أدى إلى التدهور المستمر في حالة النظم البيئية المختلفة. ويرجع هذا إلى عدة أسباب أهمها:

- ١ عدم اقتناع قيادات كثيرة في مواقع مختلفة بأهمية حماية البيئة. فما زالت هذه القيادات ترى أن البيئة «ترف»، وأن لدينا مشاكل اقتصادية واجتماعية أهم.
- ٢ تم التركيز في السنوات الماضية وحتى الآن على الإصلاح الاقتصادى الذي نظر له على أنه عملية ضبط للموازنة المالية وتحقيق معدلات نمو للناتج المحلى الإجمالي. وبذلك تم تقليص الاستثمارات في مجالات مختلفة مثل التنمية الاجتماعية وحماية البيئة والبحث العلمي وغيرها.
- ٣ غياب الفهم المتعمق للعلاقة بين البيئة والاقتصاد، وذلك بالرغم من أنه ثبت فى بلدان كثيرة أن التكلفة الاقتصادية للتلف الناجم عن تلوث البيئة تقدر بنحو ٣٪ ٥٪ من الناتج القومى الإجمالى، فى حين أن تكاليف الحد من التدهور البيئة لا تزيد عن ٨, ٠٪ ٥, ١٪ من الناتج القومى الإجمالى. أى أن الاستثمار فى حماية البيئة له عائد اقتصادى واجتماعى كبير على المدى الطويل.
- ٤ ـ اعتبار الإجـراءات البيئية (مثل تقيـيم الآثار البيئية للمشروعـات وتحقيق الالتزام

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

- بالمعايير البيئية . . إلخ) بأنها «معوقات» للاستثمار، مما أدى إلى التراخى في تطبيق التشريعات البيئية المختلفة وإلى إضعاف دور جهاز شئون البيئة .
- عدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفيق الأوضاع البيئية لشركات قطاع الأعمال بحجة أنه سيتم خصخصتها (أدت الأوضاع البيئية المتردية لبعض الشركات إلى تعقيد عملية ببعها).
- ٦ إحجام معظم شركات القطاع الخاص عن الاستثمار في توفيق أوضاعها البيئية للالتزام بالمعايير البيئية المختلفة واتباع أساليب الإدارة البيئية، مما أدى إلى تدهور الأوضاع البيئية في بعض المناطق، خاصة في المدن الصناعية الجديدة.
- ٧ ـ التركيز على مشكلات المناطق الحضرية على حساب المناطق الريفية، مما أدى إلى زيادة تدهور الأوضاع البيئية في الريف، وساعد على ارتفاع معدلات الهجرة من الريف إلى المناطق الحضرية. ولقد أدى هذا بدوره إلى تفاقم مشكلات المناطق الحضرية.

- أعلمت وديرة الدولة لشنون البيئة في يوليو ١٩٩٨ أن تحديات العمل البيئي في مصر تتركز في
- ١- تراكم الشكلات السبئة على مدار ٤٠ عامناه بما يجعل النعامل معتلها
 يتطلب خططا قصيرة المدى وأخرى تنظيرج في حل الشكلات طفا لحجم
 المشكلة وقرال الأمكانات الشرية والمادية
- الجاجة إلى مسرانيات صحمة لحل المشكلات البشية في جميع القطاعات
 (يختاج قطاع الصناعة وحده ما يقوت هو ١٥ مليار حنه مصرى)
 - ٣ له النقص الكبير في العلومات عن الشكلات البية .
 - ٤ أن استخدام اللكنولوجيات غير الماسة في العديد من الانشطة الاقتصادية.
 - ٥ ـ الفصل الوعى العام بالهمية القضابا البيئية وانتثنار سلوكيات خاطئة تجاهها
 - وارضحت الوريرة أن سياحات البيئة في مصر تستند إلى المجاور التالية: ﴿
 - ا يه تعميق الشراكة على المبنوي الوطني ا
 - ٧ تعميق الشراكة على المستوى الشائل، الإقليم، والدولي
 - ٣ ﴿ تَمَلُّ القَانُونَ فَا لَلْكُ ١٩٦٤ فِي شَأَنَ احْمَالِهُ الْلِيثَةِ .
 - ٤ ـ تنمية المحميات الطبيعية وطنون النتوع البنولوجي
- ٥ ـ دعم القدرة المؤسسية لحهاز شنون السيئة رفروعه الإفليمية ومكانب الإدارة السينة بالمحافظات.
 - ٦- دعم انظمة الإدارة البيشة
 - ٧ ـ تفعيل آليات اقتصاديات السوق في مجال حماية البيئة.
- وفي نفس العام ثم توقيع انفاق مع برنامج الانهم المحدة الإنجاق بهدف (أ) ندعيم وحدة التنمية المستدامة بوزارة الشنون الخارجة، (ب) إلشاء وخدة لدعم الديناسيات البيئة محكم وزيرة الدولة لشنون البيئة، (ج)- تحديث خطة العمل البيئي الصادرة في عام ١٩٩٢ (بنتهي المشروع في مايو (١٠٠٢).

المادر:

- (١) بيان رؤيرة الدولة لشتــول البــة إلى لجنة الصحة والسكان والبــــة المؤتمر
 العام للحزب الوظنى . . ٢٠ . ١٧ يوليو ١٩٩٨
- (۲) مشروع رقم EGY/97/013/C/01/99 & EGY/98/G81/A/5G/99 برنامج
 الأمم المتحدة الإنمائي

الفصل الخامس **الوعي البيئي**

يرجع اهتمام المصريين بالمشكلات البيئية إلى العصور القديمة، فمثلا عبر المصريون عن فضل النيل في حياتهم بطرق مختلفة، وقد وردت في هذا الشأن أنشودة سجلتها إحدى أوراق البردى المحقوظة في المتحف البريطاني تقول: «لك الإكرام ياحابي، إنك تظهر لكي تجعل مصر تعيش، إنك تروى الحقول التي خلقها رع (إله الشمس)، وتمد الحيوانات بالحياة. . ». كذلك أحب المصريون القدماء الحدائق، فأنشأها القادرون منهم حول ديارهم. وكان للمصريين عبد اسمه عبد الحدائق، وهو الذي تخضر فيه الأشجار وتتفتح الأزهار وتنضج الثمار. وكان المسكن الفرعوني نتاج تفكير متكامل مدروس، يجمع بين نظريات التخطيط الراقي للمدن وبين نتاج تفكير متكامل مدروس، يجمع بين نظريات التخطيط الراقي للمدن وبين وعناصرها وأثرها وطريقة الاستجابة لها والتعايش معها. وقد تجلى ذلك في تخطيط منازل المدن القديمة مثل «اللاهون» التي شيدت عام ٢١٠ قبل الميلاد، و «تل العمارنة» التي شيدت عام ٢١٠ قبل الميلاد، و «تل العمارنة» التي شيدت عام ١٣٧٠ قبل الميلاد.

وفى مستهل القرن الرابع عشر كان من واجبات والى القاهرة القيام بتحسين المدينة وتزيينها. فيأمر بعمارة ما فى الدور من خلل، وتعمير ما فيها من خراب والاهتمام بتوسعة رحابها وتعلية سقائف أسواقها، ولا يمكن أحدًا من تضييق الطريق أو إحداث ما يضر بالمارة، وأن ينظر فى تنظيف الطرق والرحاب من الأوساخ إن كانت من بيت المال، وإلا فيأمر السكان بنظافة ما حولهم. وحتى سنة ١٨١٣ كان والى القاهرة وأعوانه يمرون فى الشوارع والأسواق ملزمين السكان والتجار بنظافتها ورشها بالمياه. وفى أوائل القرن التاسع عشر أنشئت أقسام البوليس وأذيع عليها التعليمات الواجب اتباعها (منشورة فى الوقائع المصرية فى عام ١٨٨٠) وقد جاء فيها: "ينبغى عند صبيحة كل يوم أن يقوم أهل الأسواق بكنس ورش المنطقة أمام دكاكينهم، وأن عند صبيحة كل يوم أن يقوم أهل الأسواق بكنس ورش المنطقة أمام دكاكينهم، وأن أناسا يلقون القاذورات، يضربهم ضربًا خفيقًا، ويحذرهم من العودة إلى ذلك،

وعلى أقسام البوليس تأديب من يتأخر عن النظافة أمام بيته أو دكانه، ويجب المناداة بذلك والتنبيه على مشايخ الحارات بمراقبة التنفيذ». وفي ديسمبر ١٨٤٣ صدر أمر بإنشاء مبجلس للإشراف على تزيين وتجميل المحروسة وتعديل طرقها. وهذا المثال يوضح لنا مدى الحرص على نظافة وتزيين وتجميل العاصمة منذ أكثر من مائة وخمسين عاما، كما يوضح لنا قدم التشريعات التي تحرص على النظافة (ما تتضمنه التشريعات البيئية الآن).

وحتى وقت قريب، كان الفلاح يزرع ويكد ويشقى، وكان ارتباطه بالأرض نابعا من ارتباطه بوحدة الإنتاج التى يزرعها ويخرج منها لقمة عيشه وكساءه ـ أى أن هذا الارتباط كان ارتباط مصلحة وحياة. لذا كان الفلاح يضع نصب عينيه المحافظة على خصوبة التربة وكان يعمل على تقويتها بترك بقايا وجذور المحاصيل بعد حصادها لتزيد من خصوبة التربة طوال الصيف. فتتحول الجذور والفضلات النباتية من الموسم الزراعى السابق إلى «دبال» يفيد النباتات المزروعة في غذائها مستقبلاً. وكان الفلاحون يتعاونون ذراعًا بذراع وكتفًا بكتف من أجل شق الترع وأداء العمليات الزراعية المختلفة. وبذا وجدت الحياة الاجتماعية التعاونية بين فلاحى مصر منذ القدم.

وقبل مؤتمر إستكهولم ١٩٧٢ تركز الاهتمام ببعض المشكلات البيئية في الأوساط الأكاديمية. فقام عدد من الباحثين في الوزارات وبعض الكليات الجامعية ومعاهد الأبحاث بدراسات تتعلق بالنواحي الإيكولوجية لبعض المناطق الصحراوية وببعض الموارد الطبيعية في مصر و النواحي الصحية، خاصة قضايا تلوث الأغذية وانتشار بعض الأمراض البيئية مثل البلهارسيا. ومنذ أواخر الخمسينيات أنشأ المركز القومي للبحوث وحدات لبحوث تلوث المياه والهواء وطب الصناعات وغيرها من المجالات التي لها صلة مباشرة بقضايا البيئة بمفهومها الحديث. ولقد أوجدت التغطية الصحفية لنتائج البحوث والدراسات وعيًا عامًا بمشكلات التلوث في مصر. كذلك أجريت في ذلك الوقت بعض الدراسات عن الآثار البيئية للمشروعات الكبيرة مثل السد العالى، والمناطق الصناعية، مثل حلوان وشبرا الخيمة.

ومع نمو الحركة البيئية في العالم حدث تطور ملحوظ في الوعى البيثى في مصر. فمنذ السبعينيات حدثت زيادة ملحوظة في تغطية وسائل الإعلام المختلفة لقضايا البيئة. وزاد عدد الجمعيات الأهلية المهتمة بالمشاكل البيئية. وفي تواز مع هذا، حدث تقدم في التعليم البيئي ـ النظامي و الغير نظامي.

التريية البيئية

التربية هى عملية تنمية للاتجاهات وللمفاهيم والمهارات والقدرات عند الأفراد فى اتجاه معين لتحقيق أهداف محددة. وقد كان ولايزال تعريف الفرد بمقومات بيئته الطبيعية والاجتماعية من أهم الأهداف التي سعت وتسعى التربية لتحقيقها، وإن اختلفت الوسائل للوصول إلى ذلك.

ولقد تعددت الآراء في معنى التربية البيئية ومدلولها، وذلك بتعدد مدلول العملية التربوية وأهدافها من جهة، ومدلول البيئة من جهة أخرى. فقد يرى بعض المربين أن دراسة البيئة في حد ذاتها ضمان لتحقيق تربية بيئية، في حين يرى البعض الآخر أن التربية البيئية أشمل من ذلك وأعمق. وليست التربية البيئية مجرد تدريس المعلومات والمعارف عن بعض المشكلات البيئية كالتلوث وتدهور الوسط الحيوى أو استنزاف الموارد، ولكنها تواجه طموحًا أكثر من ذلك يتمثل في جانبين: إيقاظ الوعى الناقد للعوامل الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية الكامنة في جذور المشكلات البيئية، وتنمية القيم الأخلاقية التي تحسن من طبيعة العلاقة بين الإنسان والبيئة من مشكلات.

التربية البيئية إذن هي العملية المنظمة لتكوين القيم والاتجاهات والمهارات اللازمة لفهم العلاقات المعقدة التي تربط الإنسان وحضارته بالبيئة، ولاتخاذ القرارات المناسبة المتصلة بنوعية البيئة، وحل المشكلات القائمة، والعمل على منع ظهور مشكلات بيئية جديدة.

ولقد حدد المؤتمر الدولى للتربية والتعليم البيئى الذى عقد فى تبليس عام ١٩٧٧ أهداف التربية البيئية فى التالى:

- ١ ـ تعزيز الوعى والاهتمام بترابط الجوانب الاقتـصادية والسياسية والإيكولوجية فى المناطق الحضرية والريفية.
- ٢ ـ إتاحة الفرص لكل فرد لاكتساب المعرفة والقيم وروح الالتزام والمهارات الفردية لحماية البيئة وتحسينها.
- ٣ _ خلق أنماط جديدة من السلوك تجاه البيئة لدى الأفراد والجماعات والمجتمع ككل.

والتربية البيئية مدخل مهم لترشيد سلوك الإنسان نحو البيئة ومواردها. ومن ثم لم يعد هذا الأمر ترفًا أو أمرًا شكليا. ولهذا تهتم به الدول المتقدمة والنامية على السواء إدراكا منها أن الدور الحقيقى نحو البيئة لن يتحقق إلا من قبل الإنسان القادر والواعى بخطورة ما تتعرض له بيئته، أى موطنه الذى يعيش فيه وستعيش فيه أجيال كثيرة تالية.

وتنقسم التربية البيشية إلى قسمين: النظامية وغير النظامية. في الأولى أدخل البعد البيئي ضمن مناهج المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية، وبالإضافة إلى ذلك تقدم الجامعات اليوم برامج تركز على المحافظة على الموارد الطبيعية، بعضها متعدد الجوانب يشمل الاقتصاد والسياسة والاجتماع والعلوم البيولوجية والفيزيقية. كما تقدم أيضًا دراسات عليا في مجالات البيئة المختلفة. أما بالنسبة للتربية البيئية غير النظامية، فإن جمهورها المستهدف يكاد يشمل كل قطاعات السكان على اختلاف الأعمار ومستويات المثقافة وغير ذلك من الصفات. كما أن هذا الجمهور المستهدف لا تحدد له أوقات أو أزمنة معينة لتلقى البرامج المتعليمية الموجهة إليه. وتعتبر الإذاعة والتليفزيون والصحف والمجلات وغيرها من البرامج غير النظامية (مثل الندوات، وورش العمل، والمؤتمرات. إلخ) الوسائل الرئيسية للتربية البيئية غير النظامية.

الإعلام والتوعية بقضايا البيئة

الإعلام عن قضايا البيئة ليس جديداً. فمنذ أكثر من مائة عام أنشئت جمعيات أهلية للحفاظ على الحياة البرية. وكان من نشاطاتها إعلام الناس عن فوائد الحياة البرية وضرورة صونها. واتخذت تلك الجسمعيات من الصحافة والمجلات العامة وسائط لنشر رسالتها. وأصدرت بعض منها المجلات العلمية العامة التي أولت البيئة الطبيعية اهتماما خاصا، مثل مجلة الجغرافيا الوطنية التي صدرت في أمريكا. ومنذ منتصف القرن العشرين ومع تزايد نشاط الحركة البيئية خاصة في أمريكا وأوروبا اهتمت وسائل الإعلام الاخرى مثل الإذاعة والتليفزيون اهتمامًا متزايدًا بقضايا البيئة المختلفة.

ويختلف أسلوب معالجة قضايا البيئة في وسائل الإعلام اختلافًا كبيرًا. فبينما تركز بعض المجلات العلمية العامة على طرح قضايا البيئة بصورة دورية بتعمق وأسلوب علمي، تتوقف تغطية وسائل الإعلام العامة لهذه القضايا على الأحداث أو التطورات المؤثرة التي يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين:

- 1 _ الكوارث البيشية (الطبيعية أو الصناعية): فمثلا لقيت حوادث الضباب القاتل الذي حدث في لندن عام ١٩٥٢، أو في نيويورك عيام ١٩٦٣، أو حادث سيفيزو (انفجار مصنع كيماويات في إيطاليا عام ١٩٧٦)، أو غرق ناقلة النفط أموكوكاديس عام ١٩٧٨، أو حادث بوبال في الهند عام ١٩٨٤، أو حادث تشيرنوبيل عام ١٩٨٦، أو حادث ناقلة النفط أكسون فالديز عام ١٩٨٩، تغطية إعلامية واسعة.
- ٢ ـ أحداث سياسية أو علمية مستجدة: على سبيل المثال عقد مؤترات دولية أو إقليمية (مثل مؤتمر إستكه ولم عام ١٩٧٢، و مؤتمر قمة الأرض عام ١٩٩٢، ومؤتمر السكان عام ١٩٩٤ والمرأة عام ١٩٩٥).

وتحكم وسائل الإعلام على القيمة الإخبارية للكارثة أو الحادث من عدد ضحاياه وأضراره المادية. فعادة يتم التركيز على الكوارث النادرة الوقوع، وذلك بالرغم من أن ضحاياها في معظم الأحوال أقل بكثير من الحوادث العادية الكثيرة الوقوع. فمثلا تصبح حوادث السيارات ذات قيمة إخبارية عند وقبوع حادث تتصادم فيه عدة سيارات مرة واحدة، بينما لا تشكل حوادث السيارات الفردية (الكثيرة الوقوع يوميا) أية أخبار مهمة، وذلك بالرغم من أن إجمالي عدد ضحايا الحوادث الفردية أكبر من عدد ضحايا الحوادث القردية من أكبر من عدد ضحايا الحادثة التي تصادمت فيها عدة سيارات.

ويعتمد التليفزيون في عرض الكوارث البيئية على المؤثرات الدرامية (مثل النيران المشتعلة والانفجارات والمحن الإنسانية). كما تعتمد وسائل الإعلام الأخرى على الجوانب المدرامية للأحداث أكثر من الجوانب الموضوعية. ويؤدى هذا الميل إلى الإثارة إلى عدم دقة الأخبار التي تقدمها وسائل الإعلام عن المخاطر البيئية. ففي معظم الأحوال لا توضع المخاطر في منظورها السليم. وهذا من شأنه ترك المجال للتكهنات، والتفسير غير السليم لاسيما في غياب المعلومات الأساسية. ففي أعقاب حادث بوبال في الهند عام ١٩٨٤، كشف تحليل لـ ٩٥٣ خبرًا مطبوعًا ومذاعًا في الولايات المتحدة الأمريكية عن الحادث أن معظم ما ذكر كان عن الحادث نفسه، دون أي تعليق علمي، أو مناقشة للعوامل الاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى نقل هذه التكنولوجيا إلى الهند، وإذا ما كانت هذه التكنولوجيا مناسبة أم لا.

ولا تدل خطورة الكارثة البيئية، بالضرورة، على قيمتها الإخبارية. فهناك عوامل اقتصادية وسياسية تتدخل في عملية التغطية الإعلامية. فوسائل الإعلام تريد أن تعرف أولا أين وقعت الكارثة، ومن هم ضحاياها. فحادثة في دولة غربية تلقى

تغطية إعلامية أطول وأشمل من حادثة تقع في دولة شرقية أو نامية، إلا إذا كانت الحادثة ستؤثر على دول أو مصالح غربية (مثل تشيرنوبيل). من ناحية أخرى تختلف التغطية الإعلامية للحوادث البيئية من المناطق الحضرية إلى المناطق الريفية داخل نفس الدولة. فيتم التركيز والتغطية الأشمل للحوادث التي تقع في المناطق الحضرية.

ويمكن القول إن التغطية الإعلامية المثيرة للأحداث البيئية تؤدى في بعض الأحيان إلى إيجاد رد فعل قسومي أو إقليمي أو دولي تجاه مشكلة ما. فمثلا أدى عرض بعض الأفلام التليف زيونية التي ركزت على الجوانب الدرامية للمجاعبات في إفريقيا نتيجة موجات الجفاف في منتصف الثمانينيات إلى تعبئة الجهود العالمية لإرسال المعونات إلى المناطق المنكوبة، وأدى إلى قيام نشاطبات دولية مختلفة لمساعدة الدول الإفريقية الأكثر تضررًا. ومن ناحية أخرى، أدى هذا إلى وضع مشكلة الجفاف في مقدمة أولويات المشاكل البيئية في إفريقيا، وإلى اهتمام منظمات دولية مختلفة بسبل معالجتها.

وتعتبر قضية المعلومات من أهم القضايا التي تحدد كفاءة التغطية الإعلامية لمشكلات البيئة، وهناك ثلاثة أبعاد رئيسية تتعلق بموضوع المعلومات:

أولا _ توافر المعلومات الحديثة وحرية تداولها: قد لا يشكل هذا البعد عقبة فى الدول المتقدمة الـتى تتوافر فيها المعلومات الجيدة والنظم الحديثة لتخزين واسترجاع هذه المعلومات وحرية تداولها واستخدامها. ولكنه يشكل عقبة رئيسية فى دول نامية كثيرة _ ومنها مصر _ لعدم توافر المعلومات أساسا وللقيسود على تداولها. فالجهات الرسمية والصناعة عادة ما تحيط المعلومات _ حتى العادية منها _ بستار من السرية تستخدمه عندما تشاء، إما تماديا فى البيروقراطية، وإما لتحقيق مكاسب ذاتية.

ثانيا _ ضعف الروابط بين الإعلام وأهل العلم: ولقد عملت دول غربية كشيرة مؤخرا على تقوية الصلات بين وسائل الإعلام والعلماء في المجالات المختلفة. فقامت بعض دور الصحف ومحطات التليفزيون بالاتفاق مع بعض المعاهد العلمية لتكون بمثابة بيوت خبرة تلجأ لها عندما يستدعى الأمر ذلك. كما قام البعض الآخر بإعداد قوائم لنخبة من العلماء تم الاتفاق معهم على تقديم المشورة العلمية في القضايا المختلفة، خاصة في حالات الطوارئ التي تقتضى تغطية إعلامية سريعة.

ثالثا _ نشر الحقائق: يتوقف مدى ثقة الجماهير في وسائط الإعلام وبالتالى في الأجهزة الرسمية والشركات الصناعية على دقة المعلومات التي تنشر عن القضايا البيئية المختلفة. ولقد أوضحت دراسات مختلفة أن الإعلام يتأثر بدرجات متفاوتة _ بطريق مباشر أو غير مباشر _ بما تحده به الجهات الرسمية والشركات من معلومات.

وهناك أمثلة كثيرة لاستخدام الشركات لنفوذها وأموالها للضغط على وسائل الإعلام لنشر أو عدم نشر بعض المعلومات عن عملياتها أو منتجاتها. وفى الدول التى تسيطر فيها الحكومة على أجهزة الإعلام المختلفة، تتحول العملية الإعلامية إلى مجرد نقل للأخبار الرسمية، مع هامش محدود للتحليل والنقد. وغالبًا ما يؤدى هذا إلى اضمحلال ثقة الجماهير فى الإعلام ودوره فى المساعدة على حل القضايا المختلفة، وبالتالى إلى تفشى اللامبالاة بين الأفراد والجماعات. ومن شأن هذا إجهاض أية جهود جادة للمشاركة الشعبية فى حل القضايا البيئية المختلفة.

وبالرغم من هذه المشكلات، أدت وسائل الإعلام دورا كبيراً في تقوية اهتمام الجماهير بقضايا البيئة. ومن ناحية أخرى أدى اهتمام الجماهير بقضايا البيئة دوراً مهما في تحريك الإعلام للاهتمام بهذه القضايا. ويحسب للإعلام دوره في الضغط على الحكومات في بعض الدول للتعامل مع بعض المشكلات البيئية. ولكن الدراسات أوضحت أن معظم ما حدث ويحدث في هذا الصدد هو أساسا عملية دفاعية أكثر منها تصحيحية، معطية الانطباع الخاطئ أن هناك خطوات اتخذت أو تتخذ لحل المشكلات البيئية، دون تحقيق تقدم ملموس في هذا الصدد.

يختلف الاهتمام تقضايا النيشة من دولة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر داخل الفس الدولة ولقد أوضحت المسوحات التي قامت بها موسسات حالوت ولريس هاريس في 3 دولة ويادة الاهتمام العام بالقضايا النشية التالية في الدول التقدمة نوصة المياه، توصة الهواء، تلوث التربة، الصوف الصوف العيد والقيامة التكاني الشكاني، والضرضاء الديد التكاني الشكاني، والضرضاء الله المنافة التكاني الشكاني، والضرضاء التربية المنافة التكاني الشكاني، والضرضاء التنافة التكاني الشكاني، والضرضاء التنافية ال

واوضحت المسوحات وحود تشابه كيس بن اهتمامات شعوب الدول النامية والمتقدمة بقضايا النبيعة العالمية خراصة تلوث الانهار والبحسرات وللوث الهواء ولدهود التربة والتصحر وفقيدان النبوع النبولوجي وإذالة العيابات، بينها برداد الاهتمام في الدول المتقدمة عنه في الدول الناهية بالنسبة لقضايا التغيرات المناخية المحميلة وتأكل طبقة الاوزون والامطان الحيضية

أمّا عن أسباب المشكلات البيئية فترى شعوب الدول النامية والمقددية بدرجة متساوية تقريبًا أنها نيسجة الزيادة السكائية والسياسات الحكومية غيس المناسنة ولقص التعليم وعدم الهندام قطاعات الاعمال والصياعة بالبيئة والإسراف في استهلاك الموارد الطبيعية:

المصدر:

El-Hinnawi, E. (1999): Perceptions and Attitudes Towards Environment.
In "Bryironment 2000 and Beyond". International Centre for Environment and Development, Cairo.

وفى مسح للموضوعات البيئية التي عالجتها الصحف اليومية في مصر، وجد أنها قد تركزت حول عشرة موضوعات رئيسية مرتبة كالمتالى حسب أهميتها (٤٠):

١ _ تلوث الأطعمة .

٢ _ تلوث مياه الشرب.

٣ ـ الضوضاء.

٤ _ تلوث الهواء.

٥ ـ تلوث نهر النيل.

٦ ـ النفايات والمخلفات.

٧ ـ تلوث البيئة البحرية.

٨ _ تلوث المحاصيل الأرضية.

٩ _ الاعتداء على الأرض الزراعية .

١٠ ـ الإضرار بالثروة الحيوانية.

ووجد أن موقع نشر هذه الموضوعات هو في المغالب في الصفحات الداخلية. وأن معالجة هذه القضايا يغلب عليه الطابع الإخبارى وعرض وجهات نظر المستولين أو الآراء التي تتمشى مع وجهات المنظر الرسمية. أما الآراء الأخرى «المعارضة» فينشر معظمها في الصحف الحزبية.

وبصورة عامة وجد أن حجم التغطية الصحفية لقضايا البيئة هو نحو ٤, ٠٪ من إجمالي عدد صفحات كل من الأهرام والأخبار والجمهورية(٤١)، ونحو ٣٥, ٠٪ من إجمالي صفحات الصحف الحزبية (اليومية والأسبوعية). وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بالرغم من أن الموضوعات المذكورة عاليه تعكس اهتمامات الناس بصورة عامة، فإن هذه الاهتمامات تختلف من مكان إلى آخر. فمشلا يهتم سكان الريف بمشاكل المياه (وفرتها وتلوثها) والصرف الصحى أكثر من اهتمامهم بالضوضاء أو تلوث الهواء. كذلك يوجد تباين في اهتمامات الناس بمشاكل البيئة بين المناطق العشوائية والمناطق العند.

وهناك عدة برامج إذاعية وتليف زيونية أسبوعية تتناول قضايا البـيئة المختلفة(٤٢). ولكن هناك تباين كبير في المواد التي تقدمها من حيث الدقة العلمية وأسلوب توصيل المعلومة البيئية للمستمعين والمشاهدين. ولقد اتضح من تقييم للمواد التي تقدم في عدد من هذه البرامج أن ٧٠٪ من الموضوعات تعرض بأسلوب سطحي وغير دقيق في كثير من الأحيان. وفي أحيان أخرى تقدم المعلومات البيئية بأسلوب معقد مما يجعل فهمها غير ميسور على العامة. وبصورة عامة، لا تتعدى نسبة إذاعة برامج متعلقة بالبيئة أكثر من ٣٠٠٪ من إجمالي ساعات الإرسال من الإذاعات المختلفة، كما لا تتعدى ٥٠٠٪ من إجمالي ساعات الإرسال التليفزيوني في جميع القنوات (٤١).

ولقد أوضحت بعض الدراسات وجود بعض التناقض بين ما تنشره وسائل الإعلام من إعلانات تجارية وبين رسالة هذه الوسائل في التوعية البيئية وحماية صحة الإنسان. فهناك مثلا إعلانات تليفزيونية أدت إلى إحداث تغيرات سلبية في سلوكيات المشاهدين خاصة الأطفال والسباب (على سبيل المثال الإعلانات عن الوجبات السريعة التي أدت إلى تغيير عادات الأكل لدى الأطفال والكبار بما قد يترتب على ذلك من أضرار صحية، والإعلانات التي شجعت على انتشار التدخين لدى المراهقين والمراهقات...إلخ).

- وبالرغم من زيادة الوعى العام بمشكلات البيئة، فإننا نجد التالى:
- ١ ـ التفاوت الكبير في الوعى البيئي لدى الطبقات ذات الدخل المرتفع والمتوسط،
 ولدى الطبقات ذات الدخل المنخفض (الفقراء).
- ٢ هناك فروق واضحة في اهتمامات الطبقات ذات الدخل المرتفع والمتوسط، واهتمامات الفقراء. فالطبقات الأولى تهتم بمشكلات تاوث الهواء والضوضاء والمخلفات الصلبة واختناقات المرور. إلخ، بينما تهتم الطبقات منخفضة الدخل بقضايا توفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحى وتلوث المياه . . إلخ (أى القضايا التي تؤثر في حياتهم اليومية).
 - ٣ ـ لا توجد علاقة بين وعي المسئولين بقضايا البيئة وسلمهم الوظيفي.
- ٤ في جميع الأحوال، لا يعنى الاهتمام بقضايا البيئة الاستعداد للعمل على حل مشكلاتها.
- لم يقابل زيادة الوعى بالمشكلات البيئية حدوث تغيرات إيجابية في سلوكيات الأفراد، أو اهتمامهم بالمشاركة في حل هذه المشاكل. ويرجع هذا إلى حالة اللامبالاة التي تفشت بصورة واضحة في شرائح المجتمع المختلفة، وأصبح المشعور السائد هو ترك المشاكل البيئية للأجهزة الحكومية للتصرف فيها.

- آ ـ هناك اتجاه واضح بعدم تعاون الجمهور. فمثلا قد تبذل البلديات في بعض المدن جهودًا كبيرة في تنظيف السوارع والحدائق وزرع الأشجار. إلخ، ولكن قد لا يهتم الناس بإلقاء الفضلات في الأماكن المخصصة لها، أو قد يقتلع البعض الأشجار دون أي سبب مهم. كذلك قد يكون الناس على دراية بمخاطر التدخين بالنسبة للغير، ومع ذلك فإنهم يدخنون في الأماكن المحظور التدخين فيها. وقد يكون الناس على دراية بما تسببه الضوضاء من إزعاج للآخرين، ولكنهم يطلقون يكون الناس على دراية بما تسببه الضوضاء من إزعاج للآخرين، ولكنهم يطلقون أبواق سياراتهم، أو يرفعون صوت أجهزة الراديو والكاسيت والتليفزيون دون مبالاة ومراعاة لمشاعر وحقوق الآخرين.
- ٧ المصلحة الذاتية هي التي تحدد الموقف تجاه القضايا البيئية. ويتجلى هذا في مواقف الشركات الاستثمارية التي غالبا ما تحجم عن الإنفاق لحل مشكلاتها البيئية (مما أدى، على سبيل المثال، إلى تدهور الأوضاع البيئية في المدن الصناعية الجديدة وفي بعض المناطق السياحية). كما أن هناك شركات استثمارية لا تعير البيئة أي اهتمام عند إقامة مشروعاتها (على سبيل المثال بعض الشركات السياحية التي قامت بتدمير بعض النظم البيئية على ساحل البحر الأحمر لإنشاء منتجعات سياحية. . إلخ).
 - ٨ ـ الفرق الكبير بين التوجهات الرسمية لحل المشكلات البيئية وبين واقع التنفيذ.
- ٩ ـ اتباع أسلوب المهادنة في التعامل مع المشاكل البيئية والاستعانة عليها بالمسكنات،
 مما يؤدى إلى ترك المشكلات بغير حلول حقيقية ويسهم في مضاعفتها وزيادة تعقيدها.
- ١٠ عدم الجديدة في إدماج الاعتبارات البيئية في التخطيط للمشروعات الإنمائية المختلفة، للتعامل مبكرًا مع المشكلات البيئية المتوقعة قبل حدوثها واستفحال أمرها. أي عدم اتباع فلسفة «الوقاية خير من العلاج». فلا شك في أن التعامل مع المشاكل البيئية في وقت مبكر أكفأ وأرخص من التعامل معها بعد تضخمها.




اثباب اثثانی سینارپوهسات المستقبل

الفصل الأول مقسدمة

السيناريو هو وصف لوضع مستقبلى ممكن أو محتمل أو مرغوب فيه، مع توضيح لملامح المسار أو المسارات التي يمكن أن تؤدى إلى هذا الوضع المستقبلى، وذلك انطلاقا من وضع معين (الوضع الحالى مشلا). والسيناريوهات ليست تنبؤات (Predictions) أو تكهنات (Forecasts) إنما هي توصيف لما سيشول إليه الحال. وبالرغم من أن جميع السيناريوهات تعتبر وصفية ولها درجات متفاوتة من عدم التيقن (طبقا للافتراضات المستخدمة في كل سيناريو) فإنها تعطى «مؤشرات» تساعد في عمليات اتخاذ القرار بشأن الأوضاع المستقبلية (سواء كانت هذه الأوضاع اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية. إلخ).

وتعتبرسيناريوهات استطلاع حالة البيئة من أعقد السيناريوهات، لأن حالة البيئة تؤثر فيها، وتتأثر بالتطورات التي تحدث في قطاعات الإنتاج والخدمات، والتي بدورها تتوقف على استخدام الموارد الطبيعية المختلفة من طاقة ومياه وأرض وخامات معدنية. . إلخ. ويحدد كل هذا النمو السكاني وتوزيع السكان وأنماط الاستهلاك. ويقدم شكل رقم (۱) رسمًا انسيابيا مبسطًا لأهم العلاقات الرئيسية والتشابكات بين الأنشطة البشرية (التنمية الاقتصادية) والموارد والبيئة. وهذا الرسم كان أساسا لعدد من الدراسات التي تحت خلال الفترة من ١٩٧٠ الى ١٩٨٥ لاستطلاع مستقبل الموارد الطبيعية والبيئية في العالم. وكانت نقطة الانطلاق في هذه الدراسات هي النمو السكاني في الدول والمناطق المختلفة (على سبيل المثال دراسات «حدود النمو» الأوساط العلمية لأنه وجد أنها ترتكز على بعض الافتراضات الخاطئة وتهمل بعض الأوساط العلمية لأنه وجد أنها ترتكز على بعض الافتراضات الخاطئة وتهمل بعض المتغيرات المهمة (انظر على سبيل المثال مرجع (٥٥)).

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل رقم (١): العلاقات الرئيسية بين الأنشطة الاقتصادية والسكان والموارد والبيئة


ومع تعمق الفهم للمتغيرات المختلفة في معادلة السكان _ الموارد _ البيئة والتنمية ، أضيفت أبعاد أخرى أدت إلى تعقيدات أكبر في سيناريوهات حالة البيئة. ويوضح شكل رقم (٢) العلاقات المتشابكة بين عدد رئيسي من المتغيرات التي تحدد حالة البيئة ، والتي أضيفت إليها العوامل الخارجية التي أصبحت تؤثر بدرجة كبيرة في مسار عمليات التنمية ، خاصة في ضوء التطورات الدولية الحديثة ، وما يعرف باسم «العولمة».

ومع كشرة المتغيرات وزيادة عدم التيقن تعتبر نستائج جميع السيناريوهات التي نشرت حتى الآن نتائج إرشادية أو استطلاعية تزداد عدم دفتها مع زيادة الفترة الزمنية للاستطلاع. وينطبق هذا أيضا على السيناريوهات المتخصصة التي تعالج موضوعات محددة مثل سيناريوهات الموارد الطبيعية (الطاقة، المياه، المعادن. إلخ) أو التي تعالج مشكلات بيئية معينة (مثل احتمالات تآكل طبقة الأوزون أو التغيرات المناخية المحتملة).

فعلى سبيل المثال استخدمت عدة نماذج نظرية لتقدير التآكل المحتمل في طبقة الأوزون، وأوضحت النماذج التي استخدمت في الفترة ١٩٨٠-١٩٨٠ أن طبسقة الأوزون ستتآكل بنسبة ١٥٪ إذا استمسر انبعاث غازات الكلوروفلوروكربون بنفس معدلات انبعاثها في تلك الفترة. ولكن النماذج المعدلة التي استخدمت في الفترة معدلات انبعاثها أوضحت أن نسبة التآكل ستكون في حدود ٣٪ خلال ٧٠ سنة. ويرى البعض أن هذه النماذج لا تعطى الصورة الحقيقية لأنها لم تأخذ في الحسبان الغازات المنبعثة (خاصة أكاسيد النيتروجين) من الطائرات النفاثة (المدنية والعسكرية) ومن الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية والتي زاد معدل إطلاقها ؛ وبذا فإن نسبة تآكل طبقة الأورون ستكون أكسر من ٣٪. من جهة أخرى يرى البعض أن هذه النسبة مبالغ فيها لأن النماذج التي استخدمت أهملت التفاعلات الطبيعية التي تحدث في الغلاف الجوى. فمثلا تشير بعض الدراسات إلى أن ثقب الأوزون فوق القطب في الخيوبي يظهر في فصل الربيع هناك ويختفي في في صل الصيف بفعل العوامل الجوية فوق المنطقة ، وبذلك فهناك شك في أن انبعاثات غازات الكلوروفلوروكربون هي السبب في حدوث هذا الثقب.

وتعطى نماذج التغيرات المناخية المحتملة مثالاً ثانيًا لعدم التقين في استطلاع المستقبل. فالنماذج التي استخدمت في أواخر ١٩٦٠ أوضحت أن درجة حرارة الجو سوف ترتفع ١٠٥٠ إلى ٣ درجة مئوية إذا تضاعف تركيز ثاني أكسيد الكربون في

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل رقم (٢): العلاقات الرئيسية في نماذج السكان - البيئة - التنمية بعد إضافة العوامل الخارجية المؤثرة

الهواء عن تركيزه في فترة ما قبل الصناعة. ولكن الهيئة الاستشارية الحكومية للتغيرات المناخية (IPCC) أوضحت في ١٩٩٠ بعد دراسات استمرت سنوات أن الارتفاع في درجات الحرارة سيكون في حدود ٢-٥ درجات خلال مائة عام، وفي عام ١٩٩٦ عدلت هذه الأرقام إلى ١,٥ ـ ٤ درجات مئوية (٢٠،٤٦) وحديثا إلى ٢ درجات مئوية.

ومن أهم أمثلة عدم التيقن في استطلاعات المستقبل سيناريوهات الطاقة. فمنذ ما سمى بأزمة الطاقة في بداية ١٩٧٠ نشرت العشرات من الدراسات عن مستقبل الطلب والعرض من الطاقة التجارية ثبت خطؤها جميعها، خاصة السيناريوهات التي خلصت إلى أن الطلب على البترول سينيد عن العرض بحلول ١٩٨٥ أو ٢٠٠٠ (لم يحدث في كلتا الحالتين). كما ثبت خطأ السيناريوهات التي توقعت أن الطاقة النووية ستنتشر وسوف تشكل ٣٠-٤٪ من إنتاج الكهرباء في العالم بحلول عام النووية ستنتشر وسوف تشكل ٣٠-٤٪ من إنتاج الكهرباء في العالم بحلول عام راجع وقم ٢٠٠٠ أو أن طاقة الاندماج ستصبح تجارية مع مطلع عام ٢٠٠٠ (انظر مراجع رقم ٢٠٠٠ ، أو أن طاقة الاندماج ستصبح تجارية مع مطلع عام ٢٠٠٠ (انظر مراجع

أما بالنسبة للدراسة الحالية فسوف يتم وصف حالة البيئة فى مـصر عام ٢٠٢٠ طبقًا للسيناريوهات الخـمسة التى أوصى بها منتدى العالم الثالث فى مـشروع «مصر ٢٠٢٠» (انظر إبراهيم العيسوى وآخرين ـ مرجع رقم ٤٨) وهى:

- ١ ـ السيناريو المرجعي.
- ٢ ـ السيناريو الابتكارى، الذي يتضمن ثلاثة سيناريوهات :
 - ـ سيناريو الدولة الإسلامية.
 - ـ سيناريو الرأسمالية الجديدة.
 - ـ سيناريو الاشتراكية الجديدة.
 - ٣ _ السيناريو الشعبي

ولقد تم تحديد عشرة محاور رئيسية أو عناصر حاكمة لوصف الشروط الابتدائية لكل سيناريو. وهذه المحاور هي:

- ١ ـ القوى الاجتماعية الغالبة والنخبة السياسية المرتبطة بها.
 - ٢ ـ نهج اتخاذ القرارات وإدارة شئون المجتمع والدولة.
 - ٣ ـ البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

- ٤ ـ البشر، والتعليم والتعلم والتدريب كعوامل حاكمة لتنميتهم.
 - ٥ ـ أداء وتنافسية الاقتصاد، والسياسات الاقتصادية.
- ٦ _ التعامل مع قضايا ذات أهمية خاصة (مثل الفقر والبطالة. . إلخ).
 - ٧ ـ الموارد الطبيعية والبيئة.
 - ٨ ـ نسق القيم المتواثم مع توجهات النخبة الحاكمة.
 - ٩ العلاقات الإقليمية والدولية.
 - ١٠ ـ موقف الجماهير (المشاركة الشعبية) وتناقضات السيناريو.

وبطبيعة الحال فإن هذه المحاور العشرة ليست مستقلة عن بعضها البعض، بل إنه توجد تشابكات وتداخلات مهمة فيما بينها. وهذه التشابكات لها أهمية خاصة في رسم سيناريوهات حالة البيئة في مصر في ٢٠٢٠.

وفيـما يلى وصف موجز لمعـالم السيناريوهات الخمـسة (انظر إبراهيم العيـسوى وآخرين ـ مرجع ٤٨ لمزيد من التفاصيل عن هذه السيناريوهات):

- ا ـ السيناريو المرجعي (Business-as-usual) أو السيناريو الامتدادي، وذلك لاعتباره أن الوضع القائم مستمر في خطوطه العامة. ومن ثم فيليس مطروحا في هذا السيناريو ظهور تغيرات «جوهرية» في السياسات الاقتصادية أو الاجتماعية أو في العلاقات الإقليمية والدولية. ومن أهم سمات هذا السيناريو: التسليم بالعولة (مع عدم الاستعداد الكافي للتعامل معها والاستفادة منها)، الاعتماد على القطاع الخاص وعلى آليات السوق في التنمية، حصر دور الدولة في تنمية البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، تبعية تكنولوجية وهشاشة اقتصادية، تشتت للموارد على جبهة واسعة دون بروز أولويات واضحة في تخصيصها، تقدم في بعض النواحي ولكن بكلفة عالية وإهدار للموارد، وتهدهور في كفاءة إدارة شئون المجتمع.
- Y سيناريو الدولة الإسلامية، وهو سيناريو افتراضى بديل للسيناريو المرجعى (يفضل المؤلف استخدام تعبير سيناريو «بديل» بدلا من سيناريو «ابتكارى»)، منطلقه الأساسى هو الشعار الشهير «الإسلام هو الحل». ومن أهم معالم هذا السيناريو: استناد الحكم إلى مرجعية دينية رفض التعددية السياسية المركزية الشديدة رفض الحضارة الغربية الدعوة إلى مراعاة العدالة الاجتماعية من

خلال إعطاء أولوية خاصة لإشباع الحاجات الأساسية _ رفض الاندماج في العولمة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بها _ الاعتدال في الاستهلاك _ سيطرة الدولة الكاملة على التعليم دون قدرة حقيقية على تطويره جذريا _ دعم اتجاهات محددة في البحث العلمي والتكنولوجيا دون غيرها _ مسار التنمية يتوقف على مبادرات القطاع الخاص وآليات السوق مع درجة من التوجيه والتدخل الحكومي لمراعاة العدالة وإشباع الحاجات الأساسية.

٣ ـ سيناريو الرأسمالية الجديدة، وهو بديل ثاني للسيناريو السابق يعتمد على التفاعل الإيجابي مع العولمة وخوض غمار المنافسة واقتحام الأسواق الخارجية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. ويسعى هذا السيناريو إلى رفع القدرة التنافسية للبلاد ببسرامج سريعة لمحو الأمية ومحاربة الأمسراض المتوطنة وتغيير جذرى في منظومة التعليم والبناء المؤسسي للعلم والتكنولوجيا. كما يسعى هذا السيناريو إلى ترسيخ الديمقسراطية وإطلاق الحسريات باعتبارهما من القوى الدافعة للنهضة والتنمية. وتحتفظ الدولة بسلطة التوجيه والتحكم في الأسواق والسيطرة على المجالات ذات الأهمية الإستراتيجية، وتنحاز الدولة للطبقة الرأسمالية المنتجة في رسم السياسات، ولا تثقل عليها بأعباء ضريبية تحد من نشاطها ونموها. ومن العلامات المميزة لهذا السيناريو اتباع منهج جديد في إدارة شئون المجتمع والدولة يزداد فيه المكون العلمي في أسلوب اتخاذ القرارات وتعطى فيه اعتبارات الجدية والكفاءة والانضباط أولوية كبرى. ويرى المؤلف أن هذا السيناريو مشابه شكلاً ومضمونًا لاتجاهات الرأسمالية الجديدة في العالم (انظر: فؤاد مرسى «الرأسمالية تجدد نفسها» ـ عالم المعرفة ـ كتاب رقم ١٤٧ ـ الكويت ١٩٩٠ و إسماعيل صبرى عبد الله «توصيف الأوضاع العالمية المعاصرة» _ منتدى العالم الثالث _ (الورقمة (٣) من أوراق مصر ٢٠٢٠ _ القاهرة ١٩٩٩، لمزيد من التفاصيل عن مفاهيم وتطورات الرأسمالية).

٤ ـ سيناريو الاشتراكية الجديدة، وهو البديل الثالث للسيناريوهات السابقة ويعتمد على التغيرات التى حدثت فى مفهوم الاشتراكية خاصة خلال العقدين الأخيرين. ويرى هذا السيناريو أن إعادة توزيع الثروة والدخل وتذويب الفوارق بين الطبقات ضرورى لتعظيم الفائض الاقتصادى المطلوب للتنمية من جهة، ولتحقيق العدل الاجتماعى اللازم لحشد طاقات الجماهير الشعبية من أجل التنمية من جهة أخرى. ومن أهم معالم هذا السيناريو رفض الانصياع للعولمة ورفض من جهة أخرى.

فتح الأسواق بما يؤثر سلبيا على أحوال الفقراء والفئات الوسطى فى المجتمع. ولكن هذا السيناريو يدرك أن الانعزال عن الأسواق العالمية غير ممكن، ولذلك فإنه يسمعى إلى تكوين قدرة تصديرية فى عدد من المنتجات استناداً إلى مزايا تنافسية تبنى بالبحث والتطوير التكنولوجى. كما يسعى إلى التعامل مع الخارج على أسس انتقائية، ولذلك فمن الوارد فى هذا السيناريو الانسحاب من منظمة التجارة العالمية واتفاقيات دولية أخرى. وتركز التنمية على تعميق التصنيع وتقوم الدولة بالدور الرئيسى فى التنمية، وتمارس هذا الدور من خيلال المزج بين التخطيط واليات السوق، مع الاحتفاظ للتخطيط بالدور المحورى.

- سيناريو التآزر الاجتماعي، أو السيناريو الشعبي، وهو البديل الأخير للسيناريوهات السابقة. ويدور حول فكرة تحالف السواد الأعظم للأمة حول حل وسط على مستوى الأهداف والوسائل. ونقطة الانطلاق هي إقامة تحالف طبقى واسع قد لا يستبعد سوى الشرائح العليا من الرأسمالية بوجه عام والشرائح الطفيلية بوجه خاص. ويسعى هذا التحالف إلى إصلاح الأوضاع، لا تغييرها بشكل جذرى. وتحتفظ الدولة بدور كبير في التراكم الرأسمالي الجديد، وفي تحسين أداء منظومة التعليم ومنظومة العلم والتكنولوجيا. ويتصدر هدف إشباع الحاجات الأساسية جدول أعمال التنمية، كما تحظى مكافحة الفقر بأولوية خاصة في مجال العمل الاجتماعي.

وبالرغم من الإسهاب في وصف أشكال السيناريو المرجعي والسيناريوهات الأربعة البديلة، لم يحدد مشروع مصر ٢٠٢ معدلات كمية للمؤشرات والمتغيرات المختلفة لكل سيناريو (فمثلا لم تحدد أو تفترض معدلات النمو السنوى للناتج المحلى الإجمالي وتكوينه، كما لم تفترض معدلات النمو السكاني، إلى غير ذلك من مؤشرات أخرى). ونظرًا لأن هذه المؤشرات الكمية تشكل الأساس في تقدير كميات وأنواع الموارد الطبيعية اللازمة للتنمية، وكذلك تقدير أحجام وأنواع الملوثات والأثار البيئية في كل سيناريو حتى ٢٠٢٠، فلقد وجد من الضروري افتراض هذه المؤشرات الكمية في الدراسة الحالية، وتم التركيز على المؤشرات التالية:

١ _ معدلات النمو السكاني.

٢ ـ توزيع السكان (حضر وريف).

٣ - الكثافة السكانية.

- ٤ _ معدلات النمو في الناتج المحلى الإجمالي.
- ٥ _ مكونات الناتج المحلى الإجمالي (رراعة _ صناعة _ خدمات).

وفى ضوء ذلك تم تقدير معدلات استخدام الموارد الطبيعية (مياه ـ أراض ـ طاقة . . إلخ)، وأحمال التلوث المتوقعة فى عام ٢٠٢٠ لكل سيناريو، ووصف حالة البيئة طبقاً للمتغيرات الإضافية التالية:

- ١ ـ السياسات المتوقع اتباعها للتحكم في التلوث.
- ٢ ـ الإجراءات المتوقع القيام بها لإعادة تأهيل النظم البيئية التي تدهورت.
 - ٣ ـ التغيرات المتوقعة في أنماط الاستهلاك.
 - ٤ ـ التكنولوجيات المتوقع استخدامها في القطاعات المختلفة
 - ٥ ـ الاتجاهات المتوقعة للاقتصاد القومي.
- ٦ ـ حجم الاستثمارات العامة والخاصة المتوقعة في مجالات حماية البيئة.

الفصل الثاني السيناريو المرجعي

هذا السيناريو هو استداد للخطوط العامة للوضع القائم (Business-as-usual)، أى أن الأمور ستسير طبقا لمسارها التماريخي الحديث بدون تغييرات كبيرة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ومن أهم معالم هذا السيناريو:

- ١ ـ زيادة معدلات الخصخصة والاعتماد بدرجة كبيرة على القطاع الخاص وآليات السوق لتحقيق معدلات النمو الاقتصادى.
- ٢ ـ تركيز الدولة على تنمية البنية التحتية والخدمات الاجتماعية بقدر محدود من الاستثمارات (لترشيد الإنفاق والحفاظ على الموازنة العامة).
- ٣ ــ استمرار تركيز استثمارات القطاع الخاص في المبانى الاستثمارية (القرى السياحية والسكنية) والخدمات التي تتطلبها الشرائح المرتفعة الدخل، وفي تصنيع المنتجات الاستهلاكية خاصة للسوق المحلى.
- ٤ ـ الاعتماد المترايد على نقل التكنولوجيا، وبالتالى زيادة التبعية التكنولوجية والعلمية.
- ٥ ـ اتجاه المجتمع نحو المزيد من الاستهلاك، وما يترتب على ذلك من زيادة معدلات استخدام الموارد الطبيعية المحدودة وزيادة توليد النفايات، أى ليصبح المجتمع تدريجيا ما يسمى بمجتمع . (throw-away society)

وفيما يلى التغيرات الأساسية المتوقعة التي سيكون لها آثار رئيسية على حالة البيئة بحلول عام ٢٠٢٠:

أولا النمو السكاني وتوزيع السكان

يفترض في هذا السيناريو أن النمو السكاني سوف يتبع المتغير الأوسط (أو المعتدل) الذي تتبناه الأمم المتحدة (median variant)، أي سيكون متوسط معدل النمو


السنوى للسكان حتى عــام ٢٠٢٠ نحو ١,٥٥٪ وبذلك سيصل عــدد سكان مصر في ٢٠٢٠ إلى حوالي ٨٩ مليون (شكل رقم ٣).

وفى حالة عدم زيادة المساحة المأهولة بالسكان (حاليا حوالى ٢٥٠٠٠ كيلومتر مربع) سوف ترتفع الكثافة السكانية إلى حوالى ١٣٦٩ شخصًا/كيلومتر المربع من المساحة المأهولة، مقارنة بنحو ٩٥٠ شخصًا/كيلومتر المربع في الوقت الحالى. وللحفاظ على الكثافة السكانية الحالية ينبغى زيادة المساحة المأهولة في مصر بنسبة 23٪ تقريبا لتصل إلى نحو ٩٣,٦٦٨ كيلومتر مربع بحلول عام ٢٠٢٠. وبمعنى آخر ينبغى زيادة المساحة المأهولة في مصر من ٩٥,٠٪ من إجمالى مساحة اليابسة إلى ما يقرب من ٩٤. ٪.


ومن المتوقع زيادة نسبة السكان الذين سيعيشون في المناطق الحضرية إلى ١٣٪ في ٢٠٢٠ مقارنة بنحو ٤٥٪ في ١٩٩٥ (شكل رقم ٤). وستنتج معظم هذه الزيادة من ارتفاع معدلات التحضر في المحافظات، التي ستتحول فيها قرى رئيسية كثيرة إلى مراكز (مدن صغيرة) مع ارتفاع معدلات الهجرة إليها من المناطق الريفية المجاورة، بالإضافة إلى الزيادة الطبيعية للسكان في المناطق الحضرية ذاتها. وسوف تظل القاهرة الكبرى أكبر تجمع حضرى في مصر وسيصل عدد سكانها إلى نحو ١٦ مليون في ٢٠٢٠ (أى نحو ٢٥٪ من إجمالي سكان المناطق الحضرية في مصر)، وستليها الإسكندرية بتعداد يصل إلى نحو ٥ مليون نسمة (حوالي ٨٪ من إجمالي سكان المناطق الحضرية في مصر).

ثانيا. الحالة الاقتصادية

يفترض في السيناريو المرجعي أن متوسط معدل النمو السنوى للناتج القومي الإجمالي سيكون نحو ٨,٥٪ حتى عام ٢٠٢٠، وبذلك يقدر الناتج القومي الإجمالي في عام ٢٠٢٠ بنحو ٢٧٤ مليار دولار (بالسعر الجاري) ويكون نصيب الفرد منه (أي دخل الفرد) نحو ٢٠٧٩ دولارا سنويا. وهذا معناه أن مصر ستظل من الدول متوسطة الدخل (شريحة منخفضة) طبقا لتقسيم البنك الدولي. أما بالنسبة للناتج المحلى الإجمالي فسوف يزداد بنفس المعدل تقريبًا ليصل الي نحو ٢٨٨ مليار دولار في ٢٠٢٠. وستكون مكوناته هي تقريبا نفس المكونات الحالية: ٢٠٪ راعة، ٣٠٪ صناعة و ٥٠٪ خدمات.



شكل رقم (٣): النمو السكاني في السيناريو المرجعي



شكل رقم (٤) : نسبة سكان الحضر في السيناريو المرجعي،

ثالثا ـ الموارد الطبيعية واستخدامها

(١) الأرض

كانت مساحة الأرض المنزرعة عام ١٩٩٥ نحو ٧,٥ مليون فدان. وتتوقف زيادة هذه المساحة على وجود أراض صالحة للاستزراع، وموقع هذه الأراضى، وتكاليف استصلاحها وتوفير المياه اللازمة للرى. والحق وتتوقع خطة استغلال الأراضى التي أعدت عام ١٩٨٦ استصلاح واستزراع نحو ٣ مليون فدان باستخدام مياه النيل، ونحو ٧٠٠ ألف فدان باستخدام المياه الجوفية بين ١٩٩٧ و ٢٠١٧ (٤٩). ويوضح جدول رقم (١٣) توزيع الأراضى المتوقع استصلاحها طبقا لآخر التقديرات.

جدول رقم (۱۳) مساحات الأرض المتوقع استصلاحها حتى عام ٢٠١٧

النط1ة	المساحة المتوقع استعملاحها (بالقدان)
وادى النيل الساحل الشمالى الغربى سواحل بحيرة ناصر والعسحراء الشرقية شمال سيناء (ترعة السلام / الشيخ جابر) الواحات فى الصحراء الغربية والعوينات منطقة توشكى	1, T
الجملة	٣,٤٤٠,٠٠٠

المصدر: المرجعان (٤٩) و(٥٠).

ولكن بدراسة التطور التاريخي لمعدلات استصلاح الأراضي خلال الفترة من ١٩٥٢ إلى ١٩٩٧ وجد أن المعدل السنوى للاستصلاح كان في حدود ٢٠٢٠ وبافتراض توفر الموارد المالية وزيادة معدلات الاستصلاح، فإن المعدل الواقعي للاستصلاح سيكون في حدود ١٠٠٠، فدان سنويا حتى عام ٢٠٢٠ وبمعني للاستصلاح سيكون في حدود ٢٠٢٠ فدان ستصلاحها حتى عام ٢٠٢٠ ستكون في حدود ٣,٣ مليون فدان. أي أن أقصى تقدير لإجمالي المساحة المنزرعة في مصر سيكون نحو ٢,٣ مليون فدان، بعد استقطاع مساحات الأراضي الزراعية التي سيكون نحو ٢,٩ مليون فدان، بعد استقطاع مساحات الأراضي الزراعية التي الاستغناء عنها أو الحد من التوسع العمراني والبنية الأساسية والتي لا يمكن الاستغناء عنها أو الحد من التوسع فيها. وبذلك فإن نصيب الفرد من الأرض الزراعية في مصر سوف ينخفض من ١٢، فدان عام ١٩٩٥ إلى نحو ١٠٠٠ فدان عام ١٩٩٠ الى نحو ٢٠٠٠ فدان

مشروع توشكي

فى يوليو ١٩٩٧ بدأ الغمل فى تنفيذ سشروع توشكى الذى يقدف فى مرحلته الاولى إلى استزواع تحدو ١٩٤٠ الفرية لتكوين سجتمع عمران جديد تنتوع لميه الانشطة بين زواعية وصناعية وخدمة فى إطار متكافل تسوافر فيه عناصر الجلب السكاني (قدر أن منطقة توشكي سوف تستوعب بحو ٥,٣ مليون نسمة حتى عناصر الجلب السكاني (قدر أن منطقة توشكي سوف تستوعب بحو ٥,٣ مليون نسمة حتى عام ١٧).

رَبِلغ مَاجَة منطقة مشروع توشكل تحو ٤ ,٦ مليون فدان منها نخو ٤ مليون فدان (اى نخو ٢٠٪) مخدودة الصلاحية لخو ٢٠٪) غير صالحة للاستزراع، ارتجو ٤ ,١ مليون فدان (نحو ٢٠٪) مخدودة الصلاحية للاستزراع. وتتكون المليون فدان الباقية من نحو ٤٠٠٠ الف فدان صالحة اللومي من المشروع) ونجو ٤٠٠٠ الف فدان يمكن المستصلاحها (تكون المراحل اللاحقة للمشروع).

وسوف تعتمد الزراعة في منطقة توشكي أسامًا على مياه النيل التي سنبضخ من بحيرة ناصر لتتدفق في قناة رئيسية (قناة الشيخ رايد) يتفرع منها أربعة أفرع (منجارج) ويبلغ طول قناة الشيخ رايد في المرحلة الاولى ٦٠ كنيلومتنز وأجمالي طول الأربعة قنوات الفرعية الوئيسية ١٨٥ كيلومتر وقده مليارة الرئيسية ١٨٥ كيلومتر وقده مليارة مريحت سنويا.

ولفند قلرت تكاليف المرحلة الأولى من مشروع توشكى بنحو 7 مليار جنية (تكلفة طلمبات الرفع وإنشاء قناة الكبيخ زايد والفنوات الفرضية الرئيسية) لا تشميل تكاليف شبكة الرب الداخلية وبقية أحسمال البنية الأساسية من طرق وكهرباء وسبان وإنشاءات (إلى: ولقد قدرت الاستمارات اللازمة لمشروع توشكى حتى عام ٢٠١٧ بنحو ٣٠٥ ملياز لحيه (٥٠٠). ولقد أبدت الشركة المستمودية للتنفية الزراهية (كادكو) رغبتها في استفلال نحو منافقة الزراهية (كادكو) رغبتها في استفلال نحو منافقة الزراهية المنافقة المنا

ونظراً لان منطقة توشكى منطقة صحراوية شديدة الجفياف والحرارة فإن نظامها البيئى نظام معقد وهش للغاية. وسيكون لمشروع توشكى آثار بيئة مسوعة بعضها موجب والاخر سالب (لم تجر دراسة صفصلة للاثار البيئية المتوقعة لمشروع توشكى _ أو ما يعزف بالتقييم البيئي للمشروع ، بالمخالفة لنعنوض القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ اللئي يقضى بضرورة إعداد تقييم بين للمشروعات قبل الترخيص بإنسائهها) ، ومن العوامل المهمة التي متنوش في إسترارية التنبية الزراحية في المنطقة ارتفاع معدلات المستهلاك المائي (التنبع والبخر) إلى قرابة ٢٣٩٠ مم/ سنة مشارنة رسعو ١٩٩٠ مم/ سنة مشارنة رسعو ١٩٩٠ مم/ سنة في منطقة الجيزة وبالإضافة إلى ذلك تعتبر منطقة ترشكي من المناقئ التي تنشط فيها حركة الكيان الرملية ، مما سيدة الراضي المنتزعة بالتنصير ، ونظرا لان الاراضي المستصلحة منخفضة الحصلونة فإنها طوف تحتاج إلى مدخلات عالية من المناقفة والاميدة والمهمدة المنتوات ولكل من هذه آثارها البيئة المختلفة .

مشروع التنبية الرراعية في شمال سيناء (ترعة السلام):

" يهدف المشروع إلى استعمالات نحس . . كم ألف فلمان من الأراضى في شمال سيناه وإيجاد مجتمعات جديدة في المنطقة لاستيعاب نحو مليون نسمة. وسيكون مسلس مياه الري هو سياه النيل مخلوطة بنسبة ٥٠٠٠ بمياه الصرف الزراعي (من مصرفي السرو وحادوس في المدلتا). ومسوف تنقل المياه نرعة السلام عبر مخارة محت فناة السويس. وتمتد السرعة إلى داخل سيناه بطول ٥٠ (كيلو متر.

وتعد منطقة المشروع من المناطق الحساسة إيكولوجياً فيهي موثل لحياة نباتية وحبوالية متنوعة , وتمثل بحيرانا البردويل والملاحة (بحيرة فواد) فن شمال المنطقة أهمية خاصة في هذا الصدد. ويشكل الجزء الشرقي من بحيرة البردويل (الزرائيق) محمية طبيعية، في حين يخضع باتمي البحيرة لاتفاقية رامسار للأراضى الرطبة. وتعمر بحيرة البردويل مصدر رزق لاكثر من ٢٠٠٠ صياد وعائلاتهم يعيشون حولها .

ومن المتوقع أن يكون لمشروع شمال سيناء عدة آثار بيثية صلبية، أهمها:

- ١ _ فقد بعض المواثل الطبيعية وزيادة الضغط على النظام البيتي للبراري الباقية .
 - ٢ ـُـ فقد بعض المواقع التاريخية والأثار.
- ٣ ـ نقل بعض التجمعات السكانية للبدر وتغير أتماط حياتهم (يعيشون حاليا على تربية .
 الحيوانات والزواعة على الأمطار).
- ٤ ـ تاثر النظام البيش في بحيرة البردويل نتيجة تسرب مياه الرى إلى المياه الجوقية والبحيرة المنخفضة، ويخشى أن يؤثر ذلك على أتماط مجدرة وإقامة أكشر من ٩٠ نوع من الطيور البحرية التي تتردد مؤسميا على البحيرة، وعلى التروة السمكية فيها.
- ٥- تسوّل مياه الرى (الملوثة نشيجة خلط مياه النيل بمياه الصرف) إلى خبزانات المياه
 الجوفية المحدودة في المنطقة وثلويتها.
 - ٦ ـ اجتمال حدوث (تطبيل؛ وتمليخ للتربة لهشاشة طبقاتها وتكوينها.
- ٧ مياه ترعة السيلام لا تصلح للاستهخارام البيشرى لوجود مسخلفات أدمية وزراحية
 وصناحية بهنا، وقيل يؤدى استخدامها بواسطة بعض الاهالى إلى زيادة حالات
 الامراض المعوية والامراض الاحرى حيثل البلهارميا، ما لم تتوفر منصادر مياه شرب
 نظيفة وتتخذ الإجراءات لمنع انتشار الامراض الهيئية للخلفة.
- ٨ ـ سيبودى سخب نحو ٢٠١٢ صليار مشر مكعب بن مياه الصرف من مصرفى السرو وحادوس (اللهان يضبان في بحيرة المنزلة) إلى الإضرار بالنظام السئى في بحيرة المنزلة. فسين المسوقم أن تزداد الملوحة فيها من ٣جرام/لسر حاليًا إلى نجو ٨ جرام/لترا عما متكون له آثار سلية على الإحياء المائية في البحرة.

هذا ويمكن الحد من هذه الآثار البيتية السلبة بانخاذ عدة إجراءات واستشمارات فلوتصل الرأ عدة مثات من الملايين من الجنبهات (٥١):

۲ ـ الميساد

تتوقف الاحتياجات المائية في مصر عام ٢٠٢٠ على عدة عوامل، أهمها:

- ـ مساحة الأرض الزراعية، والتركيبة المحصولية.
 - ـ طرق الري المستخدمة، وكفاءة كل منها.
- ـ النمو السكاني في المناطق الحضرية والريفية والتغيرات في معدلات استخدام المياه للأغراض المنزلية.
 - ـ أنماط التنمية في مجالات الصناعة والخدمات واحتياجاتها من المياه.
- ـ الجهود الـتي ستبذل لرفع كـفاءة استخـدام الميـــاء في القطاعات المختلفة (تـرشيد الاستخدام).
 - ـ معدلات استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحى المعالج في الري.

ويوضح جدول رقم (١٤) الاحتـياجات الماثية المتوقعـة عام ٢٠٢٠ في السيناريو المرجعي الحالى مقارنة بالاستخدامات في عام ١٩٩٦ (انظر أيضا شكل رقم ٥).

جدول رقم (۱٤) الاحتياجات المائية المتوقعة عام ٢٠٢٠ (مليار متر مكعب سنويا)*

الاحتياجات عام ٢٠٣٠	المياه المسيحوية للاستخدام (١٩٩٦)	القملــــاع
۵۵,٠	0.,.	الرى
7.7	0,.	المسناعة
A, Y	٤,٠	استخدامات منزلية / تجارية
٧.٠	۲,۰	استخدامات أخرى
٧١,٥	31, -	الجملة
11,7	17,7	+ ٠٠ ٢٪ ناتب
۸۵,۸	٧٣,٢	الجملة


* قدرت الاحتياجات في عام ٢٠٢٠ طبقا للافتراضات التالية:

ـ مساحـة الأرض الزراعيّة في عام ٢٠٢٠ نحو ٢ ، ٩ مـليون فدان، تروى ٢ مليون منها بالطـرق التقليدية (متوسط ٧٥٠٠ مَتر مكعب للفدان في السنة) وتروى ٢ ، ٣ مليون منها بالطرق الحديثة ميثل الرش والتنقيط (متوسط ٣٠٠٠ منر مكعب في السنة). مع بقياء النركيبة المحصولية كما هي الآن (انظر

جدول رقم ٣). - سيزداد معدل استخدام المياه في الصناعة بمتوسط سنوى قدره ١٪ حتى عام ٢٠٢٠، مع حدوث ترشيد طفيف في استخدام المياه في هذا القطاع.

ـ سوف يزداد استخدام المياه في القطاع المنزلي والتجاري بمعدل سنوي قدره ٥ , ١٪ حتى عام ٢٠٢٠ مع معدلُ سنوى في زيادة السكان قدره ٥٥ , ١٪، بالإضافة إلى حدوث ترشيد طفيف في القطاعين.

- الاستخدامات الأخرى مثل الملاحة... إلخ. - الفاقد يشمل البخر من المسطحات الماثية والتسرب... إلخ.



شكل رقم (٥): الاحتياجات للمياه في السيناريو المرجعي

وكما أوضحنا من قبل فإن إجمالى الموارد الماثية المتاحة في عام ١٩٩٦ كانت ٢,٦٥ مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، ١٩٩١ كانت جوفية متجددة وغير متجددة، ٣,٩ مياه صرف زراعى أعيد استخدامها، ٥،٠ مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحى المعالج). وبذلك فإن العجز المائى في عام ١٩٦٦ كان نحو ٢،٨ مليار متر مكعب. وبفرض ثبات هذه الموارد فإن هذا يعنى أن العجز المائى سيزداد في عام ٢٠٢٠ إلى نحو ٢،٢١ مليار متر مكعب.


ولكن هناك جهود تبذل لمحاولة سد جزء من هذا العجز منها:

- ١ ـ تنفيــذ المرحلة الأولى من مشروع قناة جونجلى التى ســـتزيد من حصة مــصر من مياه نهر النيــل بنحو ٢ مليار متر مكعب.
- ٢ ـ زيادة استخدام المياه الجوفية المتجددة والغير متجددة إلى نحو ٨ مليار متر مكعب
 في السنة .
- ٣ ـ زيادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري إلى ٦ مليار متر مكعب في السنة.
- إحداث تغيرات في التركيبة المحصولية (مثل خفض مساحات الأرز وقصب السكر) لتوفير نحو ٣ مليار متر مكعب من المياه.
- ٥ ـ تحسين شبكات الرى لخفض نسبة من الفاقد مما قد يؤدى إلى توفير ٤ مليار متر مكعب.

وقد تؤدى كل هذه الجهود إلى زيادة كمية المياه من ٦٤,٦ مليار متر مكعب عام ١٩٩٦ إلى نحو ٨٢ مليار مـتر مكعب عام ١٩٩٠ أى خفض العـجز المائى المشار إليه عاليه إلى نحو ٣,٨ مليار متر مكعب.

وحتى إذا تحقق ذلك فسوف ينخفض نصيب الفيرد من المياه المسحوبة للاستخدامات المختلفة من ٩٩٦ متر مكعب عام ١٩٩٦ إلى ٨٠٣ متر مكعب عام ٢٠٢٠ وكلاهما أقل من مؤشر الضغط المائى وقيمته ١٠٠٠ متر مكعب/فرد/سنة (شكل رقم ٦). وبمعنى آخر فإن الضغط المائى سيزداد فى السيناريو المرجعى بحلول عام ٢٠٢٠، مما سيكون له آثار سلبية مختلفة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.





شكل رقم (٦): كمية المياه المسحوبة للفرد في السيناريو المرجعي

كان استخدام الطاقة الأولية التجارية في مصر عام ١٩٨٠ نحو ١٦ مليون طن نفط مكافئ ارتفع بمعدل ٥/ سنويا حتى بلغ نحو ٣٧ مليون طن نفط مكافئ في عام ١٩٩٧، وتتوقف احتياجات الطاقة في المستقبل على عدة عوامل منها أنماط التنمية الاقتصادية، النمو السكاني، والتطورات في نوعية الحياة في الحضر والريف. وفي السيناريو المرجعي من المتوقع استمرار الاتجاه التاريخي في زيادة استخدام الطاقة السيناريو المرجعي من المتوقع استمرار الاتجاه التاريخي في زيادة استخدام الطاقة يعدر حجم الاحتياجات للطاقة الأولية عام ٢٠٢٠ بنحو ١١٩ مليون طن نفط مكافئ (شكل رقم ٧). أما استهلاك الفرد المتوقع من الطاقة الأولية التجارية فسوف يرتفع من نحو ١٩٩٧ إلى نحو ١٠٩٠ كيلوجرام نفط مكافئ في عام ٢٠٢٠، أي بمعدل زيادة سنوية قدرها ٣٪ في الفترة من ١٩٩٧ الطاقة التجارية تأخذ في الحسبان النسب المتواضعة التي قد تتحقق زيادة استهلاك الطاقة التجارية تأخذ في الحسبان النسب المتواضعة التي قد تتحقق نتيجة رفع كفاءة استخدام الطاقة في الأغراض المختلفة، وكذلك التغيرات التي قد تخدث نتيجة الاتجاه نحو الصناعات الصغيرة والمتقدمة قليلة الاستهلاك للطاقة. كما تأخذ في الحسبان النبيات التي المناهل للطاقة. كما تأخذ في الحسبان التغيرات التي قد تتحقق تأخذ في الحسبان النبيات التهيرات التي قد تتحقق تأخذ في الحسبان النبيات التهيرات التي قد تتحقق تأخذ في الحسبان النبيرات التهيرات التي قد تتحقق تأخذ في الحسبان التغيرات التهيرات التي قد تتحقق تأخذ في الحسبان التغيرات التغيرات التوقعة في أنماط الحياة والاستهلاك للطاقة. كما تأخذ في الحسبان التغيرات المتوقعة في أنماط الحياة والاستهلاك للطاقة.

ويوضح جدول رقم (١٥) تقديرات الاحـتياجات من مصادر الطاقـة المختلفة في عام ١٩٩٧.

جدول رقم (١٥) تقديرات احتياجات مصر من مصادر الطاقة التجارية المختلفة (مليون طن نفط مكافئ)


	إجمالى	نحم	طاقة مائية	خاز طبيعى	يترول خام	السنة
I	Ť1,V	٠,٨	۲,۲	1 - , "	3,77	1997
ı	114,4	۴,٥	۳,۰	18,4	٤٨,٩	4.4.

تقديرات عام ٢٠٢٠ تمت بالافتراضات التالية:


ـ معلل زيادة استهلاك البترول ٤ , ٣٪ سنويا على أساس احتياجات القطاعات المختلفة وعلى أساس إحلال الغاز الطبيعي في ٣٠٪ من الاستخدامات، خاصة في قطاع الصناعة .

ـ معدل زيادة سنوى في أستهلاك الغاز الطبيعي قدره ٨٪.

معدل زيادة سنوى في استخدام الفحم يقدر بنحو ٣٪ (يستخدم الفحم في بعض الصناعات).



شكل رقم (٧): الطلب على الطاقة التجارية في السيناريو المرجعي



شكل رقم (٨): استهلاك الفرد المتوقع للطاقة التجارية في السيناريو المرجعي

أما بالنسبة لسيناريوهات إمدادات الطاقة حتى ٢٠٢٠ فهى معقدة لأنها تعتمد على خليط الطاقة الشهر الذي تعدده عدة عوامل أهمها حجم الاحتياطي المتاح من كل مصدر من مصادر الطاقة الأولية، سياسات استغلال هذه المصادر للاستخدام المحلى والتصدير، وإمكانات إحلال نوع من أنواع الطاقة محل الآخر، إلى غير ذلك من عوامل تحددها أساسًا السياسات الاقتصادية القومية.

إمدادات الطاقة

كان الاحتياطى المؤكد من البترول الخام الذى يسمكن استخراجه اقتصاديا في عام ١٩٩٠ نحو ٣ مليار برميل أو ١٤٠ مليون طن. وخلال الفترة من ١٩٩٠ ١٩٩٠ تمت عدة اكتشافات بترولية (نحو ٤٤ اكتشافًا طبقا لبيانات منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط) زادت من كمية الاحتياطى خملال تلك الفترة بنحو ٣٤٩ مليون طن، أى أن الاحتياطى الاسمى للبترول في نهاية عام ١٩٩٧ كان ١٩٥٧ مليون طن. وذلك لأنه تم إنتاج ولكن الاحتياطى الفعلى في آخر ١٩٩٧ كان ١٤٠ مليون طن، وذلك لأنه تم إنتاج عليون طن خلال الفترة من ١٩٩٠ كان ١٩٩٠ (بمعدل سنوى ثابت تقريبا ٤٢٣٤ مليون طن) لسد الطلب المحملي على منتجات البترول، والتصدير. ومعنى هذا أن مصر حافظت على مستوى احتياطى البترول منذ ١٩٩٠ (٢١٠ مليون طن) وأنتجت فقط الكميات التي أضيفت إلى هذا الاحتياطى من الاكتشافات الجديدة.

فى كتاب «حديث عن البترول المصرى» أوضح حمدى البنبى أن الموقف البترولى ينحصر فى التالى: ١ ـ تناقص إنساج الحقول الكبيرة التى اكتشفت فى خليج السويس فى الستينيات (المرجان والبلاعيم)، والتى اعتمدت عليها مصر لحقبة طويلة من الزمن، منذ أوائل الثمانينيات.

٢ ـ برغم الجهود الكبيرة التى بذلت منذ بداية الشمائيتيات فى التوسع فى إبرام اتفاقيات الاستكشاف فى مصر، لم تسفر هذه الجهود إلا عن اكتشاف عدة حقول صغيرة.وبالرغم من أن إنتاج هذه الحقول قد أضاف إلى احتياطى البترول فى مصر، إلا أن زيادة الطلب على البترول (للتصدير والاستهلاك المحلى) أدت إلى بدء الانخفاض فى الاحتياطى خاصة منذ النصف الثانى من التسعينيات.

ويقدر أن الاحتياطى المؤكد للبتسرول قد انخفض من ١٥٥ مليون طن فى نهاية عام ١٩٨٢ الى نحو ٢٠٥ مليون طن فى نهاية عام ١٩٩٨ . ولولا كميات البترول التى اكتشفت خلال تلك الفترة (بلغت نحو ٢٠٠ مليون طن وتم إنتاجها لسد الطلب على البترول) لتم استنفاد جميع احتياطى البترول الموجود عام ١٩٨٧ بحلول عام ١٩٩٥ تقريبا.

المصدر: حسمدى البنبي «البسرول المصرى: تجارب الماضى وآفاق المستسقبل». دار المعارف، القاهرة (١٩٩٩).

ويتوقف إنتاج البترول في المستقبل على كميات الاحتياطي والكميات التي تضاف إلى هذا الاحتياطي نتيجة الاكتشافات الجديدة، وعلى الطلب على البترول للتصدير والاستهلاك المحلى. وفي حالة عدم التوصل إلى اكتشافات بترولية جديدة في المستقبل القريب، وثبات الإنتاج السنوى عند ٤٣-٤٢ مليون طن (يخص مصر منها المستقبل القريب، وثبات الإنتاج السنوى عند ١٤-٤٣ مليون طن)، فإن ذلك سوف يؤدى لا مليون طن والشريك الأجنبي نحو ١٤ مليون طن)، فإن ذلك سوف يؤدى إلى خفض ملحوظ في تصدير البترول حتى يمكن سد الاحتياجات المحلية المتزايدة حتى قرابة عام ٢٠٠٠ / ٢٠٠٥. وبعد ذلك سيتوقف تصدير البترول كلية وتبدأ مصر في استيراد كميات متزايدة منه لسد احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.

أما إذا حدثت اكتشافات جديدة لتزيد من احتياطى البترول، فهذا معناه امتداد فترة إنتاج البترول للتصدير والاستهلاك المحلى (بشرط ترشيد الإنتاج لعدم التعجيل باستنزاف الاحتياطى). وإذا فرضنا أن الاحتياطى الحالى (حوالى ٤١٠ مليون طن) سيمكن الإبقاء عليه حتى عام ٢٠٠٥ (أى أن الإنتاج حتى عام ٢٠٠٥ سيكون من موارد مكتشفة حديثا) فإن ذلك سيودى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من البترول حتى عام ٢٠١٠ تقريبا.

- بلغت إيرادات البترول في مصر في العام المالي ١٩٩٥/١٩٩٤ نحو ١٩٣٣، ا مليسار دولار وفي ١٩٩٦/١٩٩٥ نحسو ١٩٣٧، مليسار دولار وفي ١٩٩٧/١٩٩٦ نحو ١,٣٩٧ مليار دولار. وتصدر نسبة كبيرة من البترول إلى إسرائيل (بلغت نحو ٣٨٪ من صادرات النفط في عام ١٩٩٦).
- تم فى الإسكندرية إنشاء معمل تكرير الشرق الأوسط وهو مشروع مشترك مع إسرائيل لتكرير نحو ١٠ مليون برميل من النفط الخمام من رأس غارب ونحو ٢٥ مليون برميل من النفط المستورد سنويا، بهدف التصدير. ويقال إن هذا المعمل هو أول معمل لتكرير النفط فى الشرق الأوسط مصمم على الالتزام بمعايير البيئة التي وضعها الاتحاد الأوروبي.

المصدر: تِقارير المساحة الجيولوجية الأمريكية ـ واشنطن ـ ١٩٩٧.

أما عن الغاز الطبيعى فقد كان احتياطى الغاز متواضعًا فى نهاية ١٩٨٢ (نحو ١٦٦ مليار متر مكعب أو ١٣٨ مليون طن نفط مكافئ). ولقد ارتفع هذا الاحتياطى بدرجة كبيرة نتيجة الاكتشافات المختلفة لحقول الغاز خاصة فى شمال دلتا نهر النيل.


وبلغ الاحتياطى فى نهاية عام ١٩٩٨ نحو ٩٨٠ مليار متر مكعب (أو ٨١٦ مليون طن نفط مكافئ) يخص مصر منها نحو ٥٠٠ مليار متر مكعب (أو ٤١٦ مليون طن نفط مكافئ). وبفرض التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى (زيادة ٨٪ سنويا حتى عام ٢٠٢٠) فإن إجمالى الطلب على الغاز الطبيعى لسد الاحتياجات المحلية سيكون نحو ٢٩٠ مليون طن نفط مكافئ خلال الفترة من ٢٠٠٠ ـ ٢٠٢٠. ومع وجود احتمالات قوية لاكتشافات إضافية للغاز خلال الأعوام المعشرة القادمة، فإن احتياطى الغاز الطبيعى سيكفى حاجة الاستهلاك والتصدير. ومن المتوقع أن تكون حصة الغاز الطبيعى فى خليط الطاقة المستخدم فى مصر مساوية لحصة للبترول فى عام ٢٠١٥ تقريبا (انظر شكل ٩).

هذا ومن المتوقع التوسع في استغلال بعض مصادر الطاقة المتجددة (خاصة طاقة الشمس والرياح) في عدد من الاستخدامات خاصة في المناطق النائبة والتجمعات السكانية الجديدة (في شمال سيناء ومنطقة توشكي مثلا). ولكن ستبقى مساهمة مصادر الطاقة المتجددة متواضعة (في حدود مليون طن نفط مكافئ) مقارنة بالمصادر التقليدية (البترول والغاز الطبيعي والطاقة المائية). ولا يستبعد في هذا السيناريو التفكير في اتخاذ إجراءات عملية لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية بعد عام ٢٠٢٠، ولكن من غير المحتمل بدء تشغيل هذه المحطة قبل ٢٠٢٠.

مما سبق يتضح أن مصر ستواجه مشكلة في إمدادات الطاقة (خاصة البترول) بعد عام ٢٠١٠ ما لم تتم اكتشافات جديدة تضيف كميات كبيرة من النفط إلى الاحتياطي المؤكد الذي يمكن استخراجه اقتصاديا. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن البترول كوقود في استخدامات كثيرة (إحلال الغاز الطبيعي محل البترول يقتصر على استخدامات محدودة لأسباب فنية واقتصادية)، بالإضافة إلى أن البترول هو المصدر الرئيسي للمركبات الأولية التي تدخل في الصناعات البتروكيماوية المختلفة.

رابعا ـ حالة البيئة في عام ٢٠٢٠

أوضحنا فيما سبق التغييرات المتوقعة في النمو السكاني، وفي توزيع السكان بين الحضر والريف، وفي استخدامات الموارد الطبيعية الرئيسية (الأرض، المياه، الطاقة). وهي التغيرات التي ستحدد _ بجانب السياسات وأنماط الإدارة البيئية المختلفة _ حالة البيئة حتى عام ٢٠٢٠. ويفترض في السيناريو المرجعي استمرار السياسات وأساليب



شكل رقم (٩): التوقعات بالنسبة لحصص البترول والغاز الطبيعى

الإدارة البيئية الحالية، والتي نوجز أهم معالمها في التالي (انظر أيضًا الفصل الرابع من الباب الأول):

- ـ عدم وجود أولويات للعمل البيثى (برامج واقعية زمنية بميزانيات محددة للحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية).
- ـ استمرار عــدم وضوح الرؤية المستقبلية لتــرسيخ مفهوم التنمية المســتدامة ـ قولاً وعملاً.
- الفجوة الكبيرة بين الإعلان السياسي (الممثل في التصريحات الرسمية والخطب وتوصيات الندوات والمؤتمرات. . إلخ) والعمل الفعلي لتحقيق أهداف محددة.
- استمرار الاعتماد بشكل شبه كامل على المعونات الأجنبية لتمويل العمل البيشي، مما سيؤدى الى استمرار «تلوين» الأنشطة البيشية باهتمامات الجهات المانحة للمعونات، وعدم التركيئ على المشكلات المحلية المتراكمة والتي تتفاقم يومًا بعد يوم.
 - ـ استمرار الوضع الحالى الضعيف للأجهزة المعنية بشئون البيئة.
- استمرار عدم الاهتمام بمراجعة التشريعات البيئية لتنقيتها من النواحى الفنية والتنفيذية ؛ مما يعنى استمرار عدم دقة وواقعية التشريعات وضعف آليات تنفيذها.
- استمرار عدم اقتناع قيادات كثيرة بأهمية حماية البيئة وجدوى الاستثمار فيها، واعتبار المتطلبات البيئية من «معوقات» الإنتاج والاستثمار.
- استمرار محدودية المشاركة الشعبية ودور الجمعيات الأهلية، بالرغم من زيادة الوعى العام بقضايا البيئة، وذلك بسبب المعوقات الإدارية والسياسية والمالية المختلفة التي تواجه هذه الجمعيات.

ويمكن تلخيص الأوضاع البيئية المتوقعة في عام ٢٠٢٠ في التالي:

(١) تلوث الهواء

سوف تزداد أحمال الملوثات فى الهواء بزيادة استخدام الطاقة الحفرية (البترول والمغاز الطبيعى) والنمو فى بعض الصناعات (مثل الأسمنت) وزيادة عدد المركبات المختلفة من حوالى ٢,٧ مليون مركبة موجودة

بالحركة فى آخر ديسمبر ١٩٩٨ إلى نحو ٥,٥ مليون مركبة فى ٢٠٢٠، بمتوسط معدل زيادة قدره ٥,٣٪ سنويا). ويوضح جدول رقم (١٦) تقديرات أحمال ملوثات الهواء فى مصر من المصادر المختلفة فى عام ٢٠٢٠، مقارنة بعام ١٩٩٧.

جدول رقم (١٦) تقديرات أحمال ملوثات الهواء في مصر في عام ٢٠٢٠ (بالألف طن)*

	الهيدروكربونات	جسيمات عاللة	أكاسيد نيتروجين	ثانى أكسيد كبريت	السنة
ı	71		7.0	A74	1997
ı	**	777.	YOY	1.4.	7.4.

* - تم حساب كميات ملوثات الهواء في ٢٠٢٠ على أساس خليط الطاقة المتوقع استخدامه (انظر جدول رقم ١٥)، وعلى أساس معدلات النمو الصناعي، وزيادة عدد المركبات الموجودة بالحركة. - تم تخفيض كمية الملوثات بنحو ٥٠٪ حيث إن الصناعات الجديدة التي ستنشأ والمركبات الجديدة التي ستستورد ستكون مصممة من قبل الشركات الأجنبية المنتجة لها مراعية الشروط البيئية بحيث ستنبعث منها أقل كمية محكنة عمليا من الانبعاثات المختلفة. هذا بالإضافة إلى أن بعض الصناعات الحالية ستتخذ بعض الإجراءات للحد من انبعاث الملوثات منها، كما أنه يتوقع أن تترك الحركة أعدادا متزايدة من المركبات القديمة الملوثة للبيئة.

ومعنى هذا أن تركيزات ملوثات الهدواء ستبقى مرتفعة. ومن المتدوقع أن تمتد مشكلات تلوث الهدواء إلى مناطق حضرية أخرى بخلاف الهاهرة الكبرى والإسكندرية، التى ستتفاقم فيها هذه المشكلات (من المتدوقع تكرار حدوث نوبات تلوث هواء حاد أو سحب سوداء فى القاهرة الكبرى). وفى ضوء الزيادة المتدوقعة فى عدد سكان الحضر، يقدر أن عدد السكان الذين سيتعرضون لتركيزات غير صحية لملوثات الهواء (أعلى من معايير منظمة الصحة العالمية) فى عام ٢٠٢٠ سيكون نحو لمدون نسمة فى المناطق الحضرية فى مصر. وبذلك ستزداد معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى وحالات الوفاة المبكرة (Premature deaths).

وبالإضافة إلى الملوثات الرئيسية التي سبق ذكرها ستطفو إلى السطح مشكلات التلوث ببعض المركبات العضوية الناتجة من زيادة استخدام السولار كوقود (يحتوى الهواء في الوقت الحالى على تركيزات منخفضة من هذه المركبات التي يعتبر بعضها من المواد التي تسبب السرطان)، وكذلك ستزداد مشكلات تلوث الهواء الداخلي (داخل المباني) نتيجة التوسع في استخدام بعض مواد وكيماويات البناء الحديثة وتكييف الهواء مع قلة التهوية الطبيعية . إلخ .

من جهة أخرى سوف تزداد انبعاثات غازات الاحستباس الحراري، وتقدر كمية

ثانى أكسيد الكربون المنبعثة في عام ٢٠٢٠ بنحو ٢٥٣ مليون طن، في حين تقدر كمية غاز الميثان بنحو ٨٦٧ ألف طن وغاز أكسيد النيتروز بنحو ٦٦ ألف طن. ولكن ستظل نسبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حوالي ٥٠ ٪ من الانبعاثات في العالم (من المتوقع أن تنخفض الانبعاثات في الدول المتقدمة إلى مستوى عام ١٩٩٠، بينما تزداد الانبعاثات في الدول النامية لزيادة معدلات استخدام الطاقة الحفرية فيها). وربما تؤدى زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على المستوى العالمي إلى ارتفاع طفيف في درجة الحرارة في عام ٢٠٢٠ يصاحبه ارتفاع محدود في مستوى سطح البحر (٥-١٠سم). وسوف يتبع هذا غمر بعض الأراضي المنخفضة في شمال الدلتا، خاصة مع بطء الإجراءات المتخذة لحماية الشواطئ من التآكل.

(٢) تلوث المياه

فى السيناريو المرجعى سوف تستمر عمليات صرف المخلفات السائلة فى نهر النيل وفروعه بطريق مباشر أو غير مباشر (عن طريق المصارف التى تصب فى نهر النيل أو الترع الرئيسية أو عن طريق عصليات نزح المخلفات وتفريغها فى الترع والمصارف). ومن المتوقع أن تكون الصورة فى عام ٢٠٢٠ كالتالى:

- * استمرار الصرف الزراعى (نحو ٤٠٠٠ مليون متر مكعب) في نهر النيل في الوجه القبلى بين أسوان والقاهرة ؛ وهي كمية مماثلة للمعدلات الحالية بالرغم من زيادة مساحة الأراضى الزراعية باستصلاح نحو ١,٣ مليون فدان على جانبي الوادى. ولكن هناك احتمالا لاستخدام بعض مياه الصرف الزراعي في الري في الوجه القبلي.
- * زيادة كمية الصرف الصحى غير المعالج المنصرف في النيل في الوجه القبلي إلى ما يقرب من ٢٠٠٠ مليون متر مكعب في السنة لزيادة عدد السكان وعدم مصاحبة ذلك بإنشاء عدد مناسب من محطات معالجة الصرف الصحى (سيتم إنشاء بعض المحطات في المدن الرئيسية فقط، لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة).
- * سوف تنخفض عمليات صرف المخلفات الصناعية في نهر النيل وفروعه بدرجة ملحوظة. وسوف يحدث ذلك بسبب إقبال بعض الصناعات على معالجة مخلفاتها، ولكن غالبية الصناعات سوف تتخذ طرقا بديلة أرخص لصرف مخلفاتها (مثل الصرف في شبكات المجاري العامة، الصرف في المصارف الزراعية أو في بيارات تنزح من آن لآخر، وتلقى مخلفاتها بعد ذلك على الأرض في مناطق صحراوية مجاورة أو في المصارف الزراعية).

- * سوف تبقى مياه النيل ملوثة، أساسًا تلوثًا بكتريولوجيا، ولكن ستسوء نوعية رسوبيات النيل فى قاعه بسبب امتصاص هذه الرسوبيات لكميات متزايدة من الكيماويات (الأسمدة والمبيدات فى مياه الصرف الزراعى وبعض العناصر الثقيلة فى مياه الصرف الصناعى، التى ستجد طريقها إلى نهر النيل بطريق مباشر وغير مباشر).
- * من المتوقع حدوث تغيرات في نوعية مياه نهر النيل أيضًا لاختلاف نوعية المياه الواردة إلى بحيرة ناصر من الجنوب. فدول حوض نهر النيل سوف تشهد زيادة سكانية كبيرة حتى عام ٢٠٢٠، بالإضافة إلى إقدام معظم هذه الدول على عمليات تنمية زراعية وصناعية. وسوف يؤدى ذلك إلى صرف كميات متزايدة من المخلفات السائلة في نهر النيل بطريق مباشر وغير مباشر، مما ستكون له آثار كبيرة على نوعية المياه (على سبيل المثال أوضحت التحاليل الحديثة لمياه النيل شمال مدينة الخرطوم زيادة تلوث المياه ببكتريا القولون نتيجة الصرف الصحى المتزايد).
- * مع استمرار عشوائية صرف المخلفات السائلة المختلفة، سوف يزداد تدهور نوعية المياه في الخزانات الجوفية، خاصة الموجودة في دلتا نهر النيل؛ وهي الخزانات التي تمثل المصدر الرئيسي لمياه الشرب في العديد من المناطق.
- * سيؤدى صرف المزيد من المخلفات السائلة (صرف زراعى مختلط بصرف صحى ومخلفات الصناعة) في بحيرات شمال الدلتا إلى استمرار تدهور الأوضاع البيئية فيها، خاصة مع زيادة عمليات تجفيف أجزاء من هذه البحيرات بطرق مشروعة وغير مشروعة مما سوف يقلل من قدراتها الاستيعابية. وسوف يؤدى تحويل نحو مغير مشروعة مما سوف يقلل من قدراتها الاستيعابية. وسوف يؤدى تحويل نحو مهرا مليار متر مكعب من مياه الصرف من مصرفي السرو وحادوس إلى ترعة السلام لاستخدامها مختلطة بمياه النيل في رى مشروع شمال سيناء إلى زيادة الملوحة في بحيرة المنزلة مما سيؤدى إلى آثار بيئية سلبية فيها (انظر إطار مشروع ترعة السلام في البند «ثالثا» من هذا الفصل).

(٣) المناطق الساحلية والبيئة البحرية

من المتوقع في عام ٢٠٢٠ أن يزداد صرف المخلفات السائلة في البيئة البحرية شمال الدلتا (صرف صحى ومخلفات صناعية) نتيجة النمو السكاني والتنمية الصناعية في المناطق الساحلية. وبالرغم من الجهود المبذولة لمعالجة بعض المخلفات (سواء بإنشاء بعض المحطات لمعالجة الصرف الصحى أو قيام بعض الصناعات بإنشاء

وحدات لمعالجة مخلفاتها السائلة) سوف تزداد أحمال الملوثات التى ستجد طريقها إلى المناطق الساحلية والبيئة البحرية. كما ستؤدى عمليات تكثيف استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعى فى هذه المناطق وفى الرصيف القارى شمال الدلتا إلى صرف عدة ملوثات (خاصة مخلفات عمليات حضر الآبار الاستكشافية وآبار الإنتاج ومخلفات عمليات الإنتاج، وسيساعد على تدهور البيئة الساحلية فى البيئة البحرية والمناطق الساحلية على تدهور البيئة الساحلية فى شمال الدلتا احتمالات غمر بعض المناطق الساحلية المنخفضة بمياه البحر، وسوف يؤدى هذا إلى آثار سلبية على نوعية المياه الجوفية الساحلية بزيادة ملوحتها وتلوثها، كما سيؤثر على إنتاجية الأراضى الزراعية فى هذه المناطق الهامشية الحساسة بيئيا، ومن المتوقع أن يزداد التدهور البيئى فى منطقة خليج السويس بعد إنشاء المجمعات الصناعية المختلفة والتى ستقوم بصرف مخلفاتها فى البحر مباشرة (بعضها غير معالج أو معالج جزئيا).

كذلك ستتعرض المناطق الساحلية لضغوط متزايدة نتيجة زيادة عدد الزوار الموسميين والسائحين. وسوف لا تقابل التوسيعات الكبيرة في الطاقة الفندقية والتجمعات السكنية (القرى السياحية) في هذه المناطق بتوسعات موازية في البنية والخدمات الأساسية، مما سيـؤدي إلى تجاوز القـدرات الاستيـعابية لـها في بعض المواقع. فعلى سبيل المثال سوف تزداد الضغوط على محطات مياه الشرب وعلى محطَّات معالجة الصرف الصحى. وقد يؤدى هذا إلى قيام بعض المنشـآت بصرف مخلفاتها غير المعالجة أو المعالجة جزئيا في البيئة البحرية، مما سيكون له آثار سلبية على نوعية مياه الاستحمام في بعض الشواطئ. كذلك ستؤدى هذه الضغوط إلى إيجاد مشكلات متزايدة في إدارة المخلفات الصلبة (القمامة)، وتلوث الهواء نتيجة زيادة كثافة المرور في المنتجعات السياحية. وبالإضافة إلى هذا ستؤدى الزيادة في الأنشطة البحرية الترفيهية (الرياضات البحرية، الغوص، وغيرها) إلى آثار سلبية على نوعية مياه بعض الشواطئ (على سبيل المثال أدت الكثافة المتزايدة للنشات وغيرها من المركبات السبحرية الترفيهية إلى زيادة تركيلزات الهيدروكربونات والزيوت في بعض المناطق الساحليـة في شرم الشيخ والغردقـة نتيجة تســرب الوقود والزيوت منها)، بالإضافة إلى إلحاق بعض الأضرار بالشـعاب المرجانية والموارد الساحلية التي هي في الواقع أساس الجذب السياحي والترفيهي الساحلي.

(٤) تدهور التربة والتصحر

يقدر متـوسط ما يفقد من الأراضى الزراعـية لاستخـدامات أخرى (مثل تشـييد الطرق وأعمال البنية الأساسية الأخرى والمساكن. . . إلخ) منذ عام ١٩٩٠ بنحو ٢٥

ألف فدان سنويا. وبالرغم من القوانين التى تحد أو تمنع استخدام الأراضى الزراعية في غير الإنتاج الزراعي، فسوف يستمر فقدان مساحات متزايدة من هذه الأراضى لضرورات التوسع في البنية الأساسية والمساكن والخدمات العامة لمواجهة الزيادة السكانية خاصة في دلتا نهر النيل وواديه. والقول بأن المدن والمجتمعات الجديدة ستحل مشكلة التكدس السكاني في الدلتا ووادى النيل قول يفتقر إلى الرؤية الموضوعية للأمور. فالمدن والتجمعات الجديدة التي شيدت حتى الآن تفتقر إلى عناصر الجذب القوية لتشجيع أعداد متزايدة من السكان على الانتقال إليها والإقامة الدائمة فيها. وبدلاً من أن تصبح المدن الجديدة مدنا مستقلة قائمة بذاتها فإنها تحولت العمراني إلى ضواح (satellites) للقاهرة الكبرى. ولقد أدى هذا الإخفاق في التخطيط العمراني إلى تفاقم مشكلات القاهرة الكبرى السكانية والبيئية.

وبالإضافة إلى فقدان مساحات من الأراضى الزراعية سوف يؤدى تكثيف الزراعة خاصة في الأراضى المستصلحة إلى زيادة تدهور مساحات متزايدة منها، وبالتالى إلى انخفاض إنتاجيتها، وتصحرها في النهاية، مما قد يؤدى إلى تحويلها لأغراض أخرى غير الإنتاج الزراعى. فهذه الأراضى تعتبر من الأراضى الهشة إيكولوجيا ولها قدرات تحمل محدودة إذا ما تم تجاوزها انهارت نظمها الإيكولوجية وتحولت إلى أراض غير منتجة يصعب استصلاحها مرة أخرى.

ومع عدم إحداث تغيرات جذرية فى أنماط الرى الحالية هناك احتمال كبير لزيادة تشبع مساحات متزايدة من الأراضى الزراعية، خاصة المستصلحة، بالمياه (أى تطبيلها) وزيادة ملوحتها لانعدام أو عدم كفاءة شبكات الصرف فيها. كما أن هناك احتمالا لزيادة ملوحة بعض الأراضى فى شمال الدلتا، نتيجة تقدم مياه البحر على اليابسة فى بعض المناطق المنخفضة، عما سيؤدى إلى زيادة ملوحة المياه الجوفية المستخدمة فى الرى فى تلك المناطق.


(٥) المشكلات البيئية في المناطق الحضرية

سوف تؤدى النزيادة الكبيرة في عدد سكان الحسضر في عام ٢٠٢٠ إلى تسفاقم المشكلات البيئية في المدن المختلفة، خاصة في المناطق العشوائية فيها. فسمن غير المتوقع أن تقابل الزيادة السكانية في المناطق الحضرية بالاستثمارات المناسبة في البنية الأساسية والخدمات الرئيسية (مثل الطرق، إمدادات مياه الشرب، شبكات ومحطات الصرف الصحى، عسمليات جمع ونقل المخلفات البلدية الصلبة، إلى غير ذلك). وبالرغم من المجهودات التي قد تبذل في هذا الصدد سوف يزداد عدد سكان الحضر


الذين لا تصل إلى شققهم مياه الشرب من نحو ٤ مليون في عام ١٩٩٦ إلى نحو ٨ مليون في عام ١٩٩٦ إلى نحو ٨ مليون في عام ٢٠٢٠ (شكل رقم ١٠)، ومعظم هؤلاء يسكنون المناطق العشوائية في المدن ويحصلون على المياه للاستخدامات المنزلية من حنفيات مركزية أو طلميات. ومع التغيرات التي ستحدث في نوعية الحياة في المناطق الحضرية من المتوقع زيادة الطلب على المياه من نحو ٥٣٥ لترا/ فرد/ يوم في الوقت الحالي إلى نحو ٥٠٠ لتر/ فرد/ يوم في عام ٢٠٢٠، مع التنويه هنا إلى أن هذا المتوسط لا يعكس الفروق الكبيرة الموجودة بين المدن المختلفة أو بين المناطق المختلفة داخل المدينة الواحدة. ويعني هذا زيادة مشكلات إمدادات مياه الشرب في المناطق الحضرية إذا لم يتم توفير الاعتمادات اللازمة للتوسع في محطات مياه الشرب وشبكات التوزيع.

أما بالنسبة للصرف الصحى فسوف يزداد عدد سكان الحضر بدون خدمات للصرف الصحى من نحو ٢٥ مليون في عام ١٩٩٦ إلى نحو ١٤ مليون في عام ٢٠٢٠ (شكل رقم ١٠)، ومعظم هؤلاء من سكان المناطق العشوائية في المدن أو من سكان المراكز خاصة في محافظات الوجه القبلي. ولا يعني هذا أن المدن أو المناطق التي بها خدمات صرف صحى متصلة بمحطات معالجة. ففي مناطق كثيرة تقتصر خدمات الصرف الصحى على التوصيلات المنزلية وتقوم سيارات نزح المجارى بتفريغ بيارات التجميع من آن إلى آخر. وتقوم هذه السيارات عادة بتفريغ حمولتها في المناطق الصحراوية المجاورة للمدينة أو في المصارف الزراعية أو في المحيرات حسب الموقع الجغرافي للمدينة وقصر المسافة.

وسوف تزداد كسمية المخلفات البلدية الصلبة المتولدة في المناطق الحضرية من نحو ٢٤٢٩ طنا يوميا (٩,٨ مليون طن سنويا) في الوقت الحالى إلى نحو ١٦٠٠٠ طن يوميا (٤,٠٠ مليون طن سنويا) في عام ٢٠٠٠ (شكل رقم ١١)، نتيجة الزيادة السكانية في هذه المناطق بالإضافة إلى التغيرات المتوقعة في نوعية الحياة وأنماط الاستهلاك (الارتفاع التدريجي في معدلات الاستهلاك). وبذلك سوف تتعقد مشكلات إدارة المخلفات البلدية الصلبة خاصة في المدن الواقعة وسط الاراضي الزراعية، كما هو الحال في وسط الدلتا مثلا، لعدم توافر مساحات من الأراضي لإنشاء مقالب قمامة إضافية (أو مدافن صحية) لاستقبال الكميات المتزايدة من المخلفات. وبالرغم من الاتجاه إلى إسناد عمليات جمع القسمامة إلى شركات خاصة في بعض المدن وتشجيع هذه الشركات على العسمل في تدوير بعض مكونات المخلفات وتحويل المكونات العضوية إلى أسمدة، إلا أن منظومة جسمع ونقل وفرز وتدوير بعض مكونات المخلفات والدخلفات التبقية منظومة معقدة



شكل رقم (١٠): عدد سكان الحضر بدون توصيلات مياه أو بدون خدمات صرف صحى في السيناريو المرجعي



شكل رقم (١١): كمية المخلفات البلدية الصلبة في المناطق الحضرية

تتطلب دراسات متعمقة على مستوى كل مدينة لضمان أن تشمل عملية جمع المخلفات جميع أحياء المدينة ولا تقتصر فقط على الأحياء المغنية (كما هو الحال الآن)، ولتنمية عمليات تسويق مكونات المخلفات للتدوير وتسويق الأسمدة العضوية. بالإضافة إلى هذا تجدر الإشارة إلى أن المخلفات البلدية الصلبة ليست فقط مخلفات المنازل (القمامة بمفهومها الدارج) ولكنها تشمل أيضا مخلفات المحال التجارية والورش الصغيرة وهدم المبانى. كما تشمل مخلفات العيادات والمنشآت الطبية التى تتكون من مخلفات عادية (قمامة) ومن مخلفات طبية تتطلب معاملة خاصة حيث إنها من المخلفات الخطرة.

هذا وكما ذكرنا من قبل من المتوقع زيادة تلوث الهواء في معظم المناطق الحضرية خاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية، كما ستزداد الضوضاء وكثافة واختناقات المرور في معظم المدن نتيجة الزيادة السكانية وزيادة أعداد المركبات المختلفة، وسيساعد على تفاقم المشكلات في المناطق الحضرية استمرار غياب التخطيط العمراني على أسس بيئية سليمة. فبالرغم من وجود تشريعات مختلفة مثل قانون المتخطيط العمراني وقانون المرور والقوانيين المتعلقة بالمحلات المقلقة للراحة...إلخ، فإن هذه التشريعات لا تطبق. ففي الربع قرن الأخير تحولت مناطق سكنية هادئة في المقاهرة والإسكندرية وغيرها إلى مناطق نصف تجارية تمتلئ بالمحلات التجارية المختلفة والمكاتب والشركات. إلخ، بالرغم من تحريم وجود هذه المنشآت داخل هذه المناطق السكنية.

(٦) المشكلات البيئية في المناطق الريفية


طبقا للسيناريو المرجعى سوف يكون عدد سكان المناطق الريفية في عام ٢٠٢٠ نحو ٣٣ مليون نسمة مماثلا لعدد سكان هذه المناطق في ١٩٩٦. وهذا لا يعنى عدم الزيادة السكانية في المناطق الريفية، ولكن ثبات عدد السكان سيرجع إلى تحويل مناطق ريفية كثيرة إلى مناطق شبه حضرية وحضرية، فعدد من القرى سيتحول إلى مراكز، وعدد من المراكز سيتحول إلى مدن صغيرة. وكما سبق أن ذكرنا ستكون نسبة سكان الحضر في مصر في عام ٢٠٢٠ نحو ٣٣٪ (أي نحو ٥٦ مليون نسمة).

وهذا التغير في طبيعة المناطق الريفية قد يؤدى إلى بعض المؤشرات التي توحى بتحسن الأوضاع البيئية في المناطق الريفية في تلك المناطق الريفية هي أن الأوضاع البيئية في المناطق الريفية ستبقى على ما هي عليه الآن أو تسوء، لعدم توافر الاعتمادات اللازمة للخدمات الأساسية والتعامل مع القضايا البيئية في تلك المناطق. فعلى


سبيل المثال قدرت نسبة سكان الريف الذين لا تصل المياه إلى وحداتهم السكنية بنحو ٢٤٪، أى نحو ١٤ مليون نسمة فى ١٩٩٦. ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى ٣٥٪ نتيجة الجسهود الذاتية لبعض سكان الريف لتوصيل شبكات المياه إلى وحداتهم السكنية. وبذلك يصبح عدد من لا تصلهم مياه الشرب نحو ١٢ مليون نسمة. أما بالنسبة لخدمات الصرف الصحى فكانت نسبة من لا تصلهم هذه الخدمات ٣٨٪، أى نحو ٢٨ مليون نسمة فى ١٩٩٦. ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى ٧٠٪ فى عام ٢٠٢، وبذلك يصبح عدد سكان الريف الذين لا تصلهم خدمات الصرف الصحى نحو ٢٣ مليون نسمة (شكل رقم ١٢).

ومع التغيرات في أتماط الحياة والاستهلاك في المناطق الريفية من المتوقع زيادة توليد المخلفات المنزلية الصلبة (القمامة) من نحو ١٠٢٠ طن يوميا (٣,٩ مليون طن سنويا) في الوقت الحالى إلى نحو ١٦٥٠ طن يوميا (٦ مليون طن سنويا) في عام ٢٠٢٠ (شكل رقم ١٣). وستكون طرق التخلص من هذه المخلفات، في المغالب، كما هي عليه الآن (الحرق في المنازل أو خارجها، إلقاء المخلفات في الأراضي الفضاء وفي الترع والمصارف. المخلف ستتفاقم مشكلات التلوث الناجمة عن المخلفات الصلبة، مع الزيادة الملحوظة في كمياتها.

وبالرغم من أن برامج تنمية القرية الحالية قد عالجت بعض المشكلات بصورة جزئية، إلا أنه من غير المتوقع أن يؤدى ذلك إلى تغيرات جوهرية في الأوضاع البيئية. فمثلا من غير المحتمل أن يتم القضاء على بعض الأمراض البيئية (مثل البلهارسيا) مع حلول عام ٢٠٢٠. ومن المحتمل انتشار أمراض أخرى (مثل الملاريا) في بعض المناطق لزيادة المتلوث بها. كما لم تؤد برامج تنمية القرية إلى تحديث الزراعة وتنمية الصناعات الزراعية والقروية. إلى لتحسين حياة أهلها ودعم الستقرارهم، وبالتالي إلى القيام بدور فعال للحد من هجرة أهل الريف المؤقتة أو الدائمة إلى المناطق الحضرية أو إلى خارج البلاد (من المعروف أن زيادة الهجرة من الرباضي الزراعية خاصة المساحات العائلية الصغيرة في العديد من القرى، كما أدت زيادة الهجرة من الميفورة من الربيف إلى المدينة إلى تفاقم المشكلات الحضرية خاصة في المناطق العشوائية، إلى غير ذلك من مشكلات لها آثارها البيئية السلبية).



شكل رقم (۱۲): عدد سكان الريف بدون توصيلات مياه أو بدون خدمات صرف صحى في السيناريو المرجعي



شكل رقم (١٣): كمية المخلفات المنزلية الصلبة في المناطق الريفية

الخلاصة

إلى السيئاريو المرجعي مستسوء الأوضاع الشيشية في منصوه إذ إن الجنهود المتواضعة التي مصدل للحدوض التلوث وإهدار الموارد الطبيعية، لن تعاسب مع ربادة عدد السكان وزيادة استخدام الموارد المختلفة ومعدلات التنمية في قطاعات الصناعة والخدمات، ولن تقابلها الاستثمارات العامة والحاصة المناسة في مجال حماية البيئة اربرجم إحجام الحكومة عن الاستثمار في حماية البيئة إلى استمرار التركيز على الإصلاح الاقتصادي تمفهومه الضيق (ترشيد الإنفاق العام على الحدمات المختلفة لتحقيق الدوارن المالي، الانتهاء من المشروعات الكسرى . . ، إلخ) . أما في قطاع الأعسال فسوف تركيز الشركات التي تمت خصخصها على تعديل ارضاعها وتحقيق مكاسب سريعة، وتدوف تبقى أوضاع الشركات الآخري كما هي في انتظار خصخصتها (أي انها سوف لا تهتم لتدبير الأموال اللازمة للوقياق أوضاعها البيئية). أما الفطاع الحياص فشوف يعضى في سياسته الهادفة إلى تحقيق المكانب السريعة، وتعظيم هذه المكانب، ولو على حناب الاستخدام غير الرشيد للموارد المختلفة والمواد الاولية وللويث البيئة. ويرجع إحجام بعض الصناعات الخاصة عن الاستئصار في معالجة مشكلاتها البيئية إلى أن مضافعها من نوع المصالع السليم معتاح، وبذلك فإن أبة إجراءات تكنولوجية قد تنظلبها معالجة مشكلاتها البينية قد تستلزم إحداث تغيرات في الحزَّمُ التَّكُولُوجِيَّةً وَالْمُعْدَاتِ الْمُسْتُورُدَةً. وَهَذَّهُ قُدْ تُكُونُ عَمَّلَيَّةً مُكلفةً.

وبالرغم من ريادة الوعى البيئى وحسن النوايا، إلا أن كيل هذا لا يمكن ترجمته إلى تغيرات ملموسة في سلوكيات الأفيراد وإلى واقع عبلى للحد من النلوث وترشيد استخدام الموارد الطبيعية المختلفة، بدون توافر الاعتمادات المالية اللازمة، وبدون مراجعة شاملة للسياسات البئة الحالية، ورفع كفاءة الاجهزة المعنية بحماية البئة، ومراجعة الشريعات البئة المختلفة وتحديد اليات تنفيذها بدقة وحزم.

الفصل الثالث سيناريو الدولة الإسلامية

هذا السيناريو هو أحد السيناريوهات البديلة للسيناريو المرجعى ولقد أوردنا فى الفصل الأول من هذا الباب أهم ملامح هذا السيناريو كما افترضها مشروع مصر ٢٠٢٠. وفيما يلى نركز على بعض العوامل المهمة التى ستؤثر فى أوضاع البيئة المستقبلية:

- ـ رفض الحضارة والأساليب الغربية، وعدم الاندماج في العولمة.
- عدم تبنى سياسة للحد من النمو السكانى، ومن ثم قد تتراجع جهود تنظيم الأسرة بعض الشيء.
- _ الدعوة إلى مراعاة العدالة الاجتماعية من خلال إعطاء أولوية خاصة لإشباع الحاجات الأساسية.
- بذل جهد كبير في استخلاص دروس من التراث ومن الممارسات الإسلامية لتوجيه البحث العلمي والتطوير إلى مجالات مشجعة على الاقتصاد في استخدام الموارد الطبيعية والعناية بالبيئة وحفظ حق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية (أي الاتجاه نحو تحقيق التنمية المستدامة).
 - عدم إتاحة مجال واسع للمشاركة الشعبية.
- ـ قد يؤدى الاهتمام بالموارد الطبيعية والبيئة إلى ظهـور عدد من المشـروعات الصغيرة التي قد تشكل قطاع أعمال بيئي ناجح.
- وفى ضوء هذه المعالم الرئيسية نوجز فيما يلى التوقعات بالنسبة للمتغيرات الرئيسية، وأوضاع البيئة المترتبة على ذلك في عام ٢٠٢٠.

أولاً . النمو السكاني وتوزيع السكان

يفترض في سيناريو الدولة الإسلامية أنه سيحدث تراخى في جهود تنظيم الأسرة

الحالية، وبذلك سيتبع النمسو السكانى المتغيسر الأعلى الذى تفترضه الأمم المتسحدة (high variant scenario)، وفيه سيزداد عدد سكان مصر بمتوسط ١, ٢٪ سنويا حتى عام ٢٠٢٠، ليصبح عدد السكان قرابة ٩٩ مليون في عام ٢٠٢٠.

وفى حالة عدم زيادة المساحة المأهولة بالسكان (حاليا ٢٥٠٠٠ كيلومـتر مربع) سوف ترتفع الكثافة السكانيـة إلى حوالى ١٥٢٣ نسمة/كيلومترمـربع، مقارنة بنحو ٩٥٠٠ فى الوقت الحالى. وللحفاظ على الكثافة السكانيـة الحالية ينبغى زيادة المساحة المأهولة فى مصـر إلى نحو ١٠٤٨٢١ كيلومتـرا مربعًا، أى من ٢,٥٪ إلى ٥٠٠٪ من إجمالى مساحة مصر.

أما بالنسبة لتوزيع السكان بين الحضر والريف، فمن المتوقع أن يكون النمو السكانى في المناطق الحضرية بطيئا في سيناريو الدولة الإسلامية، بمتوسط نمو سنوى الا تقريبا حتى عام ٢٠٢٠ للحرص على تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الريف، بالإضافة إلى أن معدلات النمو الاقتصادي البطيئة وأنماطه في المناطق الحضرية سوف تقلل أو تحد من عناصر الجذب للهجرة من الريف إلى المدينة. ومن المتوقع أن تكون نسبة سكان الحضر في عام ٢٠٢٠ نحو ٤ ٥٣٠ ٪ من إجمالي عدد السكان في مصر.

ثانيًا.الحالة الاقتصادية

يفترض في سيناريو الدولة الإسلامية أن متوسط معدل النمو السنوى للناتج القومى الإجمالي سيكون في حدود ٥٪ حتى عام ٢٠٢٠ (أي سيكون أبطأ قليلا من معدل النمو في السيناريو المرجعي)، لانخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث إن هذا السيناريو لا يحبذ الانفتاح بدرجة كبيرة على الغرب، وسيركز على الإنفاق على تحسين الخدمات الأساسية، وتحقيق قدر من التنمية المستدامة. ويذلك سيكون الناتج القومي الإجمالي في عام ٢٠٢٠ أقل منه في السيناريو المرجعي، وستظل مصر من الدول متوسطة الدخل (شريحة منخفضة) طبقا لتقسيم البنك الدولي.

ومن المتوقع أن تكون مكونات الناتج المحلى الإجمالي كالتالى: زراعة ٢٥٪، صناعة ٣٤٪، وخدمات ٤١٪. أى أن حصة كل من الزراعة والصناعة ستكون أكبر من تلك في السيناريو المرجعي، بينما تنخفض حصة الخدمات، للتركيز في سيناريو الدولة الإسلامية على الزراعة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي في

المحاصيل الغذائية، وعلى الصناعة _ خاصة الصناعات الصغيرة والريفية _ لخفض معدلات البطالة والفقر.

ثالثا الموارد الطبيعية واستخدامها

(١) الأرض

من غير المتوقع حدوث تغيرات كبيرة في مساحة الأرض الزراعية في سيناريو الدولة الإسلامية عن تلك المتوقعة عام ٢٠٢٠ في السيناريو المرجعي، أي أن مساحة الأرض الزراعية في مصر عام ٢٠٢٠ ستكون في حدود ٢,٢ مليون فدان. ولكن مع الزيادة السكانية في سيناريو الدولة الإسلامية سينخفض نصيب الفرد من الأرض الزراعية إلى ٢٠٠٠ من الفدان مقارنة بنحو ٢٠٠٠ من الفدان في السيناريو المرجعي.

وسوف يهتم سيناريو الدولة الإسلامية بزراعة المحاصيل الأساسية لخفض العجز فى متطلبات المواد الغذائية الرئيسية. وستسود الزراعة التقليدية ذات المدخلات المحدودة وسيتم تشجيع الزراعة الإيكولوجية (أى خفض مدخلات الطاقة والكيماويات المستخدمة إلى أقل قدر ممكن). وسوف لا تجد زراعة المحاصيل بالتكنولوجيات الحديثة (الهندسة الوراثية مثلاً) مكانًا لها في هذا السيناريو.

من جهة أخرى، سوف تبذل جهود عملية متزايدة لصون الرقعة الزراعية والحد من فقد مساحات الأراضى الزراعية لاستخدامات أخرى، التعامل مع مشاكل تشبع الأرض بالمياه (تطبيل الأرض)، وتمليح الأرض، وتصحرها باستخدام تكنولوجيات وإجراءات ملائمة للأوضاع المحلية . . . إلخ، وذلك للحفاظ على استدامة التنمية الزراعية . ومن المتوقع أن يركز سيناريو الدولة الإسلامية على توسيع رقعة الأرض الزراعية باستصلاح مساحات من الأراضى على جانبى وادى النيل والدلتا، بدلا من المناطق النائية .

(٢) المياه

يوضح جدول رقم (١٧) تقديرات الطلب على المياه في سيناريو الدولة الإسلامية مقارنة بالوضع في ١٩٩٦. ويمكن تلخيص اتجاهات الطلب على المياه في التالى:

(أ) ستكون كمية المياه المسحوبة للرى مساوية للسيناريو المرجعي (٥٥ مليار متر مكعب في السنة) حيث إن مساحة الأرض الزراعية المتوقعة عام ٢٠٢٠ ستكون

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

متساوية (٢, ٩ مليون فدان)، وسوف لا تختلف طرق الرى كثيرًا عن تلك المتوقعة في السيناريو المرجعي. وسيكون الاختلاف أساسًا في التركيبة المحصولية وفي مصادر مياه الرى. ففي سيناريو الدولة الإسلامية ستكون هناك أولوية لزراعة المحاصيل التقليدية الأساسية، مما قد يؤدي إلى زيادة كميات المياه المسحوبة للرى. ونظرًا لأنه في سيناريو الدولة الإسلامية سيكون هناك تردد في استخدام مياه الصرف الزراعي في الرى لاختلاطها بالصرف الصحى (وبالتالي سيكون هناك تردد في استخدام هناك تردد في استخدام هذه المياه على رى الأشجار أو بعض الزراعات غير الغذائية المحدودة الستخدام هذه المياه على رى الأشجار أو بعض الزراعات غير الغذائية المحدودة (كما هو الحال في بعض الدول العربية). ومعنى هذا زيادة الضغوط في سيناريو الدولة الإسلامية على مصادر المياه الطبيعية (مياه نهر النيل والمياه الجوفية المتجددة والغير متجددة).

جدول رقم (١٧) جدول الدولة الإسلامية الاحتياجات المائية المتوقعة عام ٢٠٢٠ في سيناريو الدولة الإسلامية (مليار متر مكعب سنويا)*

الاستياجات حام ٢٠٢٠ (الدولة الإسلامية)	المياه المسحوية للاستخدام (١٩٩٦)	القطـــاع
٥٥,٠	0.,.	الرى
٦,٥	٥,٠	الصناعة
۹,۱	٤,٠	استخدامات منزلية / تجارية
۲,٠	۲,٠	استخدامات أخرى
٧٢,٦	11,.	الجملة
18,0	14,4	+ ۲۰٪ ناقد
۸۷,۱	٧٣,٢	الجملة

* قدرت الاحتياجات في عام ٢٠٢٠ طبقا للافتراضات التالية:

- مساحة الأرض الزراعية في عام ٢٠٢٠ نحو ٢٠٢ مليون فدان، تروى ٦ مليون منها بالطرق التقليدية (متوسط ٢٠٢٠ متر مكعب للفدان في السنة) وتروى ٢٠٣ مليون منها بالطرق الحديثة مثل الرش والتنقيط (متوسط ٢٠٠٠ متر مكعب في السنة).
 - ــ سيزداد معدل استخدام المياه في الصناعـــة بمتوسط سنوى قدره ٢ , ١ ٪ حتى عام ٢٠٢٠.
- سسوف يزداد استخدام ألمياً في القطاع المنزلي والتجاري بمعدل قدره ٥ , ١ ٪ سنويا حتى عام ٢٠٢٠ مع معدل سنوى في زيادة السكان قدره ١ , ٧ ٪.
 - الاستخدامات الأخرى مثل الملاحة... إلخ.
 - .. الفاقد يشمل البخر من المسطحات المائية والتسرب... إلخ.

- (ب) من المتوقع أن تكون كمية المياه المسحوبة للاستخدام في قطاع الصناعة أكبر قليلاً في سيناريو الدولة الإسلامية عنها في السيناريو المرجعي.
- (ج) ستكون كمية المياه المسحوبة للاستخدام في القطاع المنزلي والتحارى أكبر في سيناريو الدولة الإسلامية عنها في السيناريو المرجعي، لزيادة عدد السكان، وذلك بالرغم من الجهود الأكبر في التوعية لترشيد استخدام المياه.

وبذلك سينخفض نصيب الفرد من المياه المسحوبة للاستخدامات المختلفة في سيناريو الدولة الإسلامية إلى نحو ٧٣٣ مترا مكعبا /عام (مقارنة بنحو ٩٩٢ مترا مكعبا/عام في عام ١٩٩٦) نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد السكان. أي أن نصيب الفرد من المياه المسحوبة للاستخدامات المختلفة سيبقى أقل من مؤشر الضغط المائي وقيمته ١٠٠٠ متر مكعب/ فرد/عام. ومعنى هذا أن مصر ستواجه ضغطًا مائيا أكبر في سيناريو الدولة الإسلامية عنه في السيناريو المرجعي.

ولتخفيف هذا الضغط المائي سوف تتخذ بعض الإجراءات دون الأخرى:

- (أ) من غير المتسوقع أن يتجه سيناريو الدولة الإسلامية إلى استخدام مياه الصرف الزراعي أو الصرف الصحى المعالج في الرى، أو إحداث تغييرات في التركيبة المحصولية (مثل خفض المساحات المنزرعة بالأرز وغيره من المحاصيل) لتوفير المياه. ولكن سيتم التركيز على تحسين شبكات وطرق الرى وخفض الفاقد من المياه نتيجة التسرب وتوعية المزارعين بضرورات الاستخدام الأمثل للمياه، مع التوسع في استخدام المياه الجوفية المتجددة والغير متجددة.
- (ب) من غير المتـوقع أن يلجأ هذا السيناريو إلى تسـعير ميـاه الرى، أو زيادة أسعار المياه للأغراض المنزلية والتجارية.
- (ج) سيزيد هذا السيناريو من حملات التوعية بضرورة ترشيد استخدام المياه في جميع القطاعات وسيعمل على دعم وتشجيع تكنولوجيات تدوير المياه والحد من تلويثها.

(٣) الطاقة

يوضح جدول رقم (١٨) تقديرات احتياجات الطاقة الأولية التجارية في سيناريو الدولة الإسلامية في عام ٢٠٢٠ مقارنة بالسيناريو المرجعي والاستخدام الفعلي في عام ١٩٩٧. ومنه يتنضح أن الطلب على الطاقمة التجارية في سيناريو الدولة

الإسلامية سيكون أقل منه في السيناريو المرجعي، بالرغم من زيادة عدد السكان. ويرجع انخفاض الطلب على الطاقة إلى بطء معدلات النمو الاقتصادي مقارنة بالسيناريو المرجعي، وإلى انخفاض حصة الخدمات في الناتج المحلى الإجمالي (وبالتالي إلى انخفاض الطلب على الطاقة في قطاعات النقل والسياحة. . إلخ). هذا بالإضافة إلى أنه في سيناريو الدولة الإسلامية ستبذل جهود أكبر للتوعية بضرورة ترشيد استخدام الطاقة.

جدول رقم (١٨)
تقديرات احتياجات الطاقة الأولية في عام ٢٠٢٠ في سيناريو الدولة الإسلامية
(مليون طن نفط مكافئ)

	بشرول خام	خاڑ طبیعی	طالة مائية	نحم	إجمالى
1557	3,77	1.,7	۳, ۲	٠,٨	77,7
۲۰۲۰ (السيناريو المرجعي)	٤٨,٩	78,9	۲,0	1,1	119
٢٠٢٠ (الدولة الإسلامية)	7,70	01,0	٣,٨	۲,٥	118

- سيناريو الدولة الإسلامية: معدل الزيادة السنوى فى البترول = ٤٪. معدل الزيادة السنوى فى الغاز الطبيعي = ٧٪. معدل الزيادة السنوى فى الفحم = ٥٪.

ويوضح جدول رقم (١٨) نسبة كل من أنوع الطاقة الأولية المتوقع استخدامها في سيناريو الدولة الإسلامية، ومنه يتضح احتمالات انخفاض معدلات إحلال الغاز الطبيعي محل البترول في الاستخدامات المختلفة عن السيناريو المرجعي. ومن المتوقع في سيناريو الدولة الإسلامية أن يكون تصدير البترول الخام محدودًا (ربما عند مستوى عام ١٩٩٧) للحفاظ على الاحتياطي لسد الطلب المحلي لأطول فترة محكنة (أي إعطاء أولوية للاحتياجات المحلية). وسيكون تصدير الغاز الطبيعي محدودًا (في حدود ما تمليه الاتفاقيات مع الشريك الأجنبي، إذا لم تستطع الدولة شراء حصته أو جزء منها بسعر مقبول). أي أن تصدير البترول والغاز الطبيعي سيكون بحساب حرصًا على عدم استنزاف الموادد بسرعة.

ومن المتوقع أن يتم استغلال بعض مصادر الطاقة المتجددة (خاصة طاقة الشمس والرياح) في بعض الاستخدامات، خاصة في المناطق النائية والتجمعات السكانية الجديدة. ولكن ستبقى مساهمة مصادر الطاقة المتجددة متواضعة، في حدود مليون إلى ٢ مليون طن نفط مكافئ. ولا يستبعد في هذا السيناريو تنشيط البرنامج النووى

ومحاولة اتخاذ خطوات تنفيذية لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية. ولكن سيواجه هذا الاتجاه بعدة صعوبات سياسية واقتصادية وفنية، وقد لا يتحقق تقدم ملموس فيه قبل عام ٢٠٢٠.

ومن المتوقع أن يزداد طلب المفرد على الطاقة التجارية في سيناريو الدولة الإسلامية إلى ١٥٠ كيلوجرام نفط مكافئ/سنة مقارنة بنحو ٢٥٦ كيلوجرام نفط مكافئ سنة مقارنة بنحو ١٩٩٧ كيلوجرام نفط مكافئ/سنة في السيناريو المرجعي. وسترتفع نسبة استخدام الطاقة في قطاعات الصناعة والزراعة عنها في السيناريو المرجعي، وستنخفض نسبة استخدام الطاقة في قطاع النقل.

رابعا ـ حالة البيئة في ٢٠٢٠

يفترض في سيناريو الدولة الإسلامية أن سياسات البيئة ستركز على التعامل مع القضايا المحلية العاجلة (مثل الحد من تلوث المياه وإدارة المخلفات البلدية الصلبة والحد من الضوضاء وتلوث الهواء، بالإضافة إلى بذل جهود مكثفة للاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المختلفة). وستتخذ من المشاركة المكثفة للمحليات والتوعية العامة والمشاركة المتواضعة للجمعيات الأهلية مدخلاً لتنفيذ هذه السياسات ولكن سيكون الإنفاق العام على التعامل مع قضايا البيئة محدودًا وموجهًا لتوفير الخدمات الأساسية في المناطق العشوائية والريفية (خاصة توفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى لاكبر عدد ممكن من المناطق المحرومة).

أما من الناحية المؤسسية فمن المتوقع إعادة النظر في الأجهزة المعنية بشئون البيئة ومنحها صلاحيات أوسع مع التركيز على دور المحليات في التعامل مع القضايا البيئية التي تهم الجماهير. ومن الناحية التشريعية يتوقع إعادة النظر في تشريعات حماية البيئة وجعلها أكثر واقعية للتعامل مع المشكلات المحلية، مع تشديد العقوبات على المخالفين، وتحديد اليات أفضل للتنفيذ.

وفى ضوء ذلك يمكن تلخيص الأوضاع البيئية المتوقعة فى عام ٢٠٢٠ فى التالى: (١) تلوث الهواء

سوف تزداد أحمال الملوثات فى الهواء مقارنة بالوضع الحالى نتيجة لزيادة استخدام الطاقة الحفرية (البترول والغاد الطبيعى والفحم)، والنمو فى بعض الصناعات وريادة عدد المركبات (من المتوقع زيادة عدد المركبات المختلفة فى سيناريو

الدولة الإسلامية من حوالي ۲٫۷ مليون مـركبة موجـودة بالحركة في آخر ديســمبر ١٩٩٨ إلى نحو ٤٫٧ مليون مركبة في عام ٢٠٢٠).

ويوضح جدول رقم (١٩) تقديرات أحمال ملوثات الهواء في سيناريو الدولة الإسلامية، مقارنة بعام ١٩٩٧ وبالسيناريو المرجعي.

جدول رقم (١٩) على الموات الهواء في مصر في عام ٢٠٢٠ في سيناريو الدولة الإسلامية (بالألف طن)

	ثانی آکسید کبریت	أكاسيد نيتروجين	جسيمات عالقة	الهيدروكربونات
1997	A74	۲.0	0	71
۲۰۲۰ (السيناريو المرجعي)	1.4.	707	777.	77
٢٠٢٠ (الدولة الإسلامية)	178.	٤١٠	1	٤٣

* ـ تم حساب كميات ملوثات الهواء في عام ٢٠٢٠ على أساس خليط الطاقة المتوقع استخدامه (انظر جدول رقم ١٨)، وعلى أساس معدلات النمو الصناعى، وزيادة عدد المركبات الموجودة بالحركة. _ ـ تم تخفيض كمية الملوثات بنحو ٣٠٪ حيث إن الصناعات الجديدة التي ستنشأ والمركبات الجديدة التي ستستورد ستكون مصممة من قبل الشركات الأجنبية المنتجة لها مراعية الشروط البيئية بحيث ستنبعث منها أقل كمية محكنة عمليا من الانبعاثات المختلفة. هذا بالإضافة إلى أن بعض الصناعات الحالية ستتخذ بعض الإجراءات للحد من انبعاث الملوثات منها، كما أنه يتوقع أن تترك الحركة أعدادا متزايدة من المركبات القديمة الملوثة للبيئة.

ومعنى هذا أن تركيزات الملوثات فى الهواء سوف تكون أعلى فى سيناريو الدولة الإسلامية منها فى السيناريو المرجعى. وترجع هذه الزيادة أساسًا إلى استخدام كميات أكبر من البترول والفحم، وكميات أقل من الغاز الطبيعى فى سيناريو الدولة الإسلامية عنه فى السيناريو المرجعى. (من المعروف أن البترول والفحم أكثر تلويثًا للبيئة من الغاز الطبيعى).

وستكون تركيزات ملوثات الهواء في عدد كبير من المناطق الحضرية أعلى من معايير منظمة الصحة العالمية، خاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية، وذلك بالرغم من الإجراءات المختلفة لوضع رقابة حازمة على الانبعاثات من المركبات المختلفة والحد من انبعاثات الملوثات من عدد من الصناعات. وفي ضوء الزيادة المتوقعة في عدد سكان الحضر يقدر أن عدد السكان الذين سيتعرضون لتركيزات غير صحية لملوثات الهواء في سيناريو الدولة الإسلامية سيكون في حدود ٢٤ مليون

نسمة ، مقارنة بنحو ٢٠ مليونا فى السيناريو المرجعى ، وذلك بالرغم من أن عدد سكان الحضر فى السيناريو المرجعى أكبر منه فى سيناريو الدولة الإسلامية (٥٦ مليون نسمة و٥٣ مليون نسمة على التوالى). ويرجع هذا إلى ارتفاع أحمال التلوث فى سيناريو المدولة الإسلامية عنه فى السيناريو المرجعى ، أى وجود انتشار أوسع لتلوث الهواء . وبذلك من المتوقع زيادة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى وحالات الوفاة المبكرة عنها فى ١٩٩٧ أو فى السيناريو المرجعى .

وكما هو الحال فى السيناريو المرجعى سوف تظهر مشكلات عدد من الملوثات الأخرى (المركبات العفوية) نتيجة التوسع فى استخدام المنتجات البترولية خاصة الديزل.

من جهة أخرى سوف تزداد انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى في سيناريو الدولة الإسلامية، وتقدر كمية ثانى أكسيد الكربون المتوقع انبعاثها في عام ٢٠٠٠ بنحو ٢٦٠ مليون طن. وتقدر كمية غاز الميثان التي ستنبعث بنحو ٢٠٠٠ ألف طن. وستظل نسبة انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى أقل من ١٪ من الانبعاثات في العالم (من المتوقع أن تنخفض الانبعاثات في الدول المتقدمة إلى مستوى عام المعالم (من المتوقع أن تنخفض الانبعاثات في الدول النامية لزيادة معدلات استخدام الطاقة الحفرية فيها). وربحا تؤدى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى على المستوى العالمي الحي ارتفاع طفيف في درجة الحرارة في عام ٢٠٢٠، يصاحبه ارتفاع محدود في مستوى سطح البحر. وقد يؤدى هذا إلى غمر بعض الأراضي المنخفضة في شمال الدلتا. (لاحظ أن هذا الاحتباس الحرارى واحتمال ارتفاع درجات الحرارة ظاهرة عالمية وذلك لأن ظاهرة الاحتباس الحرارى واحتمال ارتفاع درجات الحرارة ظاهرة عالمية تتوقف على كميات غازات الاحتباس الحرارى التي ستنبعث على المستوى العالمي).

(٢) تلوث المياه

فى سيناريو الدولة الإسلامية سوف تستمر عمليات صرف المخلفات السائلة فى نهر النيل وفروعه بطريق مباشر أو غير مباشر (عن طريق المصارف التى تصب فى نهر النيل أو الترع الرئيسية أو عن طريق عمليات نزح المخلفات وتفريغها فى الترع والمصارف). ومن المتوقع أن تكون الصورة فى عام ٢٠٢٠ كالتالى:

استـمرار الصـرف الزراعي (نحو ٤٠٠٠ مليـون متر مكعب) في نهـر النيل في
 الوجه القبلي بين أسوان والقاهرة.

- * انخفاض في كمية الصرف الصحى غير المعالج المنصرف في النيل بطريق مباشر وغير مباشر في الوجه القبلي إلى ما يقرب من ١٠٠٠ مليون متر مكعب في السنة، لتكثيف الجهود لمد خدمات الصرف الصحى إلى المناطق العشوائية في المدن وإلى العديد من المناطق الريفية. ولزيادة الوعى وحث الجماهير من منطلق ديني على عدم تلويث المياه.
- سوف تنخفض عمليات صرف المخلفات الصناعية في نهر النيل وفروعه بدرجة ملحوظة لاتخاذ الصناعات لإجراءات بديلة لصرف مخلفاتها.
- * لا يتوقع أن تسوء نوعيـة مياه النيل عما هي عليه الآن، للحد من صـرف كميات من المخلفات السائلة فيه بطريق مباشر أو غير مباشر.
- * من المتوقع حدوث تغيرات في نوعية مياه نهر النيل الواردة إلى بحيرة ناصر من الجنوب. فدول حوض نهر النيل سوف تشهد زيادة سكانية كبيرة حتى عام الجنوب، بالإضافة إلى إقدام معظم هذه الدول على عمليات تنمية زراعية وصناعية. وسوف يؤدى ذلك إلى صرف كميات متزايدة من المخلفات السائلة في نهر النيل بطريق مباشر وغير مباشر؛ مما ستكون له آثار كبيرة على نوعية المياه الواردة إلى البحيرة.
- * من المتوقع أن تبقى الأوضاع البيئية الحالية في بحيرات شمال الدلتا كما هي عليه الآن أو تتحسن قليلا، وذلك لخفض صرف المخلفات السائلة فيها.

(٣) المناطق الساحلية والبيئة البحرية

من المتوقع في عام ٢٠٢٠ أن يزداد صرف المخلفات السائلة في البيئة البحرية شمال الدلتا (صرف صحى ومخلفات صناعية) نتيجة النمو السكاني والتنمية الصناعية في المناطق الساحلية. وبالرغم من الجهود المبذولة لمعالجة بعض المخلفات (سواء بإنشاء بعض المحطات لمعالجة الصرف الصحى أم بقيام بعض الصناعات بإنشاء وحدات لمعالجة مخلفاتها السائلة) سوف تزداد أحمال الملوثات التي ستجد طريقها إلى المناطق الساحلية والبيئة البحرية. كما ستؤدى عمليات تكثيف استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في هذه المناطق وفي الرصيف القارى شمال الدلتا إلى صرف عدة ملوثات (خاصة مخلفات عمليات حفر الآبار الاستكشافية وآبار الإنتاج ومخلفات عمليات الإنتاج. . إلخ) في البيئة البحرية والمناطق الساحلية. وسيساعد على تدهور البيئة الساحلية في شمال الدلتا احتمالات غمر بعض المناطق الساحلية

المنخفضة بمياه البحر. وسوف يؤدى هذا إلى آثار سلبية على نوعية المياه الجوفية الساحلية بزيادة ملوحتها وتلوثها. كما سيؤثر على إنتاجية الأراضى الزراعية في هذه المناطق الهامشية الحساسة بيئيا. ومن المتوقع أن يزداد التدهور البيئي في منطقة خليج السويس بعد إنشاء المجمعات الصناعية المختلفة، والتي ستقوم بصرف مخلفاتها في البحر مباشرة (بعضها غير معالج أو معالج جزئيا).

كذلك ستتعرض المناطق الساحلية لضغوط متزايدة نتيجة زيادة عدد الزوار الموسميين والسائحين. وسوف لا تقابل التوسعات الكبيرة في الطاقة الفندقية والتجمعات السكنية (القرى السياحية) في هذه المناطق بتوسعات موازية في البنية والخدمات الأساسية، مما سيؤدي إلى تجاوز القدرات الاستيعابية لها في بعض المواقع. فعلى سبيل المثال سوف تزداد الضغوط على محطات مياه الشرب وعلى محطات معالجة الصرف الصحى. وقد يؤدى هذا إلى قيام بعض المنشــآت بصرف مخلفاتها غيــر المعالجة أو المعالجة جزئيا في البيئة البـحرية، بما سيكون له آثار سلبية على نوعية مياه الاستحمام في بعض الشواطئ. كذلك ستؤدى هذه الضغوط إلى إيجاد مشكلات متزايدة في إدارة المخلفات الصلبة (القمامة)، وتلوث الهواء نتيجة زيادة كثافة المرور في المنتجعات السياحية. وبالإضافة إلى هذا ستؤدى الزيادة في الأنشطة البحرية الترفيهية (الرياضات البحرية، الغوص، وغيرها) إلى آثار سلبية على نوعية مياه بعض الشواطئ (على سبيل المشال أدت الكثافة المتزايدة للنشات وغيرها من المركبات السبحرية الترفيهية إلى زيادة تركينزات الهيدروكربونات والزيوت في بعض المناطق الساحليــة في شرم الشيخ والغردقــة نتيجة تســرب الوقود والزيوت منها)، بالإضافة إلى إلحاق بعض الأضرار بالشعاب المرجانية والموارد الساحلية التي هي في الواقع أساس الجذب السياحي والترفيهي الساحلي.

(٤) تدهور التربة والتصحر

يقدر متوسط ما يفقد من الأراضى الزراعية لاستخدامات أخرى (مثل تشييد الطرق وأعمال البنية الأساسية الأخرى والمساكن. . . إلخ) منذ عام ١٩٩٠ بنحو ٢٥ الف فدان سنويا. وستبذل في سيناريو الدولة الإسلامية جهود كبيرة للحد من فقدان الأراضى الزراعية لاستخدامات غير زراعية (البنية الأساسية والمباني. . . إلخ)، وذلك بالحزم في تنفيذ القوانين التي تحد أو تمنع استخدام الأراضى الزراعية في غير الإنتاج الزراعي. كذلك ستبذل جهود كبيرة لتوفير الخدمات الأساسية في المدن والمجتمعات الجديدة لتشجيع الانتقال إليها والإقامة فيها.

كذلك سيكون هناك حرص فى سيناريو الدولة الإسلامية على عدم تجاوز قدرات تحمل الأراضى الزراعية وذلك باستخدام أساليب للزراعة أكثر ملائمة لقدرات الأرض والبيئة. كما سيكون هناك اهتمام بإعادة تأهيل الأرض التى تدهورت إنتاجيتها (أى التى أصابها التشبع بالمياه أو التمليح. . إلخ)، وذلك باستخدام تكنولوجيات ملائمة للأوضاع المحلية.

(٥) المشكلات البيئية في المناطق الحضرية

سوف تؤدى الزيادة الكبيرة فى عدد سكان الحيضر فى عام ٢٠٢٠ إلى تفاقم المشكلات البيئية فى المدن المختلفة، خاصة فى المناطق العشوائية فيها. ولكن من المتوقع أن يزداد الاهتمام بمشكلات هذه المناطق فى سيناريو الدولة الإسلامية. وبالرغم من المجهودات التى ستبذل فى هذا الصدد سوف يكون هناك فى عام ٢٠٢٠ نحو ٧,٣ مليون نسمة لا تصل إلى مساكنهم مياه الشرب، وهو نصف العدد المتوقع فى السيناريو المرجعى (جدول رقم ٢٠). ومع المتغيرات التى ستحدث فى نوعية الحياة فى المناطق الحضرية من المتوقع زيادة الطلب على المياه من نحو ٣٣٥ لترا/ فرد/ يوم فى عام ٢٠٢٠، أى الترا/ فرد/ يوم فى عام ٢٠٢٠، أى

جدول رقم (۲۰) تقديرات أعداد سكان الحضر الذين لا تتصل وحداتهم السكنية بشبكات المياه في عام ۲۰۲۰

	مدد السكان بدون تو الشرب (بالملي	عدد سكان الحضر (يالمليون)	
10,8	į	77	1447
18,4	٨	۲۵	۲۰۲۰ (السيناريو المرجعي)
7.v	۳,۷	97	٢٠٢٠ (الدولة الإسلامية)

أما بالنسبة لخدمات الصرف الصحى فسوف تنخفض نسبة السكان بدون خدمات صرف صحى فى سيناريو الدولة الإسلامية من ٢٥,٤٪ فى ١٩٩٦ إلى ١٠٪ فى عام ٢٠٢٠، (جدول رقم ٢١). وهمى نسبة أقل بكثير من تلك فى السيناريو المرجعى.

جدول رقم (٢١) تقديرات سكان الحضر بدون خدمات صرف صحى في سيناريو الدولة الإسلامية

الثسبة المئوية لعدد السكان بدون خدمات صرف صمحى	عدد السكان بدون خدمات صرف صحی(بالملیوں)	حدد سكان الحضر (بالمليون)	
7.70, 8	1,1	77	1997
7.40	18, .	۵٦	۲۰۲۰ (السيناريو المرجعي)
٪۱۰	۵,۳	٥٣	٢٠٢٠ (الدولة الإسلامية)

وسوف تزداد كمية المخلفات البلدية الصلبة المتولدة في المناطق الحضرية من نحو ٢٤٢٩٠ طنا يوميا (٨,٩ مليون طن سنويا) في الوقت الحالي إلى نحو ٢٤٢٩٠ طن يوميا (١٧,٤ مليون طن سنويا) في عام ٢٠٢٠ (جدول رقم ٢٢)، نتيجة الزيادة السكانية في هذه المناطق بالإضافة إلى التغيرات المتوقعة في نوعية الحياة وأنحاط الاستهلاك (الارتفاع التمدريجي في معدلات الاستهلاك). وبذلك سوف تتعقد مشكلات إدارة المخلفات البلدية الصلبة خاصة في المدن الواقعة وسط الأراضي الزراعية، كما هو الحال في وسط الدلتا مثلا، لعدم توافر مساحات من الأراضي لإنشاء مقالب قمامة إضافية (أو مدافن صحية) لاستقبال الكميات المتزايدة من المخلفات.

ومن المنتظر أن يشجع سيناريو الدولة الإسلامية استخدام العبوات التي ترد (أي إعادة استخدام العبوات، خاصة زجاجات المشروبات) وبالتالي إحداث بعض التغييرات في تعبئة المنتجات وحث قطاعات الصناعة والتجارة والأفراد على تخفيض كميات المخلفات الصلبة المتولدة. كما سيتم تشجيع عمليات تدوير بعض مكونات المخلفات.

جدول رقم (٢٢) كمية المخلفات البلدية الصلبة المتوقعة في المناطق الحضرية

كمية المسخلفات البلاية المسلبة (مليون طن/ سنة)	
۸,٩	1997
٤٠,٤	۲۰۲۰ (السيناريو المرجعي)
١٧,٤	٢٠٢٠ (سيناريو الدولة الإسلامية)

هذا وكما ذكرنا من قبل من المتوقع زيادة تلوث الهواء في معظم المناطق الحضرية خاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية، كما ستزداد الضوضاء وكثافية واختناقات المرور في معظم المدن نتيجة الزيادة السكانية وزيادة أعداد المركبات المختلفة.

(٦) المشكلات البيئية في المناطق الريفية

طبقا لسيناريو الدولة الإسلامية سوف يكون عدد سكان المناطق الريفية في عام ٢٠٢٠ نحو ٤٦ مليون نسمة أى أكثر منه في السيناريو المرجعي. وكما ذكرنا من قبل سيسعي سيناريو الدولة الإسلامية إلى تحسين الأوضاع البيئية، خاصة بالعمل على إمداد المناطق الريفية بالخدمات الأساسية، وفي مقدمتها مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى. فعلى سبيل المثال قدرت نسبة سكان الريف الذين لا تصل المياه المي وحداتهم السكنية بنحو ٢٤٪، أى نحو ١٤ مليون نسمة في عام ١٩٩٦. ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى ١٠٪ بحلول عام ٢٠٢٠ (جدول رقم ٢٣).

جدول رقم (٢٣) تقديرات أعداد سكان الريف الذين لا تنصل وحداتهم السكنية بشبكات المياه في عام ٢٠٢٠

النسبة المثوية لعدد السكان بدون توصيلات مياه	حدد السكان بدون توصيلات لمياه الشرب (بالمليون)	حدد سكان الريف (بالمليون)	
7.27	18	77	1997
7.40	14	44	۲۰۲۰ (السيئاريو المرجعي)
7.1.	1,7	٤٦	٢٠٢٠ (الدولة الإسلامية)

أما بالنسبة لخدمات الصرف الصحى فكانت نسبة من لا تصلهم هذه الخدمات الاسبة لخدمات الصرف المسرف الصحى فكانت نسبة من لا تصلهم هذه الخدمات النسبة إلى ٣٩٪ في عام ٢٠٢٠، وبذلك يصبح عدد سكان الريف الذين لا تصلهم خدمات الصرف الصحى نحو ١٨ مليون نسمة (جدول رقم ٢٤).

جدول رقم (٢٤) تقديرات أعداد سكان الريف بدون خدمات صرف صحى في سيناريو الدولة الإسلامية

النسبة المثوية لعدد السكان بدون خدمات صرف صحى	عدد السكان بدون خدمات صرف صحى(بالمليون)	صدد سکان الریف (بالملیون)	
% ^*	۸۲	th.	1997
7.v ·	77	۲۲	۲۰۲۰ (السيناريو المرجعي)
7.44	14	٤٦	٢٠٢٠ (الدولة الإسلامية)

ومع التغييرات في أنماط الحياة والاستهلاك في المناطق الريفية من المتوقع زيادة توليد المخلفات المنزلية الصلبة (القمامة) من نحو ١٠٢٠٠ طن يوميا (٩,٣ مليون طن سنويا) في الوقت الحالى إلى نحو ١٣٧٠ طن يوميا (٥ مليون طن سنويا) في عام ٢٠٢٠ (جدول رقم ٢٥). وستكون طرق التخلص من هذه المخلفات، في المغالب، كما هي عليه الآن (الحرق في المنازل أو خارجها، إلقاء المخلفات في الأراضي الفضاء وفي الترع والمصارف. والمنازل أو خارجها، إلقاء المخلفات في

جدول رقم (٢٥) كمية المخلفات المنزلية الصلبة المتوقعة في المناطق الريفية

كمية المخلفات النزلية الصلبة (مليون طز/ سنة)	
۳,۹	1997
١,٠	۲۰۲۰ (السيناريو المرجعي)
٥,٠	٢٠٢٠ (سيناريو الدولة الإسلامية)

وبالرغم من أن برامج تنمية القرية الحالية قد عالجت بعض المسكلات بصورة جزئية، إلا أنه من المتوقع أن تكثف الجهود في سيناريو الدولة الإسلامية لإحداث تغيرات جوهرية في الأوضاع البيئية في المناطق الريفية في بعض الاتجاهات. فمثلا من المحتمل أن يتم القضاء على بعض الأمراض البيئية (مثل البلهارسيا) مع حلول عام ٢٠٢٠. ومن المحتمل أن توجه برامج تنمية القرية إلى تحديث الزراعة وتنمية الصناعات الزراعية والقروية. إلخ لتحسين حياة أهلها ودعم استقرارهم، ومن ثم للحد من هجرة أهل الريف المؤقية أو الدائمة إلى المناطق الحضرية أو إلى خارج البلاد (من المعروف أن زيادة الهجرة من الريف أدت إلى ظهور مشكلات متنوعة في العمالة الزراعية، وإلى إهمال وتدهور الأراضي الزراعية خاصة المساحسات العائلية الصغيرة في العديد من القرى، كما أدت زيادة الهجرة من الريف إلى المدينة إلى تفاقم المشكلات الحضرية خاصة في المناطق العشوائية، إلى غير ذلك من مشكلات لها آثارها البيئية السلبية. وبذلك قد يساعد سيناريو الدولة الإسلامية على الحد من هذه المشكلات).

الفصل الرابع سيناريو الرأسمالية الجديدة

هذا السيناريو بديل آخر للسيناريو المرجعى. ولقد أوردنا فى الفصل الأول من هذا الباب أهم ملامح هذا السيناريو كما افترضها مشروع مصر ٢٠٢٠. وفيما يلى نركز على معالم هذا السيناريو التى ستؤثر فى أوضاع البيئة المستقبلية:

- * ضرورة السير في تيار العولمة.
- الحداث طفرة كبيرة في قطاع البحث العلمي والتكنولوجيا ونقل واستيعاب وتطويع التكنولوجيا الوافدة.
 - * تبنى برنامج لخفض معدل النمو السكاني.
- * تتولى الدولة في هذا السيناريو مشروعات البنية الأساسية والمشروعات ذات الطابع الإستراتيجي وغيرها مما يعتقد أن القطاع الخاص غير قادر على إقامته، أو مما ترى أن اعتبارات الأمن القومي تحبذ وجوده في يسد الدولة. وقد تتم عملية مراجعة الخصخصة بقصد تأجيل خصخصة بعد المشروعات أو بقصد استبعاد بعضها.
 - * لا تلقى قضية الفقر وعدالة التوزيع اهتمامًا يذكر في بداية هذا السيناريو.
 - * لا يتوقع أن يقدم هذا السيناريو الكثير في مجال تأصيل مفهوم التنمية المستدامة.
 - * سوف تنشط المحليات ويزداد دورها في إدارة وحماية البيئة.
- * من المتوقع أن يتبلور قطاع أعمال بيثى كمجال جيد للاستثمار وكأساس للمساعدة في إيجاد مزايا تنافسية لبعض المنتجات المصرية.
- * قد يتضمن هذا السيناريو منهجًا مختلفًا في تعريف بعض الموارد وفي تحديد اقتصادياتها. ولا يستبعد اللجوء إلى تسعير بعض الموارد (مثل المياه) لترشيد استخدامها.

وفى ضوء هذه المعالم الرئيسية نوجز فيما يلى التوقعات بالنسبة للمتغيرات الرئيسية، وأوضاع البيئة المترتبة على ذلك في عام ٢٠٢٠.

أولأ النمو السكاني وتوزيع السكان

يفترض في سيناريو الرأسمالية الجديدة أنه سيحدث تنشيط ملحوظ في جهود تنظيم الأسرة، وبذلك سيتبع النمو السكاني المتغير الأدنى (low variant scenario) الذي تفترضه الأمم المتحدة، وفيه سيزداد عدد سكان مصر بمتوسط ٣٠١٪ سنويا حتى عام ٢٠٢٠، ليصبح عدد السكان قرابة ٨٦ مليونا في عام ٢٠٢٠.

وفى حالة عدم زيادة المساحة المأهولة بالسكان (حساليا ٢٥٠٠٠ كيلومتر مربع) سوف ترتفع الكثافة السكانية إلى حوالى ١٢٦٢ نسمة/كيلومترمريع، مقارنة بنحو ٩٥٠ فى الوقت الحالى. وللحفاظ على الكثافة السكانية الحالية ينبغى زيادة المساحة المأهولة فى مصر إلى نحو ٨٦٣٤٧ كيلومترا مربعا، أى من ٦,٥٪ إلى ٦,٥٪ من إجمالى مساحة مصر.

أما بالنسبة لتوزيع السكان بين الحضر والريف، فمن المتوقع أن يكون النمو السكانى فى المناطق الحفرية سريعًا، بمتوسط نمو سنوى ٢٪ تقريبا حتى عام ١٠٢٠، لارتفاع معدلات النمو الاقتصادى خاصة فى قطاعات الخدمات المتركزة فى المناطق الحضرية مما سيتيح فرص عمل مختلفة (خاصة الأعمال اليدوية التى لا تتطلب خبرات أو مهارات خاصة أو مستويات مرتفعة من التعليم)، مما سيشجع على المهجرة المتزايدة من الريف الذى تتدنى فيه الأجور ونوعية الحياة. ومن المتوقع أن تكون نسبة سكان الحضر فى عام ٢٠٢٠ نحو ٥,٥٠٪ من إجمالى عدد سكان مصر.

ثانيًا.الحالة الاقتصادية

يفترض في سيناريو الرأسمالية الجديدة أن متوسط معدل النمو السنوى للناتج المقدومي الإجمالي سيكون مرتفعا، في حدود ٢٠٢٠ حتى عام ٢٠٢٠ وذلك لاعتماد هذا السيناريو بدرجة كبيرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعلى قوى السوق وفتح الباب أمام القطاع الخاص في كافة مجالات الاستثمار (خاصة في تصنيع المنتجمات الاستهملاكية وفي قطاعات الخدمات). والشاغل الرئيسي لهذا السيناريو سيكون تحقيق نمو اقتصادي سريع، ولو على حساب النمية الاجتماعية الشاملة أو التنمية المستدامة. فهذا السيناريو يفترض أن النمو

الاقتصادى سيــؤدى تلقائيا فى يوم من الأيام إلى تحقيق التنمية الاجتــماعية الشاملة. ومن المتوقع فى هذا السيناريو اتســاع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وبــين مستويات وأنماط الحياة فى المناطق الحضرية والريفية.

وبذلك سيكون الناتج القومى الإجمالى فى عام ٢٠٢٠ أكبر منه فى السيناريو المرجعى، وستظل مصر من الدول متوسطة الدخل، ولكنها ستنتمى إلى الشريحة المرتفعة، طبقا لتقسيم البنك الدولى. ومن المتوقع أن تكون مكونات الناتج المحلى الإجمالى فى عام ٢٠٢٠ كالتالى: زراعة ١٨٪، صناعة ٣٠٪، وخدمات ٥٢٪.

ثالثاء الموارد الطبيعية واستخدامها

(١) الأرض

من غير المتوقع حدوث تغيرات كبيرة في مساحة الأرض الزراعية في سيناريو الرأسمالية الجديدة عن تلك المتوقعة عام ٢٠٢٠ في السيناريو المرجعي، أي أن مساحة الأرض الزراعية في مصر عام ٢٠٢٠ ستكون في حدود ٩,٢ مليون فدان. ومع بطء معدلات الزيادة السكانية في سيناريو الرأسمالية الجديدة سيكون نصيب الفرد من الأرض الزراعية في ٢٠٢٠ نحو ١١,٠ من الفدان، مقارنة بنحو ١٠,٠ من الفدان في السيناريو المرجعي.

وسوف يهتم سيناريو الرأسمالية الجديدة بزراعة محاصيل التصدير، خاصة تلك التي ستزرع في الأراضى الجديدة المستصلحة (مثل شمال سيناء ومنطقة توشكى). ومن المتوقع أن يؤدى تكثيف الزراعة لإنتاج محاصيل التصدير إلى زيادة استخدام الطاقة والكيماويات الزراعية (الأسمدة والمبيدات)، وذلك بالرغم من بعض الجهود لتشجيع الزراعة الإيكولوجية لفتح مزيد من الأسواق الخارجية خاصة في ضوء الشروط والمعايير البيئية التي تضعها الدول المستوردة للمنتجات الخذائية. وسوف يعمل هذا السيناريو على تشجيع زراعة المحاصيل بالتكنولوجيات الحديثة (الهندسة الوراثية مثلاً).

وفى سيناريو الرأسمالية الجديدة قد تؤدى عمليات تكثيف الزراعة إلى تجاوز قدرات تحمل بعض الأراضى الزراعية، خاصة فى المناطق المستصلحة التى تتم فى معظمها زراعة محاصيل التصدير، مما سينتج عنه تدهور التربة الزراعية وانخفاض إنتاجيتها، وبالتالى احتمال تحويل مساحات متزايدة منها لاستخدامات غير الإنتاج الزراعى.

(٢) المياه

يوضح جدول رقم (٢٦) تقديرات الطلب على المياه في سيناريو الرأسمالية الجديدة مقارنة بالوضع في عام ١٩٩٦. ويمكن تلخيص اتجاهات الطلب على المياه في التالي:

(†) ستكون كمية المياه المسحوبة للرى مساوية للسيناريو المرجعي (٥٥ مليار متر مكعب في السنة) حيث إن مساحة الأرض الزراعية المتوقعة عام ٢٠٢ ستكون متساوية (٢, ٩ مليون فدان). وسوف لا تختلف طرق الرى كثيرًا عن تلك المتوقعة في السيناريو المرجعي. وسيكون الاختلاف أساسًا في التركيبة المحصولية وفي مصادر مياه الرى. ففي سيناريو الرأسمالية الجديدة سيحدث توسع في استخدام المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي والصحى المعالج في الرى.

جدول رقم (٢٦)
الاحتياجات الماثية المتوقعة عام ٢٠٢٠ في سيناريو الرأسمالية الجديدة
(مليار متر مكعب سنويا)*

الاحتياجات عام ٢٠٢٠ (الراسمالية الجديدة)	المياه المسحوية للاستخدام (١٩٩٦)	القطيباع
00,.	۵٠,٠	الرى
۳,۲	٥,٠	المبناعة
4,1	٤,٠	استخدامات منزلية/ تجارية
۲,۰	٧,٠	ستخدامات أخرى
YY,9	71,.	الجملة
18,7	۱۲,۲	+ ۲۰٪ فاقد
۸٧,٥	٧٣,٢	الجملة
		ĺ

* قدرت الاحتياجات في عام ٢٠٢٠ طبقا للافتراضات التالية:

- ـ مساحة الأرض الزراعية في ٢٠٢٠ نحو ٢, ٩ مليون فدان، تروى ٢ مليون منها بالطرق التقليدية (متوسط ٧٥٠٠ متر مكعب للفدان في السنة) وتروى ٢, ٣ مليون منها بالطرق الحديثة مثل الرش والتنقيط (متوسط ٣٠٠٠ متر مكعب في السنة).
 - ـ سيزداد معدل استخدام المياه في الصناعة بتوسط سنوى قدره ١٪ حتى عام ٢٠٢٠.
- ـ سوف يزداد استخدام المياه في القطاع المنزلي والتجاري بمعدل قدره ٥, ٧٪ سنويا حتى عام ٢٠٢٠، مع معدل سنوي في زيادة السكان قدره ١,١٪.
 - الآستخدامات الأخرى مثل الملاحة... إلخ.
 - الفاقد يشمل البخر من المسطحات المائية والتسرب... إلخ.

- (ب) من المتوقع أن تكون كمية المياه المسحوبة للاستخدام في قطاع الصناعة مماثلة لتلك في السيناريو المرجعي.
- (ج) ستكون كمية المياه المسحوبة للاستخدام فى القطاع المنزلى والتجارى أكبر فى سيناريو الرأسمالية الجديدة عنها فى السيناريو المرجعى، وذلك لزيادة عدد سكان المناطق الحضرية وللتغيرات الكبيرة فى أنماط الاستهلاك ونوعية الحياة.

وبذلك سينخفض نصيب الفرد من المياه المسحوبة للاستخدامات المختلفة فى سيناريو الرأسمالية الجديدة إلى نحو ٨٨٨ مترا مكعبا /عام (مقارنة بنحو ٩٩٢ مترا مكعبا/عام فى عام ١٩٩٦). أى أن نصيب الفرد من المياه المسحوبة للاستخدامات المختلفة سيبقى أقل من مؤشر الضغط المائى وقيمته ١٠٠٠ متر مكعب/فرد/عام. ومعنى هذا أن مصر ستواجه ضغطا مائيا متزايدًا فى سيناريو الرأسمالية الجديدة.

ولتخفيف هذا الضغط المائي سوف تتخذ بعض الإجراءات، أهمها:

- (أ) التوسع فى استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج فى الرى، وإحداث تغييرات فى التركيبة المحمولية (مثل خفض المساحات المنزرعة بالأرز وغيره من المحاصيل) لتوفير المياه.
- (ب) العمل على الانتهاء من عـدد من المشروعات المشتركة لتنميـة موارد مياه النيل، مثل الانتهاء من تنفيذ مشروع قناة جونجلي.
- (جـ) التوسع في استغلال المياه الجوفية غير المتجددة في الرى في المناطق المستصلحة حديثًا.
- (د) الاتجاه إلى تسعير مياه الرى، بطريق مباشر أو غير مباشر، وذلك للحصول على إيرادات لتنفيذ بعض مشروعات إدارة المياه. وقد يؤدى هذا إلى ترشيد استخدام المياه في بعض المناطق المستصلحة عن طريق استخدام طرق للرى أكثر كفاءة. ولتفادى صعوبات تسعير مياه الرى في الأراضي القديمة في الدلتا ووادى النيل، سوف يتجه هذا السيناريو إلى تنفيذ ذلك بطريق غير مباشر بفرض رسوم استخدام مياه عامة على كل فدان من الأرض الزراعية وزيادة هذه الرسوم تدريجيا.

(٣) الطاقة

يوضح جدول رقم (٢٧) تقديرات احتياجــات الطاقة الأولية التجارية في سيناريو

الرأسمالية الجديدة في عام ٢٠٢٠ مقارنة بالسيناريو المرجعي والاستخدام الفعلى في عام ١٩٩٧. ومنه يتضح الزيادة الكبيرة في الطلب على الطاقة التجارية في سيناريو الرأسمالية الجديدة، لارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في هذا السيناريو، بالإضافة إلى زيادة استهلاك الفرد للطاقمة نتيجة التغيرات في مستويات المعيشة وأنماط الحياة (بالرغم من النمو السكاني البطيء في سيناريو الرأسمالية مقارنة بالسيناريو المرجعي).

جدول رقم (۲۷) تقديرات احتياجات الطاقة الأولية في عام ٢٠٢٠ في سيناريو الرأسمالية الجديدة (مليون طن نفط مكافئ)

إجمالى	فحم	طاقة مائية	غاز طبیعی	بترول خام	البيئة
77,V	٠,٨	٣,٢	1.,4	3,77	1997
111	1,1	٣,٥	78,9	٤٨,٩	۲۰۲۰ (السيناريو المرجعي)
171	۲,0	٣,٨	46,7	۱۳,۱	٢٠٢٠ (الرأسمالية الجديدة)

- سيناريو الرأسمالية الجديدة: معدل الزيادة السنوى فى البترول = 0, 2, معدل الزيادة السنوى فى الغاز الطبيعى = 0, 0, معدل الزيادة السنوى فى الفحم = 0,

ويوضح جدول رقم (٢٧) نسبة كل من أنواع الطاقة الأولية المتوقع استخدامها في سيناريو الرأسمالية الجديدة، ومنه يتضح التوسع في استخدام الغاز الطبيعي لتوفير كميات متزايدة من البترول للتصدير. ومن المتوقع التوسع في تصدير الغاز الطبيعي بافتراض أن البرامج المكثفة للاستكشاف سوف تؤدى إلى اكتشاف حقول جديدة للغاز لتزيد من الاحتياطات في المستقبل. ولكن مع عدم زيادة الاحتياطي بدرجة كبيرة، من المتوقع أن يؤدي هذا السيناريو إلى تآكل احتياطات مصر المؤكدة من البترول والغاز الطبيعي بسرعة. وستواجه مصر مشكلات في موارد البترول بحلول عام ٢٠٠٧، ومشكلات في موارد الغاز الطبيعي في حوالي عام ٢٠٠٧.

ومن المتوقع أن يتم استغلال بعض مصادر الطاقة المتجددة (خاصة طاقة الشمس والرياح) في بعض الاستخدامات، خاصة في المناطق النائية والتجمعات السكانية الجديدة. ولكن ستبقى مساهمة مصادر الطاقة المتجددة متواضعة، في حدود مليون إلى ٢ مليون طن نفط مكافئ. ولا يستبعد في هذا السيناريو التفكير في إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، ولكن سوف لا يتحقق تقدم في هذا المجال قبل عام ٢٠٢٠.

ومن المتوقع أن يزداد طلب الفرد على الطاقة التجارية في سيناريو الرأسمالية الجديدة إلى نحو ١٩٥٠ كيلوجرام نفط مكافئ سنة مقارنة بنحو ١٩٥٠ كيلوجرام نفط مكافئ سنة في السيناريو المرجعي.

رابعا ـ حالة البيئة في ٢٠٢٠

يفترض في سيناريو الرأسمالية الجديدة أن سياسات البيئة ستكون بماثلة إلى حد كبير لتلك في السيناريو المرجعي (انظر الفصل الثاني)، ولكن ستبذل منشآت مختلفة جهوداً أكبر لتوفيق أوضاعها البيئية لتحسين صورتها ومسايرة المتطلبات البيئية التي تضعها الدول المستوردة للمنتجات المختلفة، أو تلك التي تشترطها الدول في بعض الحدمات (مثل الحدمات السياحية). أي أن حماية البيئة ستترك أساساً لاتجاهات وقوى السوق. وسيحاول هذا السيناريو أن يتخذ من التوعية العامة والمشاركة المتواضعة للجمعيات الأهلية مدخلاً لتنفيذ سياسات حماية البيئة. وسوف يتراجع الإنفاق العام على التعامل مع قضايا البيئة بحجة إسناد هذه المهمة للقطاع الخاص أو (Polluter-pays Principle).

أما من الناحية المؤسسية، فمن غير المتوقع إعادة النظر في الأجهزة المعنية بشئون البيئة. وسوف تظل أجهزة «تنسيقية» تنقصها الصلاحيات التنفيذية والرقابية. ومن الناحية التشريعية سيزداد تشابك التشريعات البيئية وآليات التنفيذ مما سيؤدى إلى استمرار الوضع الحالى الذي يتسم بضعف تطبيق التشريعات البيئية، وتفشى عمليات الانتقاء في التطبيق، والتركيز على الموضوعات التي لا تهم الجماهير العريضة.

وفى ضوء ذلك يمكن تلخيص الأوضاع البيئية المتوقعة فى عام ٢٠٢٠ فى التالى: (١) تلوث الهواء

سوف تزداد أحمال الملوثات فى الهواء مقارنة بالوضع الحالى نتيجة لزيادة استخدام الطاقة الحفرية (البترول والغاز الطبيعى والفحم)، والنمو فى بعض الصناعات وزيادة عدد المركبات (من المتوقع زيادة عدد المركبات المختلفة فى سيناريو الرأسمالية الجديدة من حوالى ٢,٧ مليون مركبة موجودة بالحركة فى آخر ديسمبر ١٩٩٨ إلى نحو ٦,٥٠ مليون مركبة فى عام ٢٠٢٠).

ويوضح جدول رقم (٢٨) تقديرات أحمال ملوثات الهواء في سيناريو الرأسمالية الجديدة، مقارنة بعام ١٩٩٧ وبالسيناريو المرجعي.

جدول رقم (٢٨) تقديرات أحمال ملوثات الهواء في مصر في عام ٢٠٢٠ في سيناريو الرأسمالية الجديدة (بالألف طن)*

الهيدروكربونات	جسيمات عالقة	أكاسيد نيتروجين	ثانى أكسيد كبريت	السنة
*1	0	7.0	A74	1997
YV	177.	YOV	1.9.	۲۰۲۰ (السيناريو المرجعي)
71	Y - 14	79.	1774	٢٠٢٠ (الرأسمالية الجديدة)

* ـ تم حساب كميات ملوثات الهواء في ٢٠٢٠ على أساس خليط الطاقة المتوقع استخدامه (انظر جدول رقم ٢٧)، وعلى أساس معدلات النمو الصناعي، وزيادة عدد المركبات الموجودة بالحركة. _ تم تخفيض كمية الملوثات بنحو ٣٠٪ حيث إن الصناعات الجديدة التي ستنشأ والمركبات الجديدة التي ستنشورد ستكون مصممة من قبل الشركات الأجنبية المتبخة لها مراعية الشروط البيئية بحيث ستنبعث منها أقل كمية محكنة عمليا من الانبعاثات المختلفة. هذا بالإضافة إلى أن بعض الصناعات الحالية ستنجذ بعض الإجراءات للحد من انبعاث الملوثات منها، كما أنه يتوقع أن تترك الحركة أعدادا منزايدة من المركبات القديمة الملوثة للبيئة.

ومعنى هذا أن تركيزات الملوثات فى الهواء سوف تكون أعلى قليلاً فى سيناريو الرأسمالية الجديدة منها فى السيناريو المرجعي. وترجع هذه الزيادة أساسًا إلى استخدام كميات أكبر من الطاقة الحفرية.

وستكون تركيزات ملوثات الهواء في عدد كبير من المناطق الحضرية أعلى من معايير منظمة الصحة العالمية، خاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية، وذلك بالرخم من الإجراءات المختلفة لوضع رقابة على الانبعاثات من المركبات المختلفة والحد من انبعاثات الملوثات من عدد من الصناعات. وفي ضوء الزيادة المتوقعة في عدد سكان الحضر يقدر أن عدد السكان الذين سيتعرضون لتركيزات غير صحية لملوثات الهواء في سيناريو الرأسمالية الجديدة سيكون في حدود ٢٦ مليون نسمة، وذلك بالمقارنة بنحو ٢٠ مليونا في السيناريو المرجعي، نظراً لزيادة عدد سكان الحضر. وبذلك من المتوقع زيادة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وحالات الوفاة المبكرة عنها في عام ١٩٩٧ أو في السيناريو المرجعي، وكما هو الحال في السيناريو المرجعي سوف تظهر مشكلات عدد من الملوثات الأخرى (المركبات العضوية) نتيجة الموسع في استخدام المنتجات البترولية خاصة الديزل.

من جهة أخــرى، سوف تزداد انبعاثات غــازات الاحتباس الحــرارى فى سيناريو الرأسمالية الجديدة، وتقدر كمية ثانى أكــسيد الكربون المتوقع انبعاثها فى عام ٢٠٢٠

بنحو ٢٦٠ مليون طن، مماثلة لتلك في سيناريو الدولة الإسلامية، وذلك بالرغم من أن كمية الطاقة المتوقع استخدامها في سيناريو الرأسمالية الجديدة أكبر بكثير من تلك في سيناريو الدولة الإسلامية. ويرجع هذا إلى أن كمية ثانى أكسيد الكربون المنبعثة تتوقف على أنواع الطاقة الحفرية المستخدمة في كل سيناريو. فالبرغم من أنه في سيناريو الرأسمالية الجديدة ستكون احتياجات الطاقة أكبر، إلا أن نسبة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة ستكون مرتفعة (كمية ثانى أكسيد الكربون المنبعثة من الغاز الطبيعي أقل من تلك المنبعثة من البترول أو الفحم بالنسبة للوحدة الحرارية). وتقدر كمية غاز المينان التي ستنبعث في سيناريو الرأسمالية الجديدة بنحو ٩٠ ألف طن نتيجة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي. وستظل نسبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أقل من ١٪ من الانبعاثات في العالم (وكما سبق ذكره، من المتوقع أن تمنخفض الانبعاثات في الدول المتقدمة إلى مستوى عام ١٩٩، بينما تزداد الانبعاثات في الدول النامية لزيادة معدلات استخدام الطاقة الحفرية فيها).

وربما تؤدى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى على المستوى العالى إلى ارتفاع طفيف فى درجة الحرارة فى عام ٢٠٢٠، وقد يصاحبه ارتفاع محدود فى مستوى سطح البحر. وقد يؤدى هذا إلى غمر بعض الأراضى المنخفضة فى شمال الدلتا (وكما ذكرنا سابقًا، لا يتوقف هذا على أى من السيناريوهات المذكورة لأن ظاهرة الاحتباس الحرارى واحتمال ارتفاع درجات الحرارة ظاهرة عالمية تتوقف على كميات غازات الاحتباس الحرارى التى ستنبعث على المستوى العالمي).

(٢) تلوث المياه

فى سيناريو الرأسمالية الجديدة سوف تستمر عمليات صرف المخلفات السائلة فى نهر النيل وفروعه بطريق مباشر أو غير مباشر (عن طريق المصارف التى تصب فى نهر النيل أو الترع الرئيسية أو عن طريق عمليات نزح المخلفات وتفريغها فى الترع والمصارف). ومن المتوقع أن تكون الصورة فى عام ٢٠٢٠ كالتالى:

- # استـمرار الصـرف الزراعي (نحو ٤٠٠٠ مليـون متر مكعب) في نهـر النيل في الوجه القبلي بين أسوان والقاهرة.
- * انخفاض فى كمية الصرف الصحى غير المعالج المنصرف فى النيل بطريق مباشر وغير مباشر فى الوجه القبلى إلى ما يقرب من ١٣٠٠ مليون مستر مكعب فى السنة، نتيجة لبعض الجهود المبذولة (خاصة الجهود الأهلية) لمد خدمات الصرف الصحى إلى بعض المدن والقرى.

- * سوف تنخفض عمليات صرف المخلفات الصناعية في نهر النيل وفروعه بدرجة ملحوظة لاتخاذ الصناعات لإجراءات بديلة لصرف مخلفاتها.
- * لا يتوقع أن تسوء نوعية مياه النيل عما هي عليه الآن، وذلك للحد من صرف
 كميات من المخلفات السائلة فيه بطريق مباشر أو غير مباشر.
- * من المتوقع حدوث تغيرات فى نوعية مياه نهر النيل الواردة إلى بحيرة ناصر من الجنوب. فدول حوض نهر السيل سوف تشهد زيادة سكانية كبيرة حتى عام ٢٠٢٠ وذلك بالإضافة إلى إقدام معظم هذه الدول على عمليات تنمية زراعية وصناعية. وسوف يؤدى ذلك إلى صرف كميات متزايدة من المخلفات السائلة فى نهر النيل بطريق مباشر وغير مباشر، مما ستكون له آثار كبيرة على نوعية الميا الواردة إلى البحيرة.
- * من المتوقع أن تبقى الأوضاع البيئية الحالية في بحيرات شمال الدلتا كما هي عليه الآن أو تتحسن قليلا، وذلك لخفض صرف المخلفات السائلة فيها.

(٣) المناطق الساحلية والبيئة البحرية

من المتوقع في عام ٢٠٢٠ أن يزداد صرف المخلفات السائلة في البيئة البحرية شمال الدلتا (صرف صحى ومخلفات صناعية) نتيجة النمو السكاني والتنمية الصناعية في المناطق الساحلية. وبالرغم من الجهود المبلولة لمعالجة بعض المخلفات (سواء بإنشاء بعض المحطات لمعالجة الصرف الصحى أم قيام بعض الصناعات بإنشاء وحدات لمعالجة مخلفاتها السائلة) سوف تزداد أحمال الملوثات التي ستجد طريقها إلى المناطق الساحلية والبيئة البحرية. كما ستؤدى عمليات تكثيف استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في هذه المناطق وفي الرصيف القاري شمال الدلتا إلى صرف عدة ملوثات (خاصة مخلفات عمليات حفر الآبار الاستكشافية وآبار الإنتاج ومخلفات عمليات الإنتاج . . إلخ) في البيئة البحرية والمناطق الساحلية . وسيساعد على تدهور البيئة الساحلية في شمال الدلتا احتمالات غمر بعض المناطق الساحلية المنخفضة بمياه البحر . وسوف يؤدي هذا إلى آثار سلبية على نوعية المياه الجوفية الساحلية بزيادة ملوحتها وتلوثها ، كما سيؤثر على إنتاجية الأراضي الزراعية في هذه المناطق الهامشية الحساسة بيئيا . ومن المتوقع أن يزداد التدهور البيئي في منطقة خليج السويس بعد إنشاء المجمعات الصناعية المختلفة والتي ستقوم بصرف مخلفاتها في البحر مباشرة (بعضها غير معالج أو معالج جزئيا).

كذلك ستتعرض المناطق الساحلية لضغوط متزايدة نتيجة زيادة عدد الزوار الموسميين والسائحين. وسوف لا تقابل التوسيعات الكبيرة في الطاقة الفندقية والتجمعات السكنية (القرى السياحية) في هذه المناطق بتوسعات موازية في البنية والخدمات الأساسية، مما سيودى إلى تجاوز القمدرات الاستيعابية لها في بعض المواقع. فعلى سبيل المثال سوف تزداد الضغوط على محطات مياه الشرب وعلى محطَّات معالجة الصرف الصحى. وقد يؤدى هذا إلى قيام بعض المنشــآت بصرف مخلفاتها غيـر المعالجة أو المعالجة جزئيًا في البيئة البـحرية، مما سيكون له آثار سلبية على نوعية مياه الاستحمام في بعض الشواطئ. كذلك ستؤدى هذه الضغوط إلى إيجاد مشكلات متزايدة في إدارة المخلفات الصلبة (القمامة)، وتلوث الهبواء نتيجة زيادة كثافة المرور في المنتجعات السياحية. وبالإضافة إلى هذا ستؤدي الزيادة في الأنشطة البحرية الترفيهية (الرياضات البحرية، الغوص، وغيرها) إلى آثار سلبية على نوعية مياه بعض الشواطئ. على سبيل المثال، أدت الكثافة المتزايدة للنشات وغيرها من المركبات السبحرية الترفيهية إلى زيادة تركيزات الهيدروكربونات والزيوت في بعض المناطق الساحليـة في شرم الشيخ والغردقـة نتيجة تســرب الوقود والزيوت منها، وذلك بالإضافة إلى إلحاق بعض الأضرار بالشعاب المرجانية والموارد الساحلية التي هي في الواقع أساس الجذب السياحي والترفيهي الساحلي.

(٤) تدهور التربة والتصحر

يقدر متوسط ما يفقد من الأراضى الزراعية لاستخدامات آخرى (مثل تشييد الطرق وأعمال البنية الاساسية الأخرى والمساكن... إلنج) منذ عام ١٩٩٠ بنحو ٢٥ ألف فدان سنويا. وبالرغم من القوانين التى تحد أو تمنع استخدام الأراضى الزراعية في غير الإنتاج الزراعي، فيسوف يستسمر في سيناريو الرأسمالية الجديدة فيقدان مساحات متزايدة من هذه الأراضى لضرورات التوسع في البنية الاساسية والمساكن والخدمات العامة لمواجهة الزيادة السكانية خاصة في دلتا نهر النيل وواديه، وذلك بالرغم من بذل بعض الجمهود لتحسين الأوضاع في المدن والمجتمعات الجديدة وجعلها مناطق جذب للسكان. ولكن سيحيد من هذا الاتجاه التركيز على إنشاء ولمناطق والمدن السكنية «السوبر» التي تلبي أساسا المتطلبات الترفيهية هالك في المناطق والمدن المربحة من أغنياء المجتمع. ومعني هذا استمرار أوضاع مشابهة لتلك في السيناريو المرجعي.

وبالإضافة إلى فقدان مساحات من الأراضي الزراعية سوف يؤدى تكثيف الزراعة

خاصة فى الأراضى المستصلحة إلى زيادة تدهور مساحات متزايدة منها، وبالتالى إلى انخفاض إنتاجيتها، وتصحرها فى النهاية، مما قد يؤدى إلى تحويلها لأغراض أخرى غير الإنتاج الزراعى. فهذه الأراضى تعتبر من الأراضى الهشة إيكولوجيا، ولها قدرات تحمل محدودة إذا ما تم تجاوزها انهارت نظمها الإيكولوجية، وتحولت إلى أراض غير منتجة يصعب استصلاحها مرة أخرى.

ومع عدم إحداث تغيرات جذرية فى أنماط الرى الحالية، هناك احتمال كبير لزيادة تشبع مساحات متزايدة من الأراضى الزراعية، خاصة المستصلحة، بالمياه (أى تطبيلها) وزيادة ملوحتها لانعدام أو عدم كفاءة شبكات الصرف فيها. كما أن هناك احتمالا لزيادة ملوحة بعض الأراضى فى شمال الدلتا، نتيجة تقدم مياه البحر على اليابسة فى بعض المناطق المنخفضة، مما سيؤدى إلى زيادة ملوحة المياه الجوفية المستخدمة فى الرى فى تلك المناطق.

(٥) المشكلات البيئية في المناطق الحضوية

سوف تؤدى السزيادة الكبيسرة في عدد سكان الحيضر في عام ٢٠٢٠ إلى تفاقم المشكلات البيئية في المدن المختلفة، خاصة في المناطق العشوائية فيها. في من غير المتوقع أن تقابل الزيادة السكانية في المناطق الحضرية بالاستثمارات المناسبة في البنية الأساسية والخدمات الرئيسية. وبالرغم من بعض الجهود التي ستبذل في هذا الصدد (أساسا من قبل القطاع الأهلي) سوف يكون هناك في عام ٢٠٢٠ نحو ٤,٥ مليون نسمة لا تصل إلى مساكنهم مياه الشرب (جدول رقم ٢٩). ومع التغيرات التي ستحدث في نوعية الحياة في المناطق الحضرية من المتوقع زيادة الطلب على المياه من نحو ٣٠٥ لترا/ فرد/يوم في عام ٢٠٢٠.

جدول رقم (۲۹) تقديرات أعداد سكان الحضر الذين لا تتصل وحداتهم السكنية بشبكات المياه في عام ۲۰۲۰

النسبة المغربة لعدد السكان بدرن توصيلات مياه	حدد السكان بدون توصيلات لمياه الشرب (بالمليون)	حدد سکان الحضر (بالملیون)	
7.10, 8	٤	*1	1197
7.18,4	٨	07	۲۰۲۰ (السيناريو المرجعي)
7.5.	1,4	0 {	٢٠٢٠ (الرأسمالية الجديدة)

أما بالنسبة لخدمات الصرف الصحى فسوف تنخفض نسبة السكان بدون خدمات صرف صحى فى سيناريو الرأسمالية الجديدة من ٢٥,٥٪ فى عام ١٩٩٦ إلى ١٤,٨٪ فى عام ٢٠٢٠ (جدول رقم ٣٠)، وهى نسبة أقل من تلك فى السيناريو المرجعى.

وسوف تزداد كمية المخلفات البلدية الصلبة المتولدة في المناطق الحضرية من نحو ٨١٠٠٠ طنا يوميا (٩, ٨ مليون طن سنويا) في الوقت الحالي إلى نحو ٢٤٢٩٠ طن يوميا (٢, ٦ مليون طن سنويا) في عام ٢٠٢٠ (جدول رقم ٣١)، نتيجة الزيادة السكانية في هذه المناطق بالإضافة إلى التغيرات المتوقعة في نوعية الحياة وأنماط الاستهلاك (التحول إلى مجتمعات استهلاكية شبيهة بالمجتمعات الغربية). وبذلك سوف تتعقد مشكلات إدارة المخلفات البلدية الصلبة خاصة في المدن الواقعة وسط الأراضي الزراعية، كما هو الحال في وسط الدلتا مثلا، لعدم توافر مساحات من الأراضي لإنشاء مقالب قمامة إضافية (أو مدافن صحية) لاستقبال الكميات المتزايدة من المخلفات.

جدول رقم (٣٠) تقديرات سكان الحضر بدون خدمات صرف صحى في سيناريو الرأسمالية الجديدة

النسبة المثوية لعدد السكان بدون خدمات صرف صحي	حلد السكان بدون خدمات صرف صحى (بالمليون)	حدد سكان الحيضر (بالمليون)	
%Y0. £	1,1	*1	1997
%Y0	١٤, -	٥٦	۲۰۲۰ (السيناريو المرحمي)
%\£,A	۸,٠	ρξ	۲۰۲۰ (الرأسمالية الجديدة)

جدول رقم (٣١) كمية المخلفات البلدية الصلبة المتوقعة في المناطق الحضرية

كمية المخلفات البلدية الصلبة (مليون طن/ سنة)	
۸,٩	1997
Y - , £	۲۰۲۰ (السيناريو المرجعي)
74,7	۲۰۳۰ (الراسمالية الجديدة)

ومن المنتظر أن يركز سيناريو الرأسمالية الجديدة على الحلول التكنولوجية في إدارة المخلفات البلدية الصلبة (مثل الدفن الصحى والحرق. . إلخ)، وسوف تخضع عمليات جمع ونقل وفرز وتدوير بعض مكونات المخلفات لقوى السوق.

هذا وكما ذكرنا من قبل من المتوقع زيادة تلوث الهواء في معظم المناطق الحضرية خاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية، كما ستزداد الضوضاء وكثافة واختناقات المرور في معظم المدن نتيجة الزيادة السكانية وزيادة أعداد المركبات المختلفة.

(٦) المشكلات البيئية في المناطق الريفية

طبقا لسيناريو الرأسمالية الجديدة سوف يكون عدد سكان المناطق الريفية في عام ٢٠٢٠ نحو ٢٨ مليون نسمة أى أقل منه في السيناريو المرجعي. ومن غير المتوقع أن تبذل جهود أكبر من تلك في السيناريو المرجعي لتحسين أوضاع البيئة في المناطق الريفية، وبذلك سوف تظل الأوضاع كما هي عليه الآن أو تسوء. ولكن ستبذل بعض الجهود (خاصة من قبل القطاع الأهلي) لتوفير توصيلات مياه الشرب إلى الوحدات السكنية وكذلك خدمات الصرف الصحى. وبذلك فإنه من المتوقع أن تتخفض نسبة السكان الذين لا تتصل وحداتهم السكنية بشبكات المياه من ٤٢٪ في عام ٢٠٢٠ (جدول رقم ٣٢).

جدول رقم (٣٢) تقديرات أعداد سكان الريف الذين لا تتصل وحداتهم السكنية بشبكات المياه في عام ٢٠٢٠

	هدد سكان الريف (يالليون)	حدد السكان بدون توصيلات لمياه الشرب (بالمليون)	النسبة المثوية لعدد السكان بدون توحيلات مياه
1997	77	18	%£Y
۲۰۲۰ (السيناريو المرجعي)	74	14	7.40
۲۰۲۰ (الراسمالية الجديدة)	**	7,0	٧٢.

أما بالنسبة لخدمات الصرف الصحى فكانت نسبة من لا تصلهم هـذه الخدمات ٨٣٪ في ١٩٩٦. ومن المتـوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى ٦٠٪ في عام ٢٠٢٠، وبذلك يصبح عدد سكان الريف الذين لا تصلهم خدمات الصرف الصحى نحو ١٧ مليون نسمة (جدول رقم ٣٣).

جدول رقم (٣٣) تقديرات أعداد سكان الريف بدون خدمات صرف صحى

النسبة المثوية لعدد السكان بدون خدمات صرف صحى	عدد السكان بدون خدمات صرف صحى (بالليون)	عدد سكان الريف (بالليون)	
% AT	7.4	77	1997
/.v ·	YA	44	۲۰۲۰ (السيناريو المرجعي)
7.3.	14	44	٢٠٢٠ (الرأسمالية الجديدة)

ومع التغيرات في أتماط الحياة والاستهلاك في المناطق الريفية من المتوقع زيادة توليد المخلفات المنزلية الصلبة (القمامة) من نحو ١٠٢٠٠ طن يوميا (٩,٣ مليون طن سنويا) في الوقت الحالى إلى نحو ٢٨٠٠ طن يوميا (١٠,١ مليون طن سنويا) في عام ٢٠٢٠ (جدول رقم ٣٤). وستكون طرق التخلص من هذه المخلفات، في الغالب، كما هي عليه الآن (الحرق في المناول أو خارجها، إلقاء المخلفات في الأراضي الفضاء وفي الترع والمصارف. ولخ)، وذلك بالرغم من المخلفات لحيه ودات التي ستبذل في بعض الوحدات المحلية القروية في بعض المحافظات لجمع ونقل القمامة والتخلص منها في بعض المناطق الصحراوية المجاورة (في الوجه القبلي مثلا).

جدول رقم (٣٤) كمية المخلفات المنزلية الصلبة المتوقعة في المناطق الريفية

كمية المخلفات المنزلية الصلبة (مليون طن/ سنة)	
٣,٩	1997
٦,٠	۲۰۲۰ (السيناريو المرجعي)
1.,7	۲۰۲۰ (الراسمالية الجديدة)

هذا ومن غير المحتمل أن تبذل جهود إضافية للقضاء على بعض الأمراض البيئية (مثل البلهارسيا) بحلول عام ٢٠٢٠. ومع احتمال تدهور الأوضاع البيئية في بعض المناطق الريفية قد نظهر أمراض أخرى، مثل الملاريا وغيرها. كذلك من غير المحتمل أن توجه برامج تنمية المقرية إلى تحديث الزراعية وتنمية الصناعات الراعية والقروية . إلى لتحسين حياة أهلها ودعم استقرارهم، ومن ثم للحد من هجرة أهل الريف المؤقتة أو الدائمة إلى المناطق الحضرية أو إلى خارج البلاد.

الفصل الخامس سيناريو الاشتراكية الجديدة

هذا السيناريو هو بديل ثالث للسيناريو المرجعى. ولقد أوردنا فى الفصل الأول من هذا الباب أهم ملامح هذا السيناريو كما افترضها مشروع مصر ٢٠٢٠. وفيما يلى نركز على بعض العوامل المهمة التى ستؤثر فى أوضاع البيئة المستقبلية:

- * يقع على الدولة العبء الأكبر في رصاية وتنظيم وتمويل النهضة العلمية والتكنولوجية، وكذلك في وضع الضوابط على نقل التكنولوجيا (وبخاصة من زاوية تشغيل العمالة واستهلاك الطاقة وتلويث البيئة).
- * تركز السياسات السكانية على إعادة توزيع السكان جغرافيا، لا على الحد من النمو السكانى، وذلك باعتبار أن ديناميكيات خفض الخصوبة قد اكتسبت قوة دفع ذاتية.
- * يرفض هذا السيناريو الانصياع للعولمة ومن ثم يرفض الانفتاح غير المتكافئ على الأسواق الخارجية، مثلما يرفض تحرير الاقتصاد وإطلاق قوى السوق.
 - * القضاء على الفقر من الأمور التي تحظى بأولوية كبرى في هذا السيناريو.
- * الحرص على تعظيم الموارد المتاحة للتنمية وتوجيه جهود كبيرة لتفادى هدر وضياع الموارد الطبيعية.
- ** تشجيع المشروعـات الصغيرة على الدخول في مجال البيـئة وتكوين قطاع أعمال بيئي يساند جهود الدولة في الحفاظ على البيئة.
- * قد يترتب على الأولوية المعطاة لإشباع الحاجات الأساسية والقضاء العاجل على
 الفقر وتعميق التصنيع التغاضى عن بعض الهموم البيئية بعض الوقت.
- وفى ضوء هذه المعالم السرئيسية، نوجز فسيما يلى التوقعات بالنسبة للمتغيرات الرئيسية، وأوضاع البيئة المترتبة على ذلك في عام ٢٠٢٠.

أولأ النمو السكاني وتوزيع السكان

يفترض في سيناريو الاشتراكية الجديدة أن المعدل السنوى للنمو السكاني سيكون كما هو في السيناريو المرجعي، أى سيتبع النمو السكاني المتغير الأوسط nedian) (variant scenario) الذي تفترضه الأمم المتحدة، وفيه سيزداد عدد سكان مصر عتوسط ٥٥,١٪ سنويا حتى عام ٢٠٢٠، ليصبح عدد السكان قرابة ٨٩ مليونا في عام ٢٠٢٠.

وفى حالة عدم زيادة المساحة المأهولة بالسكان (حاليا ٢٥٠٠٠ كيلومتر مربع) سوف ترتفع الكثافة السكانية إلى حوالى ١٣٦٩ نسمة/كيلومترمربع، مقارنة بنحو ٩٥٠ فى الوقت الحالى. وللحفاظ على الكثافة السكانية الحالية ينبغى زيادة المساحة المأهولة فى مصر إلى نحو ٩٣٦٦٨ كيلومترا مربعا، أى من ٩,٥٪ إلى ٩,٤٪ من اجمالى مساحة مصر.

أما بالنسبة لتوريع السكان بين الحضر والريف، فمن المتوقع أن يكون النمو السكانى فى المناطق الحضرية بطيئا فى سيناريو الاشتراكية الجديدة، بمتوسط نمو سنوى ١٪ تقريبا حتى عام ٢٠٢٠، للحرص على تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فى الريف، بالإضافة إلى أن معدلات النمو الاقتصادى البطيئة وأنماطه فى المناطق الحضرية سوف تقلل أو تحد من عناصر الجذب للهجرة من الريف إلى المدينة. ومن المتوقع أن تكون نسبة سكان الحضر فى عام ٢٠٢٠ نحو ٥٣،٨٥٪ من إجمالى عدد السكان فى مصر.

ثانيا . الحالة الاقتصادية

يفترض في سيناريو الاشتراكية الجديدة أن متوسط معدل النمو السنوى للناتج القومي الإجمالي سيكون في حدود ٥٪ حتى عام ٢٠٢٠ (أي سيكون أبطأ قليلا من معدل النمو في السيناريو المرجعي)، وذلك لعدم بذل جهد كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية والتركيز على تحقيق أكبر قدر من الاعتماد على الذات خاصة في مجال التنمية الزراعية وفي بعض المجالات الصناعية (خاصة الصناعات الثقيلة)، بالإضافة إلى أن دور القطاع الخياص سيكون محدوداً وموجهاً في الغالب إلى قطاعات إنتاجية محددة. وسيعمل سيناريو الاشتراكية الجديدة على تحقيق قدر من التنمية المستدامة وتضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء وخفض البطالة. وبذلك سيكون الناتج القسومي الإجمالي في عام ٢٠٢٠ أقل قليلا منه في السيناريو

المرجعي، وستظل مصر من الدول متوسطة الدخل (شريحـة منخفضة) طبقا لتقسيم البنك الدولي.

ومن المتوقع أن تكون مكونات الناتج المحلى الإجمالي كالتالى: زراعة ٢٥٪، صناعة ٤٠٪، وخدمات ٣٥٪. أى أن حصة كل من الزراعة والصناعة ستكون أكبر من تلك في السيناريو المرجعي، بينما تنخفض حصة الخدمات بدرجة ملموسة.

ثالثا الموارد الطبيعية واستخدامها

(١) الأرض

من غير المتوقع حدوث تغيرات كبيرة في مساحة الأرض الزراعية في سيناريو الاشتراكية الجديدة عن تلك المتوقعة عام ٢٠٢٠ في السيناريو المرجعي، أي أن مساحة الأرض الزراعية في مصر عام ٢٠٢٠ ستكون في حدود ٢, ٩ مليون فدان. وسيكون نصيب الفرد من الأرض الزراعية في عام ٢٠٢٠ نحو ١٠٠٠ من الفدان، عائلا لذلك في السيناريو المرجعي.

وسوف يهتم سيناريو الاشتراكية الجديدة بزراعة المحاصيل الأساسية لخفض العجز في متطلبات المواد الغذائية الرئيسية. وستسود الزراعة التقليدية ذات المدخلات المحدودة، وسيتم تشجيع الزراعة الإيكولوجية (أى خفض مدخلات الطاقة والكيماويات المستخدمة إلى أقل قدر ممكن). وسوف يشجع هذا السيناريو زراعة المحاصيل بالتكنولوجيات الحديثة (الهندسة الوراثية مثلا) بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الغذائية.

من جهة أخرى سوف تبذل جهود عملية متزايدة لصون الرقعة الزراعية (الحد من فقد مساحات الأراضى الزراعية لاستخدامات أخرى، والتعامل مع مساكل تشبع الأرض بالمياه (تطبيل الأرض)، وتمليح الأرض، وتصحرها باستخدام تكنولوجيات وإجراءات ملائمة للأوضاع المحلية . . . إلخ)، وذلك للحفاظ على استدامة التنمية الزراعية . ومن المتوقع أن يركز سيناريو الاشتراكية الجديدة على حفز العمل الجماعى والمشاركة الشعبية الواسعة في هذا الصدد . كما سوف يهتم السيناريو بتوسيع رقعة الأرض الزراعية باستصلاح وزراعة مساحات من الأراضى الجديدة باستخدام تكنولوجيات حديثة (ربما في صورة مزارع جماعية) .

يوضح جدول رقم (٣٥) تقديرات الطلب على المياه في سيناريو الاشتراكية الجديدة مقارنة بالوضع في عام ١٩٩٦. ويمكن تلخيص اتجاهات الطلب على المياه في التالى:

(1) ستكون كمية المياه المسحوبة للرى مساوية للسيناريو المرجعى (٥٥ مليار متر مكعب في السنة) حيث إن مساحة الأرض الزراعية المتوقعة عام ٢٠٢٠ ستكون متساوية (٩,٢ مليون فدان). وسوف لا تختلف طرق الرى كثيراً عن تلك المتوقعة في السيناريو المرجعي. وسيكون الاختلاف أساساً في التركيبة المحصولية وفي مصادر مياه الرى. ففي سيناريو الاشتراكية الجديدة ستكون هناك أولوية لزراعة المحاصيل التقليدية الأساسية، مما قد يؤدي إلى زيادة كميات المياه المسحوبة للرى. وسوف يتم التوسع في سيناريو الاشتراكية الجديدة في استخدام مياه الصرف الزراعي والصحى المعالج في الرى. كما سيزداد استخدام المياه الجوفية خاصة في مناطق الاستصلاح الحديثة.

جدول رقم (٣٥) الاحتياجات المائية المتوقعة عام ٢٠٢٠ في سيناريو الاشتراكية الجديدة (مليار متر مكعب سنويا)*

القطــــاع	المياه المسحوية للاستخدام (1997)	الاحتياجات هام ٢٠٢٠ (الرأسمالية الجديدة)
لری	0.,.	00,-
لمناعة	0,1	٧,٠
ستخدامات منزلية/ تجارية	٤,٠	۸, ۲
ستخدامات أخرى	٧,٠	Υ, .
لجملة	71,.	٧٢,٩
+ ۲۰٪ ناتد	17,7	18,7
لجملة	٧٣,٢	7,74
	- 1	i i

* قدرت الاحتياجات في عام ٢٠٢٠ طبقا للافتراضات التالية:

- مساحة الأرض الزواعية في صام ٢٠٢٠ نحو ٢٠٩ مليون فدان، تروى ٢ مليون منها بالطرق التقليدية (متوسط ٢٠٥٠ منر مكعب للفدان في السنة) وتروى ٢٠٣ مليون منها بالطرق الحديثة مثل الرش والتنقيط (متوسط ٢٠٠٠ متر مكعب في السنة).

- سيزداد معدل استخدام المياه في الصناعة بمتوسط سنوى قدره ٥ , ١٪ حتى عام ٧٠٢٠.

- سوف يزداد استخدام المياه في القطاع المنزلي والتجاري بمعدل قدرُه ٥, ١٪ سنويا حتى عام ٢٠٢٠، مع معدل سنوى في زيادة السكان قدره ٥٥, ١٪.

- الأستخدامات الأخرى مثل الملاحة... إلخ.

- الفاقد يشمل البخر من المسطحات المائية والتسرب...إلخ.

- (ب) من المتوقع أن تكون كمية المياه المسحوبة للاستخدام في قطاع الصناعة أكسبر قليلا في سيناريو الاشتراكية الجديدة عنها في السيناريو المرجعي.
- (جـ) ستكون كمية المياه المسحوبة للاستخدام في القطاع المنزلي والتجاري في سيناريو الاشتراكية الجديدة مماثلة لتلك في السيناريو المرجعي.

وبذلك سينخفض نصيب الفرد من المياه المسحوبة للاستخدامات المختلفة في سيناريو الاشتراكية الجديدة إلى نحو ٨١١ مترا مكعبا /عام (مقارنة بنحو ٩٩٢ مترا مكعبا/عام في عام ١٩٩٦). أى أن نصيب الفرد من المياه المسحوبة للاستخدامات المختلفة سيبقى أقل من مؤشر الضغط المائي وقيمته ١٠٠٠ متر مكعب/فرد/عام. ومعنى هذا أن مصر ستواجه ضغطا مائيا في سيناريو الاشتراكية الجديدة بماثلاً تقريبًا لذك الذي توقعناه في السيناريو المرجعي.

ولتخفيف هذا الضغط الماثى سوف تتخذ بعض الإجراءات، من أهمها ما يلى :

- (أ) الاهتمام برفع كمفاءة شبكات الرى وتحسين طرق الرى لخفض الفاقد من المياه، ربما باتباع تكنولوجيات وأساليب بسيطة وملائمة للأوضاع المحلية كتلك المستخدمة في إدارة مياه الرى في الصين (والتي حققت نجاحًا ملموسًا).
- (ب) التوسع في استخدام مياه الصرف الزراعي والصحى المعالج، والمياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة في الري.
- (ج) سيريد هذا السيناريو من حملات التوعية بضرورة ترشيد استخدام المياه فى جميع القطاعات وقد يلجأ إلى سن بعض التشريعات لهذا الغرض، مع تطبيقها بحزم.

(٣) الطاقة

يوضح جدول رقم (٣٦) تقديرات احتياجات الطاقة الأولية التجاربة في سيناريو الاشتراكية الجديدة في عام ٢٠٢٠ مقارنة بالسيناريو المرجعي والاستخدام الفعلي في عام ١٩٩٧. ومنه يتنضح أن الطلب على الطاقة التجارية في سيناريو الاشتراكية الجديدة سيكون مماثلاً لنظيره في السيناريو المرجعي.

ويوضح جدول رقم (٣٦) نسبة كل من أنوع الطاقة الأولية المتوقع استخدامها فى سيناريو الاشتراكية الجديدة. ومنه يتضح احتمالات انخفاض معدلات إحلال الغاز الطبيعى محل البترول فى الاستخدامات المختلفة عن السيناريو المرجعى. ومن المتوقع

فى سيناريو الاشتراكية الجديدة أن يكون تصدير البترول الخام محدودًا (ربما عند مستوى عام ١٩٩٧) للحفاظ على الاحتياطي لسد الطلب المحلي لأطول فترة ممكنة (أي إعطاء أولوية للاحتياجات المحلية). وسيكون تصدير الغاز الطبيعي محدودًا (في حدود ما تمليه الاتفاقيات مع الشريك الأجنبي، إذا لم تستطع الدولة شراء حصته أو جزء منها بسعر مقبول). أي أن تصدير البترول والغاز الطبيعي سيكون مرشدًا حرصًا على عدم استنزاف الاحتياطات بسرعة.

جدول رقم (٣٦) تقديرات احتياجات الطاقة الأولية في عام ٢٠٢٠ في سيناريو الاشتراكية الجديدة (مليون طن نفط مكافئ)

إجمالى	قحم	طاقة مائية	غاز طبيعي	بترول سخام	السنة
41,4	٠,٨	۳, ۲	1.,4	3,77	1997
119	1,1	۳,٥	78,9	£A,4	۲۰۲۰ (السيناريو المرجعي)
119	٧,٥	٣,٨	٥١,٥	97,7	٢٠٢٠ (الرأسمالية الجديدة)

ـ سيناريو الاشتراكية الجديدة: معدل الزيادة السنوى في البترول = ٤٪ معدل الزيادة السنوى في الغاز الطبيعي = ٧٪ معدل الزيادة السنوى في الفحم = ٠٠٪

ومن المتوقع أن يتم استغلال بعض مصادر الطاقة المتجددة (خاصة طاقة الشمس والرياح) في بعض الاستخدامات، خاصة في المناطق النائية والتجمعات السكانية الجديدة. ولكن ستبقى مساهمة مصادر الطاقة المتجددة متواضعة، في حدود مليون إلى ٢ مليون طن نفط مكافئ. ولا يستبعد في هذا السيناريو تنشيط البرنامج النووى، ولكن سيواجه هذا الاتجاه بعدة صعوبات سياسية واقتصادية وفنية. وقد لا يتحقق تقدم ملموس فيه قبل عام ٢٠٢٠.

ومن المتوقع أن يزداد طلب الفرد على الطاقة التجارية في سيناريو الاشتراكية الجديدة إلى نحو ١٣٠٨ كيلوجرام نفط مكافئ/سنة كما هو متوقع في السيناريو المرجعي. وسترتفع نسبة استخدام الطاقة في قطاعات الصناعة والزراعة عنها في السيناريو المرجعي، وكما ستنخفض نسبة استخدام الطاقة في قطاع النقل وفي القطاع المنزلي والتجاري. وقد يلجأ سيناريو الاشتراكية الجديدة إلى رفع أسعار الطاقة في القطاعات الأخيرة كوسيلة لترشيد استخدامها، في حين أنه سيدعم استخدام الطاقة في الصناعة والزراعة، ولو جزئيا.

رابعا. حالة البيئة في عام ٢٠٢٠

يقترض في سيناريو الاشتراكية الجديدة أن سياسات البيئة ستركز على التعامل مع القضايا المحلية العاجلة (مثل الحد من تلوث المياه وإدارة المخلفات البلدية الصلبة والحد من الضوضاء وتلوث الهواء، بالإضافة إلى بذل جهود مكثفة للاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المختلفة). ولكن الإنفاق العام على التعامل مع قضايا البيئة سيكون محدودًا ومركزًا على توفير الخدمات الأساسية في المناطق العشوائية والريفية. ومن الناحية المؤسسية من المتوقع استمرار مركزية الأجهزة المعنية بشئون البيئة، مع استمرار ضعفها وعدم منحها صلاحيات أوسع. وسيكون دور المحليات والجمعيات الأهلية في التعامل مع القضايا البيئية محدودًا. أما من الناحية التشريعية فمن غير المتوقع حدوث تغيرات مهمة في التشريعات أو في آليات تنفيذها.

وفى ضوء ذلك يمكن تلخيص الأوضاع البيئية المتوقعة فى عام ٢٠٢٠ فى التالى: (١) تلوث الهواء

سوف تزداد أحمال الملوثات فى الهواء مقارنة بالوضع الحالى نتيجة لزيادة استخدام الطاقة الحفرية (البترول والغاز الطبيعى والفحم)، والنمو فى بعض الصناعات وزيادة عدد المركبات (من المتوقع زيادة عدد المركبات المختلفة فى سيناريو الاشتراكية الجديدة من حوالى ٢,٧ مليون مركبة موجودة بالحركة فى آخر ديسمبر عام ١٩٩٨ إلى نحو ٤,٧ مليون مركبة فى عام ٢٠٢٠).

ويوضح جدول رقم (٣٧) تقديرات أحمال ملوثات الهواء في سيناريو الاشتراكية الجديدة، مقارنة بعام ١٩٩٧ وبالسيناريو المرجعي. ومعني هذا أن تركيزات الملوثات في السيناريو الاشتراكية الجديدة عنها في السيناريو المرجعي. وترجع هذه الزيادة أساسًا إلى استخدام كميات أكبر من البترول والفحم وكميات أقل من الغاز الطبيعي في سيناريو الاشتراكية الجديدة عنها في السيناريو المرجعي.

وستكون تركيزات ملوثات الهواء في عدد كبير من المناطق الحفرية أعلى من معايير منظمة الصحة العالمية، خاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية، وذلك بالرغم من بعض الإجراءات التي ستتخذ للحد من الانبعاثات من المركبات المختلفة ومن انبعاثات الملوثات من عدد من الصناعات. وفي ضوء الزيادة المتوقعة في عدد سكان الحضر، يقدر أن عدد السكان الذين سيتعرضون لتركيزات غير صحية لملوثات

الهواء في سيناريو الاشتراكية الجديدة سيكون في حدود ٢٤ مليون نسمة، مقارنة بنحو ٢٠ مليونا في السيناريو المرجعي، وذلك بالرغم من أن عدد سكان الحضر في السيناريو المرجعي أكبر منه في سيناريو الاشتراكية الجديدة (٥٦ مليون نسمة و٤٨ مليون نسمة على التوالي). ويرجع هذا إلى ارتفاع أحمال التلوث في سيناريو الاشتراكية الجديدة عنه في السيناريو المرجعي، أي وجود انتشار أوسع لتلوث الهواء. وبذلك من المتوقع زيادة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وحالات الوفاة المبكرة عنها في عام ١٩٩٧ أو في السيناريو المرجعي.

جدول رقم (٣٧) تقديرات أحمال ملوثات الهواء في مصر في عام ٢٠٢٠ في سيناريو الاشتراكية الجديدة (بالألف طن) *

الهيدروكربونات	جسيمات عالقة	أكاسيد نيتروجين	ثائى أكسيد كبريت	السنة
۲۱	0	7.0	ATS	1994
. 44	777.	707	1.9.	۲۰۲۰ (انسيتاريو المرجعي)
. 50	1.80.	AYS	1414	٢٠٢٠ (الرأسمالية الجديدة)

١٠٤٠ على أساس خليط الطاقة المتوقع استخدامه (انظر جدول رقم ٣٠١٠)، وعلى أساس معدلات النمو الصناعي، وزيادة عدد المركبات الموجودة بالحركة.

- تم تخفيض كمية الملوثات بنحو ٣٠٪ حيث إن الصناعات الجديدة التي ستنشأ والمركبات الجديدة التي ستنشأ والمركبات الجديدة التي ستستورد ستكون مصممة من قبل الشركات الأجنبية المنتجة لها مراعية الشروط البيئية بحيث ستنبعث منها أقل كمية ممكنة عمليا من الانبعاثات المختلفة. هذا بالإضافة إلى أن بعض الصناعات الحالية ستتخذ بعض الإجراءات للحد من انبعاث الملوثات منها، كما أنه يتوقع أن تترك الحركة أعدادا متزايدة من المركبات القديمة الملوثة للبيئة.

وكما هو الحال في السيناريو المرجعي سوف تظهر مشكلات عدد من الملوثات الأخرى (المركبات العضوية) نتيجة التوسع في استخدام المنتجات البترولية، خاصة الديزل.

من جهة أخرى سوف تزداد انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى في سيناريو الاشتراكية الجديدة، وتقدر كمية ثانى أكسيد الكربون المتوقع انبعاثها في عام ٢٠٢٠ بنحو ٢٦٠ مليون طن. وتقدر كمية غاز الميثان التي ستنبعث بنحو ٧٠٠ ألف طن. وستظل نسبة انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى أقل من ١٪ من الانبعاثات في العالم (من المتوقع أن تنخفض الانبعاثات في الدول المتقدمة إلى مستوى عام العالم (من المتوقع أن تنخفض الانبعاثات في الدول المتقدمة إلى مستوى عام المعالم ، بينما تزداد الانبعاثات في الدول النامية لزيادة معدلات استخدام الطاقة

الحفرية فيها). وربما تؤدى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى على المستوى العالمى إلى ارتفاع طفيف فى درجة الحرارة فى عام ٢٠٢٠ يصاحبه ارتفاع محدود فى مستوى سطح البحر. وقد يؤدى هذا إلى غمر بعض الأراضى المنخفضة فى شمال الدلتا (وكما سبق ذكره، لا يتوقف هذا على أى من السيناريوهات المذكورة لأن ظاهرة الاحتباس الحرارى واحتمال ارتفاع درجات الحرارة ظاهرة عالمية تتوقف على كميات غازات الاحتباس الحرارى التى ستنبعث على المستوى العالمى).

(Y) تلوث المياه

فى سيناريو الاشتراكية الجديدة سوف تستمر عمليات صرف المخلفات السائلة فى نهر النيل وفروعه بطريق مباشر أو غير مباشر (عن طريق المصارف التي تصب فى نهر النيل أو الترع الرئيسية أو عن طريق عمليات نزح المخلفات وتضريغها فى الترع والمصارف). ومن المتوقع أن تكون الصورة في عام ٢٠٢٠ كالتالى:

- استمرار الصرف الزراعى (نحو ٤٠٠٠ مليون متر مكعب) في نهر النيل في الوجه القبلي بين أسوان والقاهرة.
- # انخفاض فى كمية الصرف الصحى غير المعالج المنصرف فى النيل بطريق مباشر وغير مباشر فى الوجه القبلى إلى ما يقرب من ١٠٠٠ مليون متر مكعب فى السنة، لتكثيف الجهود لمد خدمات الصرف الصحى إلى المناطق العشوائية فى المدن وإلى العديد من المناطق الريفية.
- المناعبة عمليات صرف المخلفات الصناعية في نهر النيل وفروعه بدرجة ملحوظة لاتخاذ الصناعات لإجراءات بديلة لصرف مخلفاتها.
- * لا يتوقع أن تسوء نوعية مياه النيل عما هي عليه الآن، وذلك للحد من صرف كميات من المخلفات السائلة فيه بطريق مباشر أو غير مباشر.
- * من المتوقع حدوث تغيرات في نوعية مياه نهر النيل الواردة إلى بحيرة ناصر من الجنوب. فدول حوض نهر النيل سوف تشهد زيادة سكانية كبيرة حتى عام ٢٠٢٠، بالإضافة إلى إقدام معظم هذه الدول على عمليات تنمية زراعية وصناعية. وسوف يؤدى ذلك إلى صرف كميات متزايدة من المخلفات السائلة في نهر النيل بطريق مباشر وغير مباشر، مما ستكون له آثار كبيرة على نوعية المياه الواردة إلى البحيرة.

* من المتوقع أن تبقى الأوضاع البيئية الحالية في بحيرات شمال الدلتا كما هي عليه الآن أو تتحسن قليلا، وذلك لخفض صرف المخلفات السائلة فيها.

(٣) المناطق الساحلية والبيئة البحرية

من المتوقع في عام ٢٠٢٠ أن يزداد صرف المخلفات السائلة في البيئة البحرية شمال الدلتا (صرف صحى ومخلفات صناعية) نتيجة النمو السكاني والتنمية الصناعية في المناطق الساحلية. وبالرغم من الجهود المبدولة لمعالجة بعض المخلفات (سواء بإنشاء بعض المحطات لمعالجة الصرف الصحى أو قيام بعض الصناعات بإنشاء وحدات لمعالجة مخلفاتها السائلة) سوف تزداد أحمال الملوثات التي ستجد طريقها إلى المناطق الساحلية والبيئة البحرية. كما ستؤدى عمليات استكشاف وإنتاج النفط والخاز الطبيعي في هذه المناطق وفي الرصيف القاري شمال الدلتا إلى صرف عدة ملوثات (خاصة مخلفات عمليات حفر الآبار الاستكشافية وآبار الإنتاج ومخلفات عمليات الإنتاج . إلخ) في البيئة البحرية والمناطق الساحلية . وسيساعد على تدهور البيئة الساحلية في شمال الدلتا احتمالات غمر بعض المناطق الساحلية المنخفضة بمياه البحر . وسوف يؤدي هذا إلى آثار سلبية على نوعية المياه الجوفية الساحلية بزيادة ملوحتها وتلوثها ، كما سيؤثر على إنتاجية الأراضي الزراعية في هذه المناطق الهامشية الحساسة بيئيا . ومن المتوقع أن يزداد التدهور البيئي في منطقة خليج السويس بعد إنشاء المجمعات الصناعية المختلفة والتي ستقوم بصرف مخلفاتها في البحر مباشرة (بعضها غير معالج أو معالج جزئيا).

كذلك ستتعرض المناطق الساحلية لضغوط متزايدة نتيجة زيادة عدد الزوار الموسميين والسائحين (سيناريو الاشتراكية الجديدة سيشجع السياحة باعتبارها مصدراً مهسما للدخل القومى). وسوف لا تقابل التوسعات الكبيرة في الطاقة الفندقية والتجمعات السكنية (القرى السياحية) في هذه المناطق بتوسعات موازية في البنية والخدمات الأساسية، مما سيودي إلى تجاوز القدرات الاستيعابية لها في بعض المواقع. فعلى سبيل المثال سوف تزداد الضغوط على محطات مياه الشرب وعلى محطات معالجة الصرف الصحى. وقد يؤدى هذا إلى قيام بعض المنشآت بصرف مخلفاتها غير المعالجة أو المعالجة جزئيا في البيئة البحرية، مما سيكون له آثار سلبية على نوعية مياه الاستحمام في بعض الشواطئ. كذلك ستؤدى هذه الضغوط إلى على نوعية مياه الاستحمام في بعض الشواطئ. كذلك ستؤدى هذه الضغوط إلى إيجاد مشكلات متزايدة في إدارة المخلفات الصلبة (القمامة)، وتلوث الهواء نتيجة زيادة كثافة المرور في المنتجعات السياحية. وبالإضافة إلى هذا ستؤدى الزيادة في

الأنشطة البحرية الترفيهية (الرياضات البحرية، الغوص، وغيرها) إلى آثار سلبية على نوعية مياه بعض الشواطئ، بالإضافة إلى إلحاق بعض الأضرار بالشعاب المرجانية والموارد الساحلية.

(٤) تدهور التربة والتصحر

يقدر متسوسط ما يفقد من الأراضى الزراعية لاستخدامات أخرى (مثل تشييد الطرق وأعمال البنية الأساسية الأخرى والمساكن... إلخ) منذ عام ١٩٩٠ بنحو ٢٥ ألف فدان سنويا. وستبذل فى سيناريو الاشتراكية الجديدة جهود كبيرة للحد من فقدان الأراضى الزراعية لاستخدامات غير زراعية (البنية الأساسية والمبانى... إلخ)، وذلك بالحزم فى تنفيذ القوانين التى تحد أو تمنع استخدام الأراضى الزراعية فى غير الإنتاج الزراعى. كذلك ستبذل جهود كبيرة لتوفير الخدمات الأساسية فى غير الإنتاج الزراعى. كذلك ستبذل جهود كبيرة لتوفير الخدمات الأساسية فى المدن والمجتمعات الجديدة لتشجيع الانتقال إليها والإقامة فيها. كما سيكون هناك اتجاه لإنشاء مدن عمالية بجوار المناطق الصناعية. وستكون هذه المدن شبه مستقلة وبها الخدمات الأساسية المختلفة عما سيجعل منها مستوطنات بشرية جديدة.

وسوف يحرص سيناريو الاشتراكية الجديدة على عدم تجاوز قدرات تحمل الأراضى الزراعية وذلك باستخدام أساليب للزراعة أكثر ملائمة لقدرات الأرض والبيئة. كما أنه سيهتم بإعادة تأهيل الأرض التى تدهورت إنتاجيتها (التى أصابها التشبع بالمياه أو التمليح. . إلخ)، باستخدام تكنولوجيات ملائمة للأوضاع المحلية.

(٥) المشكلات البيئية في المناطق الحضرية

سوف تؤدى الزيادة في عدد سكان الحضر في عام ٢٠٢٠ إلى تفاقم المشكلات البيئية في المدن المختلفة، خاصة في المناطق العشوائية فيها. ولكن من المتوقع أن يزداد الاهتمام بمشكلات هذه المناطق في سيناريو الاشتراكية الجديدة. وسينخفض عدد السكان الذين لا تتصل وحداتهم السكانية بشبكات المياه إلى نحو ٢٠٤ مليون نسمة في عام ٢٠٢٠ (جدول رقم ٣٨). ومع التغيرات البطيئة التي ستحدث في نوعية الحياة في المناطق الحضرية من المتوقع زيادة الطلب على المياه من نحو ٣٣٥ لترا/ فرد/ يوم في عام ٢٠٢٠، أي لترا/ فرد/ يوم في عام ٢٠٢٠، أي أقل من السيناريو المرجعي نتيجة الجهود الرامية إلى ترشيد استخدام المياه.

جدول رقم (۳۸) تقديرات أعداد سكان الحضر الذين لا تتصل وحداتهم السكنية بشبكات المياه في عام ۲۰۲۰

النسبة المنوية لعدد السكان بدون توصيلات مياه	عدد السكان بدون توصيلات لمياه الشرب (بالمليون)	حدد سکان الحضر (بالملیون)	
%10,8	£	Y1	1997
7,18,7	۸	61	۲۰۲۰ (السيناريو المرجعي)
7.0	٧,٤	٤٨	٢٠٢٠ (الاشتراكية الجديدة)

أما بالنسبة لخدمات الصرف الصحى فسوف تنخفض نسبة السكان بدون خدمات صرف صحى فى سيناريو الاشتراكية الجديدة من ٤٢,٥٪ فى عام ١٩٩٦ إلى ١٠٪ فى عام ٢٠٢٠ (جدول رقم ٣٩). وهى نسبة أقل بكثير من تلك فى السيناريو المرجعى.

جدول رقم (٣٩) تقديرات سكان الحضر بدون خدمات صرف صحى في سيناريو الاشتراكية الجديدة

النسبة المثوية لعدد السكان بدون خدمات صرف صحى	عدد السكان بدون خدمات صرف صحى (بالليون)	حدد سكان الحضر (بالمليون)	
%Y0, £	7,7	77	1997
7.40	۱٤,٠	97	۲۰۲۰ (السيئاريو المرجعي)
٪۱۰	٤,٨	£A	٢٠٢٠ (الاشتراكية الجديدة)

وسوف تزداد كمية المخلفات البلدية الصلبة المتولدة في المناطق الحضرية من نحو وسوف تزداد كمية المخلفات البلدية الصلبة المتولدة في الوقت الحالي إلى نحو ٢٠٢٠ طن يوميا (١٥,٨ مليون طن سنويا) في عام ٢٠٢٠ (جدول رقم ٤٠)، نتيجة الزيادة السكانية في هذه المناطق بالإضافة إلى التغيرات البطيئة المتوقعة في نوعية الحياة وأنماط الاستهلاك. وبذلك سوف تتعقد مشكلات إدارة المخلفات البلدية الصلبة خاصة في المدن الواقعة وسط الأراضي الزراعية، كما هو الحال في وسط الدلتا مثلا، لعدم توافر مساحات من الأراضي لإنشاء مقالب قدامة إضافية (أو مدافن صحية) لاستقبال الكميات المتزايدة من المخلفات.

جدول رقم (٤٠) كمية المخلفات البلدية الصلبة المتوقعة في المناطق الحضرية

كمية المخلقات البلدية الصلية (مليون طن/ سنة)	
۸,٩	1997
11.15	۲۰۲۰ (الــيناريو المرجمي)
۸,۵۱	٢٠٢٠ (الاشتراكية الجديدة)

ومن المنتظر أن يشجع سيناريو الاشتراكية الجديدة استخدام العبوات التي ترد (أي إعادة استخدام العبوات خاصة زجاجات المشروبات)، وبالتالي إحداث بعض التغييرات في تعبئة المنتجات وحث قطاعات الصناعة والتجارة والأفراد على تخفيض كميات المخلفات الصلبة المتولدة. كما سيتم تشجيع عمليات تدوير بعض مكونات المخلفات.

هذا وكما ذكرنا من قبل من المتوقع زيادة تلوث الهواء في معظم المناطق الحضرية خاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية، كما ستسزداد الضوضاء وكثافة واختناقات المرور في معظم المدن نتيجة الزيادة السكانية وزيادة أعداد المركبات المختلفة.

(٦) المشكلات البيئية في المناطق الريفية

طبقا لسيناريو الاشتراكية الجديدة سوف يكون عدد سكان المناطق الريفية في عام ٢٠٢٠ نحو ٤١ مليون نسمة، أى أكثر منه في السيناريو المرجعي. وكما ذكرنا من قبل سيسعى سيناريو الاشتراكية الجديدة إلى تحسين الأوضاع البيئية، خاصة بالعمل على إمداد المناطق الريفية بالخدمات الأساسية وفي مقدمتها مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى. فعلى سبيل المثال قدرت نسبة سكان الريف الذين لا تصل المياه إلى وحداتهم السكنية بنحو ٢٠٤٪، أى نحو ١٤ مليون نسمة في عام ١٩٩٦. ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى ١٠٪ بحلول عام ٢٠٢٠ (جدول رقم ٤١).

جدول رقم (٤١) تقديرات أعداد سكان الريف الذين لا تتصل وحداتهم السكنية بشبكات المياه في عام ٢٠٢٠

	حدد سكان الريف (بالمليون)	حدد السكان بدون توصيلات لمياه الشرب (بالمليون)	النسبة المثوية لعدد السكان بدون توصيلات مياء
1447	44	18	7.87
۲۰۲۰ (السيناريو المرجعي)	77	17	1,40
٢٠٢٠ (الاشتراكية الجديدة)	٤١	٤,١	7.11

أما بالنسبة لخدمات الصرف الصحى فكانت نسبة من لا تصلهم هذه الخدمات ٨٣٪، أى نحو ٢٨ مليون نسمة فى عام ١٩٩٦. ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى ٣٩٪ فى عام ٢٠٢٠، وبذلك يصبح عدد سكان الريف الذين لا تصلهم خدمات الصرف الصحى قرابة ١٦ مليون نسمة (جدول رقم ٤٢).

جدول رقم (٤٢) تقديرات أعداد سكان الريف بدون خدمات صرف صحى في سيناريو الاشتراكية الجديدة

النسبة المثوية لعدد السكان بدون خدمات صرف صحى	عدد السكان يدون خدمات صرف صحى (بالليون)	حدد سكان الريف (بالمليون)	
% AT	YA	۲۳	1997
7.4.	YA .	74	۲۰۲۰ (السيناريو المرجعي)
7,44	17	13	٢٠٢٠ (الاشتراكية الجديدة)

ومع التغيرات في أنماط الحياة والاستهلاك في المناطق الريفية من المتوقع زيادة توليد المخلفات المنزلية الصلبة (القمامة) من نحو ١٠٢٠ طن يوميا (٩,٥ مليون طن سنويا) طن سنويا) في الوقت الحالي إلى نحو ١٢٣٠ طن يوميا (٩,٥ مليون طن سنويا) في عام ٢٠٢٠ (جدول رقم ٤٣). وستكون طرق التخلص من هذه المخلفات، في الغالب، كما هي عليه الآن (الحرق في المنازل أو خارجها، إلقاء المخلفات في الأراضي الفضاء وفي الترع والمصارف.. إلخ).

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

جدول رقم (٤٣) كمية المخلفات المنزلية الصلبة المتوقعة في المناطق الريفية

كمية المخلفات المنزلية الصلبة (مليون طن/ سنة)	
٣,٩	1997
7,.	۲۰۲۰ (السيناريو المرجمي)
٤,٥	٢٠٢٠ (الاشتراكية الجديدة)

ومن المتوقع أن تكثف الجهود في سيناريو الاشتراكية الجديدة لإحداث تغيرات جوهرية في الأوضاع البيئية في المناطق الريفية. فمثلا من المحتمل أن يتم القضاء على بعض الأمراض البيئية (مثل البلهارسيا) مع حلول عام ٢٠٢٠. ومن المحتمل أن توجه برامج تنمية السقرية إلى تحديث الزراعة وتنمية الصناعات السزراعية والقروية. إلى لتحسين حياة أهلها ودعم استقرارهم، ومن ثم للحد من هجرة أهل الريف المؤقتة أو الدائمة إلى المناطق الحضرية أو إلى خارج البلاد.

الفصل السادس الشعبي (التآزر الاجتماعي)

هذا السيناريو هو البديل الرابع للسيناريو المرجعي. وفيما يلي أهم معالم هذا السيناريو التي يتوقع أن تؤثر في أوضاع البيئة المستقبلية:

- ** دمج البعدين الاقتصادى والاجتماعى، أو بمعنى أدق بروز البعد الاجتماعى واحتلاله مكانة مرموقة إلى جانب البعد الاقتصادى.
- الاعتماد على التمثيل الشعبى والمشاركة المشعبية الواسعة لكل الطبقات والفثات والقطاعات في الأجهزة التشريعية والتنفيذية وأجهزة الحكم المحلى.
- * اهتمام أكبر بترشيد عمليات نقل الـتكنولوجيا، وبخاصة مراعـاة اعتبارات زيادة فرص العمل وتخفيض استهلاك الطاقة.
 - * الحد من معدل النمو السكاني.
- التحفظ على الانفتاح وحرية السوق، ومن ثم إبطاء حسركة الاقتصاد المصرى نحو
 التحرير وفتح الأسواق والارتباط بالشركات المتعددة الجنسيات.
 - * التركيز على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاعتماد على الذات.
 - 🗱 وضع سياسات ويرامج للحد من الاستهلاك تنطوى على الاعتدال ـ لا على التقشف.
 - * الحد من قيام صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
- * الاهتمام بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وإشباع الحاجات الأساسية وبرامج قوية لمكافحة الفقر.
- * احتسمال أن يؤدى مجال الحركة المتساح للمحليات والجسماعات الأهلية إلى اتجاه الحفاظ على البيئة وتشجيع جهود تدوير بعض المواد. ولكن في نفس الوقت قد يتم المتغاضي عن بعض الهموم البيئية أو زيادة بعضها أثناء السعى لإشباع الحاجات الأساسية وتسريع وتيرة التصنيع.

وفى ضوء هذه المعالم الرئيسية نوجز فيما يلى التوقعات بالنسبة للمتغيرات الرئيسية، وأوضاع البيئة المترتبة على ذلك في عام ٢٠٢٠.

أولأ النمو السكاني وتوزيع السكان

يفترض فى السيناريو الشعبى أن المعدل السنوى للنمو السكانى سيكون منخفضا، بين المتغير الأوسط والمتخير الأدنى الذى تفترضه الأمم المتحدة. أى سيكون متوسط معدل النمو السنوى للسكان حتى عام ٢٠٢٠ نحو ٢٥,٥٪ وبذلك سيصل عدد سكان مصر فى عام ٢٠٢٠ إلى حوالى ٨٦ مليون نسمة.

وفى حالة عدم زيادة المساحة المأهولة بالسكان (حاليا ٢٥٠٠٠ كيلومتر مربع) سوف ترتفع الكثافة السكانية إلى حوالى ١٣٢٣ نسمة/كيلومتر مربع، مقارنة بنحو ٩٥٠ فى الوقت الحالى.

أما بالنسبة لتوزيع السكان بين الحفر والريف، فمن المتوقع أن يكون النمو السكاني في المناطق الحضرية بطيئًا، بمتوسط نمو سنوى ١٪ تقريبا حتى عام ٢٠٢٠، ويذلك ستكون نسبة سكان الحضر في عام ٢٠٢٠ نحو ٥٤٪. وسننتج معظم هذه الزيادة من ارتفاع معدلات التحضر في المحافظات (تحول قرى رئيسية إلى مدن صغيرة) بالإضافة إلى الزيادة الطبيعية للسكان في المناطق الحضرية ذاتها.

ثانياء الحالة الاقتصادية

يفتسرض فى السيناريو الشعبى أن متوسط معمدل النمو السنوى للناتج القومى الإجمالي سيكون فى حدود ٥,٥٪ حتى عام ٢٠٢٠. وبذلك سيكون الناتج القومى الإجمالي في ٢٠٢٠ أقل قليلا منه في السيناريو المرجعي، وستظل مصر من الدول متوسطة الدخل (شريحة منخفضة) طبقا لتقسيم البنك الدولي.

ومن المتوقع أن تكون مكونات الناتج المحلى الإجمالي كالتـالى: زراعة ٢٠٪، صناعة ٣٠٪، وخدمات ٥٠٪، أي كما في السيناريو المرجعي .

ثالثا ـ الموارد الطبيعية واستخدامها

(١) الأرض

من غير المتوقع حــدوث تغيرات كبيرة في مساحــة الأرض الزراعية في السيناريو

الشعبى عن تلك المتوقعة عام ٢٠٢٠ فى السيناريو المرجعى، أى أن مساحة الأرض الزراعية فى مصر عام ٢٠٢٠ ستكون فى حدود ٩,٢ مليون فدان. وسيكون نصيب الفرد من الأرض الزراعية فى عام ٢٠٢٠ نحو ١١,٠ من الفدان.

وسوف يهتم السيناريو الشعبى بزراعة المحاصيل الأساسية لخفض العجز فى منطلبات المواد الغذائية الرئيسية. وستسود الزراعة التقليدية ذات المدخلات المحدودة، كما سيتم تشجيع الزراعة الإيكولوجية (أى خفض مدخلات الطاقة والكيماويات المستخدمة إلى أقل قدر ممكن). وسوف يشجع هذا السيناريو زراعة المحاصيل بالتكنولوجيات الحديثة (الهندسة الوراثية مثلا) بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الغذائية.

من جهة أخرى، سوف تبذل جهود عملية متزايدة لصون الرقعة الزراعية (الحد من فقد مساحات الأراضى الزراعية لاستخدامات أخرى، التعامل مع مشاكل تشبع الأرض بالمياه (تطبيل الأرض)، وتمليح الأرض، وتصحرها باستخدام تكنولوجيات وإجراءات ملائمة للأوضاع المحلية . . . إلخ) ، وذلك للحفاظ على استدامة التنمية الزراعية .

(٢) المياه

يوضح جدول رقم (٤٤) تقديرات الطلب على المياه في السيناريو الشعبي مقارنة بالوضع في ١٩٩٦. ويمكن تلخيص اتجاهات الطلب على المياه في التالي:

(أ) ستكون كمية المياه المسحوبة للرى مساوية للسيناريو المرجعى (٥٥ مليار متر مكعب في السنة) حيث إن مساحة الأرض الزراعية المتوقعة عام ٢٠٢٠ ستكون متساوية (٩,٢ مليون فدان). وسوف لا تختلف طرق الرى كثيراً عن تلك المتوقعة في السيناريو المرجعي. وسيكون الاختلاف أساساً في التركيبة المحصولية وفي مصادر مياه الرى. ففي السيناريو الشعبي ستكون التركيبة المحصولية مكونة من المحاصيل التقليدية الأساسية ومحاصيل التصدير. وسوف يتم التوسع في السيناريو الشعبي في استخدام مياه الصرف الزراعي والصحى المعالج في الرى. كما سيزداد استخدام المياه الجوفية خاصة في مناطق الاستصلاح الحديثة.

جدول رقم (٤٤) الاحتياجات المائية المتوقعة عام ٢٠٢٠ في السيناريو الشعبي (مليار متر مكعب سنويا)*

الاحتياجات هام ٢٠٢٠ (السيناريو الشعبي)	المياه المسحوبة للاستخدام (1991)	القطاع
00,.	B.,.	الرى
1.0	۵,٠	الصناعة
۸,۵	٤,٠	استخدامات منزلية/ تجارية
٧,٠	۲,٠	استخدامات أخرى
٧٢,٠	71,.	الجملة
18,8	17,7	+ ۲۰٪ فاقد
A1, E	٧٣,٢	الجملة

- * قدرت الاحتياجات في عام ٢٠٢٠ طبقا للافتراضات التالية:
- ـ مساحة الأرض الزراعية في عام ٢٠٢٠ نحو ٩,٢ مليونُ فدان، تروى ٦ مليون منها بالطرق التقليدية (متوسـط ٢٥٠٠ متر مكعب للفدان في السنة) وتـروى ٢,٣ مليون منها بالطرق الحديثة مثل الرش والتنقيط (متوسط ٢٠٠٠ متر مكعب في السنة).
 - سيزداد معدل استخدام المياه في الصناعة بمتوسط سنوى قدره ٣ , ١ ٪ حتى عام ٢٠٢٠.
- سوف يزداد استخدام ألمياه في القطاع المنزلي والتجاري بمعدل قدره ٣, ١٪ سنويا حتى عام ٢٠٢٠، مع معدل سنوى في زيادة السكان قدره ٤٥,١٪.
 - ـ الآستخدامات الأخرى مثل الملاحة... إلخ.
 - الفاقد يشمل البخر من المسطحات الماثية والتسرب... إلخ.
- (ب) من المتوقع أن تكون كمية المياه المسحوبة للاستخدام في قطاع الصناعة والقطاع المنزلي والتجاري أكبر قليلا في السيناريو الشعبي عنها في السيناريو الرجعي.

وبذلك سينخفض نصيب الفرد من المياه المسحوبة للاستخدامات المختلفة فى السيناريو الشعبى إلى نحو ٨٦٠ مترا مكعبا / عام (مقارنة بنحو ٩٩٢ مترا مكعبا/ عام فى عام ١٩٩٦). أى أن نصيب الفرد من المياه المسحوبة للاستخدامات المختلفة سيبقى أقل من مؤشر الضغط المائى وقيمته ١٠٠٠ متر مكعب/ فرد/ عام.

ولتخفيف هذا الضغط الماثي سوف تتخذ بعض الإجراءات أهمها :

- (أ) الاهتمام برفع كفاءة شبكات الرى وتحسين طرق الرى لخفض الفاقد من المياه.
- (ب) التوسع في استخدام مياه الصرف الزراعي والصحى المعالج، والمياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة في الري.

(جـ) سيـزيد هذا السيناريو من حملات التـوعية بضرورة ترشـيد استخـدام المياه في جميع القطاعات.

(٣) الطاقة

يوضح جدول رقم (٤٥) تقديرات احتياجات الطاقة الأولية التجارية في السيناريو الشعبي في عام ٢٠٢٠ مقارنة بالسيناريو المرجعي والاستخدام الفعلي في عام الموعي. ومنه يتضح أن الطلب على الطاقة التجارية سيكون بماثلا لذلك في السيناريو المرجعي. ومن المتوقع في السيناريو الشعبي أن يكون تصدير البترول الخام محدودًا (ربما عند مستوى عام ١٩٩٧) للحفاظ على الاحتياطي لسد الطلب المحلي لأطول فترة ممكنة (أي إعطاء أولوية للاحتياجات المحلية). كما سيكون تصدير الغال الطبيعي محدودًا (في حدود ما تمليه الاتفاقيات مع الشريك الأجنبي، إذا لم تستطع الدولة شراء حصته أو جزء منها بسعر مقبول). أي أن تصدير البترول والغاز الطبيعي سيكون مرشدًا حرصًا على عدم استنزاف الاحتياطيات بسرعة. وسوف يبلغ استهلاك الفرد من الطاقة في عام ٢٠٢٠ نحو ١٣٨٣ كيلوجرام نفط مكافئ، أي أعلى قليلا منه في السيناريو المرجعي.

جدول رقم (٤٥) تقديرات احتياجات الطاقة الأولية في عام ٢٠٢٠ في السيناريو الشعبي (مليون طن نفط مكافئ)

إجمالى	Lea	طاقة مائية	خاز طبیعی	بترول خام	المسئة
77,7	٠,٨	۳,۲	1.,٣	44,8	1997
119	1,7	7,0	18,9	14,4	۲۰۲۰ (السيناريو المرجعي)
119	0, Y	٣,٨	30,0	٥٠,٠	۲۰۲۰ (الرأسمالية الشعبی)

السيناريو الشعبى: معدل الزيادة السنوى فى البترول = 0, % معدل الزيادة السنوى فى الغاز الطبيعى = % معدل الزيادة السنوى فى الفحم = %

ومن المتوقع أن يتم التوسع فى استغلال بعض مصادر الطاقة المتجددة (خاصة طاقة الشمس والرياح) فى بعض الاستخدامات، خاصة فى المناطق النائية والتجمعات السكانية الجديدة. وستكون مساهمة مصادر الطاقة المتجددة أعلى من السيناريوهات الأخرى، أى فى حدود ٥٠٣ مليون طن نفط مكافئ.

هذا ومن المتوقع حدوث تغيرات كبيرة في كفاءة استخدام الطباقة في السيناريو

الشعبى، خاصة فى قطاعى الصناعة والنقل، وذلك عن طريق تعميم عمليات صيانة المعدات واستبدال بعضها بأخرى أقل استمهلاكا للطاقمة، وتحسين وسائل النقل الجماعية (مما سيوفر من استهلاك الوقود).

رابعا. حالة البيئة في عام ٢٠٢٠

يفترض فى السيناريو الشعبى أن سياسات البيئة ستركز على التعامل مع القضايا المحلية العاجلة، وأنها سوف تتخذ من المشاركة الشعبية الواسعة أساسًا لتنفيذها. وبالرغم من أن الإنفساق الحكومى على التعامل مع قضايا البيئة سيكون محدودًا وموجهًا لتوفير الخدمات الأساسية فى المناطق العشوائية والريفية (خاصة توفير مياه الشرب وخدمات الصحى لأكبر عدد ممكن من المناطق المحرومة)، إلا أن المساهمات الشعبية ومساهمات القطاع الخاص فى حماية البيئة ستكون ملموسة. وفى ضوء ذلك يمكن تلخيص الأوضاع البيئية المتوقعة فى عام ٢٠٢٠ فى التالى:

(١) تلوث الهواء

سوف تزداد أحمال الملوثات في الهواء مقارنة بالوضع الحالى نتيجة لزيادة استخدام الطاقة الحفرية (البترول والغاز الطبيعي والفحم)، والنمو في بعض الصناعات وزيادة عدد المركبات (من المتوقع زيادة عدد المركبات المختلفة في السيناريو الشعبي من حوالي ٢,٧ مليون مركبة موجودة بالحركة في آخر ديسمبر عام ١٩٩٨ إلى نحو ٧,٥ مليون مركبة في عام ٢٠٢٠).

ويوضح جدول رقم (٤٦) تقديرات أحمال ملوثات الهواء في السيناريو الشعبي، مقارنة بعام ١٩٩٧ وبالسيناريو المرجعي. وستكون تركيزات ملوثات الهواء في عدد كبير من المناطق الحضرية أعلى من معايير منظمة الصحة العالمية، خاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية، وذلك بالرغم من بعض الإجراءات التي ستتخذ للحد من الانبعاثات من المركبات المختلفة ومن انبعاثات الملوثات من عدد من الصناعات. وفي ضوء الزيادة المتوقعة في عدد سكان الحضر يقدر أن عدد السكان الذين سيتعرضون لتركيزات غير صحية لملوثات الهواء في السيناريو الشعبي سيكون في حدود ١٥ مليون نسمة، أي أقل من المتوقع في السيناريو المرجعي.

جدول رقم (٤٦)
تقديرات أحمال ملوثات الهواء في مصر في عام ٢٠٢٠ في السيناريو الشعبي
(بالألف طن)*

الهيدروكربونات	جسيمات عالقة	أكاسيد نيتروجين	ٹانی انجسید کیریت	السبنة
71	0	Y · 0	۸٦٩	1197
77	777.	YOY	1.9.	۲۰۲۰ (السيناريو المرجعي)
۲٠	٧٥٠.	۳.,	11	۲۰۲۰ (السيناريو الشعبي)

 * ـ تم حساب كميات ملوثات الهواء في عام ٢٠٢٠ على أساس خليط الطاقة المتوقع استخدامه (انظر جدول رقم ٤٥)، وحلى أساس معدلات النمو الصناعي، وزيادة عدد المركبات الموجودة بالحركة.
 ـ تم تخفيض كمية الملوثات بنحو ٣٠٪ حيث إن الصناصات الجديدة التي ستنشأ والمركبات الجديدة

التى ستستورد ستكون مصممة من قبل الشركات الأجنبية المنتجة لها مراعية الشروط البيئية بحيث سننبعث منها أقل كمية محنة عمليا من الانبعاثات المختلفة. هذا بالإضافة إلى أن بعض الصناعات الحالية ستتخذ بعض الإجراءات للحد من انبعاث الملوثات منها، كما أنه يتوقع أن تترك الحركة أعدادا متزايدة من المركبات القديمة الملوثة للبيئة.

من جهة أخرى، سوف تزداد انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى في السيناريو الشعبى، وستكون كميات ثانى أكسيد الكربون والميشان المنبعثة مماثلة لنظيرتها في السيناريو المرجعي.

(٢) تلوث المياه

فى السيناريو الشعبى سوف تستمر عمليات صرف المخلفات السائلة فى نهر النيل وفروعه بطريق مباشر أو غير مباشر (عن طريق المصارف التى تصب فى نهر النيل أو الترع الرئيسية أو عن طريق عمليات نزح المخلفات وتفريغها فى الترع والمصارف). ومن المتوقع أن تكون الصورة فى عام ٢٠٢٠ كالتالى:

- استـمرار الصـرف الزراعي (نحو ٤٠٠٠ مليـون متر مكعب) في نهـر النيل في
 الوجه القبلي بين أسوان والقاهرة.
- * انخفاض فى كمية الصرف الصحى غير المعالج المنصرف فى النيل بطريق مباشر وغير مباشر فى الوجه القبلى إلى ما يقرب من ١٠٠٠ مليون متر مكعب فى السنة، لتكثيف الجهود لمد خدمات الصرف الصحى إلى المناطق العشوائية فى المدن وإلى المعديد من المناطق الريفية.
- المسوف تنخفض عمليات صرف المخلفات الصناعية في نهر السنيل وفروعه بدرجة ملحوظة، لاتخاذ الصناعات إجراءات بديلة لصرف مخلفاتها.

- * لا يتوقع أن تسوء نوعية مياه النيل عما هي عليه الآن، وذلك للحد من صرف كميات من المخلفات السائلة فيه بطريق مباشر أو غير مباشر.
- * من المتوقع حدوث تغيرات في نوعية مياه نهر النيل الواردة إلى بحيرة ناصر من الجنوب، فدول حوض نهر النيل سوف تشهد زيادة سكانية كبيرة حتى عام ٢٠٢٠، بالإضافة إلى إقدام معظم هذه الدول على عمليات تنمية زراعية وصناعية. وسوف يؤدى ذلك إلى صرف كميات متزايدة من المخلفات السائلة في نهر النيل بطريق مباشر وغير مباشر، مما ستكون له آثار كبيرة على نوعية المياه الواردة إلى البحيرة.

* من المتوقع أن تبقى الأوضاع البيئية الحالية في بحيرات شمال الدلتا كما هي عليه الآن أو تتحسن قليلا، وذلك لخفض صرف المخلفات السائلة فيها.

(٣) المناطق الساحلية والبيئة البحرية

من المتوقع في عام ٢٠٢٠ أن يزداد صرف المخلفات السائلة في البيئة البحرية شمال الدلتا (صرف صحى ومخلفات صناعية) نتيجة النمو السكاني والتنمية الصناعية في المناطق الساحلية. وبالرغم من الجهود المبذولة لمعالجة بعض المخلفات (سواء بإنشاء بعض المحطات لمعالجة الصرف الصحى أو قيام بعض الصناعات بإنشاء وحدات لمعالجة مخلفاتها السائلة) سوف تزداد أحمال الملوثات التي ستجد طريقها إلى المناطق الساحلية والبيئة البحرية. كما ستؤدى عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في هذه المناطق وفي الرصيف القارى شمال الدلتا إلى صرف عدة ممليات (خاصة مخلفات عمليات حفر الآبار الاستكشافية وآبار الإنتاج ومخلفات عمليات الإنتاج . إلخ) في البيئة البحرية والمناطق الساحلية . وسيساعد على تدهور البيئة الساحلية في شمال الدلتا احتمالات غمر بعض المناطق الساحلية المنخفضة بمياه البحر . وسوف يؤدي هذا إلى آثار سلبية على نوعية المياه الجوفية الساحلية بزيادة ملوحتها وتلوثها ، كما سيؤثر على إنتاجية الأراضي الزراعية في هذه المناطق الهامشية الحساسة بيئيًا. ومن المتوقع أن يزداد التدهور البيئي في منطقة خليج السويس بعد إنشاء المجمعات الصناعية المختلفة والتي ستقوم بصرف مخلفاتها في البحر مباشرة (بعضها غير معالج أو معالج جزئيا).

كذلك ستتعرض المناطق الساحلية لضغوط متزايدة نتيجة زيادة عدد الزوار الموسميين والسائحين. وسوف لا تقابل التوسعات الكبيرة في الطاقة الفندقية والتجمعات السكنية (القرى السياحية) في هذه المناطق بتوسعات موازية في البنية

والخدمات الأساسية، بما سيودى إلى تجاوز القدرات الاستيعابية لها في بعض المواقع. فعلى سبيل المثال سوف تزداد الضغوط على محطات مياه الشرب وعلى محطات معالجة الصرف الصحى، وقد يؤدى هذا إلى قيام بعض المنشآت بصرف مخلفاتها غير المعالجة أو المعالجة جزئيًا في البيئة البحرية، بما سيكون له آثار سلبية على نوعية مياه الاستحمام في بعض الشواطئ. كذلك ستؤدى هذه الضغوط إلى إيجاد مشكلات متزايدة في إدارة المخلفات الصلبة (القمامة)، وتلوث الهواء نتيجة زيادة كثافة المرور في المنتجعات السياحية. وبالإضافة إلى هذا ستؤدى الزيادة في الانشطة البحرية الترفيهية (الرياضات البحرية، الغوص، وغيرها) إلى آثار سلبية على نوعية مياه بعض الشواطئ، بالإضافة إلى إلحساق بعض الأضرار بالشعاب المرجانية والموارد الساحلية.

(٤) تدهور التربة والتصحر

كما سبق ذكره، يقدر متوسط ما يفقد من الأراضى الزراعية لاستخدامات أخرى (مثل تشييد الطرق وأعسمال البنية الأساسية الأخرى والمساكن. . . إلخ) منذ عام 199 بنحو ٢٥ ألف فدان سنويا. وستبذل في السيناريو الشعبي جهود كبيرة للحد من فقدان الأراضى الزراعية لاستخدامات غير زراعية (البنية الأساسية والمباني. . . إلخ)، وذلك بالحزم في تنفيذ القوانين التي تحد أو تمنع استخدام الأراضى الزراعية في غير الإنتاج الزراعي. كذلك ستبذل جهود كبيرة لتوفيسر الخدمات الأساسية في المدن والمجتمعات الجديدة لتشجيع الانتقال إليها والإقامة فيها.

وسوف يحرص السيناريو الشعبى على عدم تجاوز قدرات تحمل الأراضى الزراعية وذلك باستخدام أساليب للزراعة أكثر ملائمة لقدرات الأرض والبيئة. كما أنه سيهتم بإعادة تأهيل الأرض التى تدهورت إنتاجيتها (التى أصابها التشبع بالمياه أو التمليح. . إلغ)، باستخدام تكنولوجيات ملائمة للأوضاع المحلية.

(٥) المشكلات البيئية في المناطق الحضرية

سوف تؤدى الزيادة فى عدد سكان الحضر فى عام ٢٠٢٠ إلى تفاقم المشكلات البيئية فى المدن المختلفة، خاصة فى المناطق العشوائية فيها. ولكن من المتوقع أن يزداد الاهتمام بمشكلات هذه المناطق فى السيناريو الشعبى. وسينخفض عدد السكان الذين لا تتصل وحداتهم السكانية بشبكات المياه إلى نحو ٣٠٢ مليون نسمة فى عام ٢٠٢٠ (جدول رقم ٤٧). ومع التغيرات التي ستحدث فى نوعية الحياة فى المناطق

الحضرية من المـتوقع زيادة الطلب على المياه من نحو ٣٣٥ لتـرا/ فرد/يوم في الوقت الحالى إلى نحو ٤٥٠ لترا/ فرد / يوم في عام ٢٠٢٠ أى أقل من السيناريو المرجعي نتيجة الجهود الشعبية الرامية إلى ترشيد استخدام المياه.

جدول رقم (٤٧) تقديرات أعداد سكان الحضر الذين لا تتصل وحداتهم السكنية بشبكات المياه في عام ٢٠٢٠

النسبة المتوية لعدد السكان بدون توصيلات مياه	حدد السكان بدون توصيلات لمياه الشرب (بالمليون)	حدد سكان الحضر (بالمليون)	
7.10,8	£	77	1997
7,18,4	٨	٥٦	۲۰۲۰ (السيناريو المرجعي)
7.0	۲,۳	13	۲۰۲۰ (السيناريو الشعبي)

أما بالنسبة لخدمات الصرف الصحى فسوف تنخفض نسبة السكان بدون خدمات صرف صحى فى السيناريو الشعبى من ٢٥,٤٪ فى عام ١٩٩٦ إلى ١٠٪ فى عام ٢٠٢٠ (جدول رقم ٤٨). وهى نسبة أقل بكثير من تلك فى السيناريو المرجعى.

جدول رقم (٤٨) تقديرات سكان الحضر بدون خدمات صرف صحى في السيناريو الشعبي

	حدد سكان الحضر (بالمليون)	عدد السكان بدون خدمات صرف صحى (بالمليون)	النسبة المثوية لعدد السكان بدون خدمات صرف صحى	
1997	*7	1,1	7.40.8	
۲۰۲۰ (السيناريو المرجعي)	۲٥	١٤,٠	% Y0	
۲۰۲۰ (السيناريو الشعبي)	٤٦	7,3	٪۱۰	

وسوف تزداد كمية المخلفات البلدية الصلبة المتولدة في المناطق الحضرية من نحو ٢٤٢٩٠ طنا يوميا (٨,٩ مليون طن سنويا) في الوقت الحالي إلى نحو ٢٤٢٩٠ طن يوميا (١٥,١ مليون طن سنويا) في عام ٢٠٢٠ (جدول رقم ٤٩)، نتيجة الزيادة السكانية في هذه المناطق بالإضافة إلى التغيرات المتوقعة في نوعية الحياة وأنماط الاستهلاك.

جدول رقم (٤٩) كمية المخلفات البلدية الصلبة المتوقعة في المناطق الحضرية

كمية المخلفات البلدية الصلبة (مليون طن/ سنة)	
۸,۹	1997
3,.7	۲۰۲۰ (السيتاريو المرجعي)
10,1	۲۰۲۰ (السيناريو الشعبي)

ومن المنتظر أن يشجع السيناريو الشعبى استخدام العبوات التى ترد (أى إعادة استخدام العبوات خاصة زجاجات المشروبات) وبالتالى إحداث بعض التغييرات فى تعبئة المنتجات وحث قطاعات الصناعة والتجارة والأفراد على تخفيض كميات المخلفات الصلبة المتولدة. كما سيتم تشجيع عمليات تدوير بعض مكونات المخلفات.

(٦) المشكلات البيئية في المناطق الريفية

طبقاً للسيناريو الشعبى سوف يكون عدد سكان المناطق الريفية في عام ٢٠٢٠ نحو ٤٠ مليون نسمة. وكما ذكرنا من قبل سيسعى هذا السيناريو إلى تحسين الأوضاع البيئية، خاصة بالعمل على إمداد المناطق الريفية بالخدمات الأساسية وفي مقدمتها مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى. وطبقاً لذلك سوف تنخفض نسبة سكان الريف الذين لا تصل المياه إلى وحداتهم السكنية من نحو ٤٢٪ في عام سكان الريف الذين لا تصل المياه إلى وحداتهم السكنية من نحو ٤٢٪ في عام ١٩٩٦ إلى ١٠٪ بحلول عام ٢٠٢٠ (جدول رقم ٥٠).

جدول رقم (٥٠) تقديرات أعداد سكان الريف الذين لا تنصل وحداتهم السكنية بشبكات المياه في حام ٢٠٢٠

النسبة المثوية لمدد السكان بدون توصيلات مياء	مند السكان بدون توصيلات لمياه الشرب (بالمليون)	مند سكان الريف (بالمليون)		
7.57	18	٣٣	1997	
7.40	14	44	۲۰۲۰ (السيئاريو المرجعي)	
7.1 -	٤	1 ·	۲۰۲۰ (السيناريو الشعبي)	

أما بالنسبة لخدمات الصرف الصحى فكانت نسبة من لا تصلهم هــذه الخدمات ٨٣٪ في عام ١٠٢٠، في عام ٢٠٢،

وبذلك يصبح عدد سكان الريف الذين لا تصلهم خدمات الصرف الصحى قرابة ١٤ مليون نسمة (جدول رقم ٥١).

جدول رقم (۱ ه) تقديرات أعداد سكان الريف بدون خدمات صرف صحى في السيناريو الشعبي

الشبية المثوية لعدد السكان بدون خدمات صرف صحى	عدد السكان بدون خدمات صرف صمى (بالليون)	حدد سكان الريف (بالمليون)	
%A*	74	77	1997
′/.v ·	74	77	۲۰۲۰ (السيناريو المرجعي)
7.70	١٤	٤.	۲۰۲۰ (السيناريو الشعبي)

ومع التغيرات في أنماط الحياة والاستهلاك في المناطق الريفية من المتوقع زيادة توليد المخلفات المنزلية الصلبة (القمامة) من نحو ١٠٢٠ طن يوميا (٣,٩ مليون طن سنويا) في الوقت الحالي إلى نحو ١٢٠٠٠ طن يوميا (٤,٤ مليون طن سنويا) في عام ٢٠٢٠ (جدول رقم ٥٢).

جدول رقم (٥٢) كمية المخلفات المنزلية الصلبة المتوقعة في المناطق الريفية

كمية المخلفات المنزلية الصلبة (مليون طن/ سنة)	
٣,٩	1447
٦,٠	۲۰۲۰ (السيناريو المرجعي)
1,1	۲۰۲۰ (السيناريو الشعبي)

ومن المتوقع أن تكثف الجهود فى السيناريو الشعبى لإحداث تغيرات جوهرية فى الأوضاع البيئية فى المناطق الريفية. ومن المحتمل أن توجه برامج تنمية القرية إلى تحديث الزراعة وتنمية الصناعات الزراعية والمقروية. . إلخ لتحسين حياة أهلها ودعم استقرارهم، ومن ثم للحد من هجرة أهل الريف المؤقعة أو الدائمة إلى المناطق الحضرية أو إلى خارج البلاد.

الفصل السابع ملاحظات ختامية

بداية لابد من التأكيد على الحقائق المهمة التالية:

أولا ـ التدهور البيئي (تدهور النظم الإيكولوجية) لا يحدث بين يوم وليلة (باستثناء حالات الكوارث البيئية)، إنما هو عملية تراكمية تحدث على فترات رمنية طويلة، تختلف مدتها من نظام بيئي إلى آخر ومن منطقة جغرافية إلى أخرى.

ثانيا _ يتوقف التدهور البيثى على أحمال الملوثات ومكوناتها ومدة الـتعرض لها والتفاعلات الطبيعية والكيميائية التى تحدث بين هذه المكونات وبينها وبين مكونات النظام البيثى.

ثالثا _ تتوقف عملية إعادة تأهيل النظم البيئية التى أصابها التهور على درجة التدهور. فبعض النظم يمكن إعادة تأهيلها بسهولة وبتكاليف معتدلة، والبعض الآخر بصعوبة وبتكاليف مرتفعة، والبعض الثالث لا يمكن إعادة تأهيله للتدمير الكامل الذي أصاب مكوناته الأساسية.

رابعا _ تكمن جذور المشكلات البيئية في خصائص المنظومة الاقتصادية/ الاجتماعية/ السياسية. وتاريخيا لم يؤخذ البعد البيئي بعين الاعتبار في هذه المنظومة.

خامسا _ الرأسمالية التقليدية كان همها الرئيسى هو تحقيق نمو اقتصادى سريع دون النظر لما سيترتب على ذلك من أضرار بيئية. وبذلك انطوت على الكثير من استنزاف الموارد الطبيعية واتسمت بأنماط استهلاكية مهدرة. وكان من جراء ذلك أن أصبحت بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادى (OECD Countries) مسئولة عن ٤٠٪ من انبعاثات أكاسيد الكبريت في العالم و٥٥٪ من أكاسيد النيتروجين و٥٧٪ من انبعاثات أول أكسيد الكبريون و٧٠٪ من انبعاثات غارات الاحتباس الحرارى و٩٥٪ من انبعاثات الغارات المسببة في تآكل طبقة الأورون.

سادسا _ الاشتراكية التقليدية كان همها الرئيسى هو العمل على إشباع الحاجات الأساسية للجماهير وعلى الإسراع في التنمية الصناعية (خاصة الصناعات الثقيلة)، دون اعتبار لما قد يترتب على ذلك من أضرار بيئية. ولقد اتضح حجم هذه الأضرار البيئية مؤخرًا بعد التغيرات الكبيرة التي حدثت في شرق أوروبا في السنوات العشر الأخيرة.

سابعا _ منذ مؤتمر إستكهولم عام ١٩٧٢ عـملت الدول الرأسمالية على «توفيق» أوضاعها البيئية، وحققت بعض النجاحات في هذا الصدد، ولكن بتكاليف باهظة. أما الدول الاشتراكية فلم تحقق تقدمًا ملموسًا، نتيجة انشغالها بالانتقال إلى اقتصاديات السوق وما ترتب على ذلك من مشكلات اجتماعية واقتصادية.

من هنا أصبح من الصعب تفضيل نظام اقتصادى/اجتماعى/سياسى على الآخر من النواحى البيئية، فجميع النظم أهملت البعد البيئى فى عمليات التنمية. ولقد اتضح ذلك من تقرير اللجنة الدولية للبيئة والتنمية (مستقبلنا المشترك) الذى نشر عام ١٩٨٧، والذى نادت فيه بما سمى بالتنمية المستدامة. ومنذ ذلك الوقت لم تتحقق مثل هذه التنمية فى أى دولة من دول العالم.

إن ما تعانيه مصر الآن من مشكلات بيئية جاء نتيجة تراكمات على مر الخمسين عاما الماضية نتيجة إهمال البعد البيئى في عمليات التنمية وعدم بذل الجهود المناسبة للتعامل مع المشكلات البيئة حال ظهورها. ولقد أوضحنا في الدراسة الحالية في السيناريو المرجعي أنه مع استمرار السياسات البيئية الحالية والإجراءات المتواضعة للحد من التلوث والاستعانة بالمسكنات في التعامل مع المشكلات البيئية، سوف يستمر التدهور البيئي في مصر. إذا ما هو البديل للسيناريو المرجعي؟ (لا يستطيع المؤلف تحديد هوية السيناريو المرجعي).

أوضحنا في الفصول السابقة الأوضاع البيئية المتوقعة في عام ٢٠٢٠ في أربعة سيناريوهات بديلة. ويوضح جدول (٥٣) وجدول (٥٤) مقارنة للمؤشرات المختلفة بين هذه السيناريوهات. ومنها يتضح أن لكل سيناريو جوانبه الإيجابية وجوانبه السلبية. ومن الصعب تفضيل سيناريو على آخر من الناحية البيئية، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية. ويؤخذ على كل السيناريوهات أنها لم تدخل العوامل البيئية بصورة واضحة مقننة ومتعمقة في سياساتها الإنمائية. ومن هنا يتضح أنه في جميع السيناريوهات ستسوء حالة البيئة في مصر، ولكن بدرجات متفاوتة.

السبيل الوحيد، إذن، لتحسين الأوضاع البيئية هو ضرورة وجود اقتناع كامل، قولاً وفعلاً، لدى القيادات المختلفة _ بغض النظر عن مسميات السيناريوهات _ بضرورة العمل على:

- ١ ـ إدخال البعد البيئى فى سياسات وخطط التنمية، بحيث تتم عمليات تقييم بيئى جادة لكافة المشروعات الإنمائية، وذلك بهدف التعرف على الآثار البيئية المحتملة لهذه المشروعات ووضع الخطط والإجراءات المناسبة للتعامل معها فى وقت مبكر عملا بفلسفة «الوقاية خير من العلاج».
- ٢ ـ الحد من التلوث والتدهور البيئى وإعادة تأهيل النظم البيئية التى أصابها التدهور طبقًا لبرنامج زمنى محدد.
- ٣ ـ اعتبار أن الإنفاق على حماية البيئة هو بالدرجة الأولى مسئولية الدولة، وبأن الإنفاق على حماية البيئة هو «استثمار» له عائد نجنيه على المدى الطويل، وهو استثمار لمستقبل الأجيال القادمة.
- ٤ ـ ترسيخ الوعى البيئى لدى الجماهير بهدف إحداث تغيرات ملموسة فى السلوكيات تهدف إلى ترشيد الاستهلاك بصورة عامة، وإلى الحرص على الملكية العامة وحماية البيئة بصورة خاصة.
 - ٥ _ تحقيق الإلزام والالتزام بالتشريعات البيئية المختلفة.

جدول رقم (۵۳) التوقعات بالنسبة للعوامل المؤثرة في حالة البيئة في عام ٢٠٢٠

المؤشـــــوات	السيناريو المرجعي	سيناريو الدولة الإسلامية	سيناريو الرأسمالية الجديدة	سيناريو الاشتراكية الجديدة	السيناريو الشعبي
السكان _ عدد السكان (مليون نسمة) _ الكثافة السكانية (نسمة / كيلو متر مربع)* _ سكان الحضر (٪)	PA PF71 7F	99 1077 3,70	AY 1777 70,0	74 1774 7,70	7.7 7771 30
الحالة الاقتصادية معدل النمو السنوى للناتج القومى الإجمالى (٪) مكونات الناتج المحلى الإجمالى: رراعة (٪) صناعة (٪) خدمات (٪)	0, A Y. W.	70 TE:	7,0 1A 70	70 2. 70	0,0 Y. T.
الموارد الطبيعية - الأرض - الأرض مساحة الأرض الزراعية (مليون فدان) نصيب الفرد من الأرض (فدان) - المياه الطلب على المياه (مليار متر مكعب/ سنة) نصيب الفرد (متر مكعب/ سنة) - الماقة احتياجات الطاقة (مليون طن نفط مكافئ) استهلاك الفرد (كيلرجرام نفط مكافئ)	4, Y . , 1. . , 1. . , 0, A . A. T . 114 . 117. A	9, Y . , . 9 . , . 9 . , . 9 . , . 1 . , . 1 . 1 1 2	4, Y ., 11 AV, 0 AAA 171	7,7, -1,- 11A 111 111	3.FA 3.FA -FA 111

الكثافة السكانية بالنسبة للمساحة المأهولة.
 مؤشر الضغط الماثي - ١٠٠٠ متر مكعب/ فرد/سنة.

جدول رقم (٥٤) التوقعات بالنسبة لمؤشرات حالة البيئة في عام ٢٠٢٠

السيئاريو الشعبى	سيناريو الاشتراكية الجديدة	سيناريو الرأسمالية الجديدة	سيناريو الدولة الإسلامية	السيناريو المرجعي	المؤشـــــرات
٤,٧	٤,٧	٦,٥	٤,٧	۵,۸	تلوث الهواء ـ عدد المركبات (مليون مركبة) ـ أحمال تلوث الهواء (الف طن)
11	1818	1777	178.	١.٩.	ثانى أكسيد كبريت
٣٠٠	847	79.	٤١٠	Y . V	أكاسيد نيتروجين
٧٥٠٠	1.80.	٧٠٦٩	1	777.	جسيمات كلية عالقة
۳۰	٤٥	7"1	27	YY	هيدروكربونات
١٥	7 \$	77	3.7	۲.	ـ السكان المعرضين للتلوث (مليون نسمة)*
					- غازات الاحتباس الحراري
77.	77. V	44.	۲٦٠	404	ثانی اکسید الکربون (ملیون طن/ سنة)
۸٦٧	v ··	١٠٠٠	γ	ለገለ	الميثان (ألف طن/ سنة)
					تلوث المياه
+	+	++	+	++	۔ ـ تلوث نھر النيل
+	+	++	+	++	ـــ تلوث المياه الجوفية ـــ تلوث المياه الجوفية
+	+	++	+	++	ـ تلوث بحيرات شمال الدلتا
++	++	++	++	++	المناطق الساحلية والبيئة البحرية
۲۰	۲.	Y 0 ++	۲٠	Y0 ++	تدهور التربة والتصحر ـ فقدان الأرض الزراعية (ألف فدان/ سنة) ــ تدهور التربة
7,4 80. 8,7 10,1	Y, E Eo. E, A No. A	0, E 0 · · A Y9, 7	7,7 20. 0,7 17,2	A 0 1£ Y.,£	المشكلات البيئية في المناطق الحضرية ـ السكان بدون شبكات المياه (مليون نسمة) ـ الاستخدام المنزلي للمياه (لتر/ فرد/ يوم) ـ السكان بدون خدمات صرفي صحى (مليون) ـ المخلفات المبلدية الصلبة (مليون طن/ سنة)
£ \{ {, {	1,3 71 0,3	0,7 1V 10,7	£,V \\ 0	71 77 7	المشكلات البيئية في المناطق الريفية ـ السكان بدون شبكات المياه (مليون نسمة) ـ السكان بدون خدمات صرف صحى (مليون) ـ المخلفات المنزلية الصلبة (مليون طن/ سنة)

شكان الحضر المعرضين لتركيزات من الملوثات أعلى من معايير منظمة الصحة العالمية.
 ++ تدهور أكبر + تدهور أقل.

المراجع

- (1) Meadows, D.H. et al. (1972): The Limits to Growth. Universe Books, New York.
- (2) The Ecologist (1972): Blueprint for Survival. The Ecologist, 2, 1-43.
- (3) UNEP (1981): In Defense of the Earth. Executive Series No. 1. United Nations Environment Programme, Nairobi.
- (4) World Commission on Environment and Development (1987): Our Common Future, Oxford University Press, Oxford.
- (5) World Bank (1992): World Development Report. Oxford University Press, Oxford.
- (6) Council on Environmental Quality (1980): The Global-2000.
 Report to the President of the United States, Washington, D.C.
- (7) Leontief, W. et al. (1977): The Future of the World Economy. Oxford University Press, New York.
- (8) See Reference No. (1)
- (9) Meadows, D.H. et al. (1992): Beyond the Limits. Earthscan, London.
 - (١٠) عصام الحناوى (١٩٩٣): السكان والبيئة والتنمية في العالم العربي
 المؤتمر العربي للسكان ـ عمان وثيقة رقم E/ESCWA/POP/1993/SAPC/5
- (11) El-Hinnawi, E. (1992): Poverty and Environment. United Nations Environment Programme, Nairobi.
- (12) ECOSCOC (1981) Interrelationships between population, resources, environment and development. E/1981/65. United Nations, New York.
- (13) UNEP (1988): The State of the Environment. United Nations Environment Programme, Nairobi.
- (14) United Nations (1972): Report of the UN Conference on the Human Environment, A/CONF.48/14/REV.1. United Nations, New York.
- (15) United Nations (1984): Report of the International Conference on Population, Mexico. E.84.XIII.8. United Nations, New York.

- (16) United Nations (1992): AGENDA-21. United Nations Conference on Environment and Development. United Nations, New York.
- (17) United Nations (1994): Report of the International Conference on Population and Development, Cairo. United Nations, New York.
- (18) United Nations (1995): Report of the Summit on Social Development, Copenhagen. United Nations, New York.
- (19) UNEP (1982): The World Environment 1972-1982. Study Director: E.El-Hinnawi. Tycooly International, Dublin.
- (20) Tolba, M.K. et al. (1992): The World Environment 1972-1992. Chapman and Hall, London.
 - (۲۱) الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء: الكتب الإحصائية السنوية ١٩٩٠ـ١٩٩٥ (١٩٩٦) و١٩٩٦ـ١٩٩٨ (١٩٩٩).
- (22) Institute of National Planning (1994, 1995): Human Development Reports. Institute of National Planning/UNDP, Cairo.
- (23) World Bank (1990): Land Reclamation Subsector Review. Egypt Report No.8047-EGT.
- (24) Tolba, M.K. (1992): Saving Our Planet. Chapman and Hall, London.
- (25) El-Hinnawi, E. (1991): Sustainable agriculture and rural development in the Near East. FAO/ Netherlands Conference on Agriculture and Environment, Regional Paper No.4, FAO, Rome.
- (26) Conway, G.R. and J.N. Pretty (1991): Unwelcome Harvest: Agriculture and Pollution. Earthscan, London.
- (27) World Bank (1999): World Development Indicators. World Bank, Washington, D.C.
- (28) El-Hinnawi, E. and M. Hashmi (1987): The State of the Environment. Butterworths, London.
- (٢٩) عصام الحناوى (١٩٩٥): دليل الإرشادات العامة لتشخيص الآثار البيئية. للصناعة في الوطن العربي. جامعة الدول العربية/ برنامج الأمم المتحدة للبيئة. Patrick, D.R. (1994): Toxic Air Pollution Handbook. Reinhold, New York.
- (30) UNEP/WHO (1992): Urban Air Pollution in Megacities of the World. Blackwell, Oxford.

- انظر أيضًا بيانات مركز الرصد البيئي التابع لوزارة الصحة ـ إمبابة (١٩٩٥).
- (31) EEAA (1996): Lead smelter action plan. Egyptian Environmental Affairs Agency, Cairo.
- (32) WHO (1987): Air quality guidelines for Europe. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen.
 - (٣٣) جهاز شئون البيئة (١٩٩٢) : خطة العمل البيثي في مصر.
- (34)World Bank (1994): Middle East and Northern Africa Environmental Strategy. Report No. 13601 ME`NA, World Bank, Washington, D.C.
- (35) Calculated from FAO/UNEP/UNESCO Soil Degradation map (1980) and UNEP/ISRIC map of human-induced soil degradation (1990).
- (٣٦) جامعة الدول العربية/برنامج الأمم المتحدة للبيئة (١٩٩٦) : حالة التصحر في الوطن العربي
- (٣٧) الجهاز المركزى للتعبشة والإحصاء (١٩٩٩): التعداد العام للسكان والإسكان والمسكان
- (38) Gleick, P.H. (1998): the World's Water. Island Press, Washington, D.C.
- (39) World Resources Institute (1998): World Resources, 1998-1999. Oxford University Press, Oxford.
- (٤٠) فاروق أبو زيد (١٩٩٣): المعالجة الصحفية لقضايا البيئة. جلقة نقاشية، جهار شئون البيئة ومؤسسة فريدريش إيبرت.
- (٤١) مُجدى علام (١٩٩٦): الوعى البيتي في مصر، محاولات استقراء. جهاز شنون البيئة
- (٤٢) صُفوت الشريف (١٩٩٣): فعالية الأساليب الإعلامية وتوعية الجماهير بقضايا البيئة. ملتقى وسائل الإعلام في نشر الوعى البيئي ـ جامعة الدول العربة.
- (٤٣) عصام الحناوى (١٩٩١): الإعلام والتوعية البيئية. معهد البحوث والدراسات العربية.
- (٤٤) أماني قنديل وسارة بسن نفيسة (١٩٩٥): الجمعيات الأهلية في مصر. مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، الأهرام.
- (45) Simon, J.L. and H. Khan (1984): The Resourceful Earth. Blackwell, Oxford.
- (46) World Resources Institute (1997): World Resources, 1996-1997. Oxford University Press, Oxford.

- (47) El-Hinnawi, E. and A. Biswas (1981): Renewable Sources of Energy and Environment. Tycooly International, Dublin.
- (٤٨) الفريق المركزي لمشروع مصر ٢٠٢٠ (إبراهيم العيسوي وآخرون): (١٩٩٨): الشروط الابتدائية للسيناريوهات الرئيسية لمشروع مصر ٢٠٢٠، والورقة (٢) من أوراق مصر ٢٠٢٠، (١٩٩٩): الأسس النظرية والمنهجية لسيناريوهات مصر ٢٠٢٠، والورقة (٤) من أوراق مصر ٢٠٢٠، منتدى العالم الثالث _ القاهرة.
- (49) Biswas, A. (1993): Land Resources for Sustainable Development in Egypt, Ambio, 22, 556.
- (٥٠) جمال صيام (١٩٩٨): مؤشرات الاقتصاد وتحدى الزراعة. أحوال مصرية، العدد الثاني، صفحة ٧٤. مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية. الأهرام.
- (51) World Bank (1992): North Sinai Agricultural Development Project.
 - Environmental Impact Assessment Report 476.7103.1
- (52) El-Hinnawi, E. (1990): Children and Environment, UNEP/UNECEF, Nairobi.

الفهــرس

توطئــةه
مقدمة عامة مقدمة عامة و
الباب الأول: الوضع البيتي الراهن في مصر
الفصل الأول: النظم البيئية
الفصل الثاني: الموارد الطبيعية واستغلالها
الفصل الثالث: التلوث البيثي في مصر
الفصل الرابع: السياسات والإدارة البيئية
الفصل الخامس: الوعى البيثي
الباب الثاني: سيثاريوهات المستقبل
الفصل الأول: مقدمة الفصل الأول:
الفصل الثاني: السيناريو المرجعي
الفصل الثالث: سيناريو الدولة الإسلامية
الفصل الرابع: سيناريو الرأسمالية الجديدة
الفصل الخامس: سيناريو الاشتراكية الجديدة
الفصل السادس: السيناريو الشعبي
الفصل السابع: ملاحظات ختامية ٤٠.
المسراجع ٥.




onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

رقم الإيداع ٧٦٣٦ / ٢٠٠١ الترقيم الدولى 9 - 0718 - 99 - 977 iverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مطابع الشروقب

القاهرة : ٨ شارع سببویه المصری _ ت:٤٠٢٣٩٩ _ فاکس:٤٠٣٧٥٦٧ (٠٠) بیروت: ص.ب: ٨٠٤١هـ هاتف: ٨١٠٢١٣_١١٥٨٥ فاکس: ٨١٧٧٦٥ (٠١)





نقدم لجمهور القراء هذا الكتاب الغنى بالمعلومات المدققة حول مختلف عناصر البيئة، والزاخر بالتحليلات العلمية الثاقبة للقضايا البيئية من المنظور التاريخى، وكذلك وهو الأهم من المنظور المستقبلى. ومن محاسن هذا الكتاب أنه يخوض فى موضوعات ذات طابع فنى متخصص بأسلوب يجمع فى تآلف نادر بين الرصانة العلمية ووضوح العبارة ورشاقتها. ولهذا فهو وإن كان مرجعاً علمياً يشفى غليل الباحثين المتخصصين فى الشئون البيئية، إلا أنه سيكون محل المتخصصين فى الشئون البيئية، إلا أنه سيكون محل ترحيب كبير من عامة القراء الذين تشغلهم أو يجب أن تشغلهم قراءته فى سهولة ويسر، والإحاطة بالكثير من الأمور البيئية الدقيقة دون عناء كبير.